

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИ

И. К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ

У. А. Амираев

СТОМАТОЛОГИЯЛЫК
ТЕРМИНДЕРДИН
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА
ТҮШҮНДҮРМӨ СӨЗДҮГҮ

РУССКО-КЫРГЫЗСКИЙ
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ

Окуу куралы

Ондолуп, толукталып 2-басылышы

*Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын
Борбордук окуу усулдук кеңеши басып чыгарууга сунуштайт.*

*Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана
илим министрлигинин грифи менен студенттерге
окуу куралы катары чыгарууга уруксат берилди.
Буйрук № 559/1, 19-май, 2009-жыл.*

Бишкек — 2009

УДК 616.3

ББК 56.6

С 81

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын РБК чечими менен басылды.

РБКнын мүчөлөрү:

- Зурдинов А. З.** — ректор, мед. илим. доктору, профессор, башкы редактор;
- Чолпонбаев К. С.** — ОТИ, ЭК жана мамл.тил боюнча проректор, мед. илим. доктору, профессор, башкы редактордун орун басары
- Адамалиев К. А.** — балдар хирургиясы кафедрасынын башчысы, мед. илим. доктору, профессор, жооптуу катчы
- Алымкулов Р. Д.** — окуу-усул бөлүмүнүн начальниги, мед. илим. доктору, профессор
- Абдымомунов А. О.** — ортопедиялык стоматология кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучу, мед. илим. доктору
- Молдобаева М. С.** — пропедтерапия жана эндокринология башчысы, мед. илим. доктору, профессор
- Рисалиев Д. Дж.** — коомдук саламаттыкты жана саламаттыкты сактоо жана эпидемиология курсу кафедрасынын башчысы, мед. илим. доктору, профессор
- Тилекеева У. М.** — базистик жана клиникалык фармакология кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу
- Ырысов К. Б.** — нейрохирургияны дипломго чейин жана кийин окуу кафедрасында профессордун милдетин аткаруучу.

Амираев У. А.

Стоматологиялык терминдердин орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү. Окуу куралы./ Түз. У.А. Амираев.— Оңд. толук. 2-бас. — Б.: 2009. — 276 б.

ISBN 978-9967-434-66-0

Студенттер, врач-стоматологдор стоматологияда колдонулуучу материалдарды теренирээк жана кененирээк билүү үчүн жардам берет деген максатта чыгарылды.

А 4108120000-09

УДК 616.3

ББК 56.6

ISBN 978-9967-434-66-0

© Түзгөн Амираев У.А., 2009.

Медицина илимдеринин доктору, доцент Амираев Убайдилла Амираевич кемчиликтерин оңдоп, толуктап, экинчи жолу (биринчиси 2005-жылы чыккан) түзүп чыккан «Стоматологиялык терминдердин орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү» Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиянын медицина боюнча өкүлү, башкы эксперт М. Ж. Жээналиев тарабынан редакцияланып, медицина жана айыл чарба секторунда талкууланды.

Кыргыз тилин өздөштүрүп, бардык тармактарга кеңири таратуу үчүн жапа тырмак бардыгыбыз киришип, аракеттенүүбүз керек. Атадан калган алтынга бергисиз сөз бар эмеспи: «Көч бара-бара түзөлөт» деген.

Бул эмгек мамлекеттик тилди стоматология тармагында өнүктүрүүдөгү алгачкы саамалыктардын бири. Төл башы эмгек катары жалпы медицина жана стоматология окуу жайларынын эмгек жамааттарынын, студенттеринин, окутуучуларынын, дарыгерлердин, илимий жана башка кызматкерлердин эңсеп күткөн жан китеби болор деген ойдобуз.

Т. ЖУМАГУЛОВ

*Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу
Мамлекеттик тил боюнча Улуттук
комиссиянын төрагасы,
Мамлекеттик тил фондунун директору*

А

АБДУ́КЦИЯ — абдукция. Ары түртүү, жылдыруу (мисалы, оозду ачканда ылдыйкы жаакты алдыга карай кыймылдатуу).

АБРАЗІВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — жонуу аспаптары. Кыруу, өгөө, жонуу үчүн аспаптар абразивдерден жасалат. Буга алмаздуу же карборунддуу борлор, сепарациялык дискилер, таштар ж. б. кирет. Абразивдик аспаптар менен металл кошундуларынан, керамикадан, цементтен, пластмасса, фарфор ж. б. материалдардан жасалган тиш протездерин, кыттарды (пломбаларды) оңдоп түзөйт, жонот.

АБРАЗІВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — жонуу материалдары. Алар табигый жана жасалма болуп бөлүнүшөт: табигый түрлөрүнө алмаз, корунд, пемза, талаа шпаты ж. б., жасалма түрлөрүнө карборунд, фарфор кыпыны ж. б. кирет. Бул абразивдерден кыргызч, чарык, кайрак, кескич, стоматологияда колдонулуучу ж. б. аспаптар жасалат.

АБРАЗІВНЫЙ ХЕЙЛИТ МАНГАНОТТИ — эриндин кыюусунун кесилип-түлөгөн Манганотти жарасы. Астыңкы эринде пайда болуучу тегерек, сүйрү келген, бат-бат кайталанып туруучу өзгөчө жара. Өз убактысында, тезирээк дарылап, алдын албаса рак оорусуна өтүп кетиши мүмкүн. Кыргызча бул ооруну желке деп атайт, айрыкча жазында, жайында күч алат, кыргыздар дүлөй деп аталган өсүмдүктү эринге чаптап айыктырышкан.

АБРА́ЗИЯ — абразия. Тишке жасалма коронка жасоодо тиш коронкасынын айланасын, чайноо бетин жонуу жана оорулуу тиштин көндөйүн кыруу.

АБСОЛЮ́ТНАЯ СИ́ЛА ЖЕВА́ТЕЛЬНЫХ МЫШЦ — чайноо булчундарынын эң жогорку күчү. Чайноо булчундарынын эң көп салмак көтөрүшү, жыйрылышы. Орто эсеп менен Вебердин пикири боюнча туурасынан кесилиши 1 см²

болгон чайноо булчуну 10 кг салмакты көтөрө алат. Чыккый булчуну -8 см^2 , чайноо булчунунуку $-7,52 \text{ см}^2$ жана медиал канат сымал булчунунуку -4 см^2 , ошондо бир жаактагы булчуңдардын кесилиш аянты $19,5 \text{ см}^2$ болсо, эки жагы 39 см^2 , демек ылдыйкы жаактын көтөрүү мүмкүнчүлүгү 390 кг га барабар.

АБСОРБЦИЯ — абсорбция. Синирүү, жутуу, абсорбциялоо.

АБСЦЕСС — ириндүү шишик. Туюк жара, ириң тебүү, ириндүү шишик. Негизги абсцесстер: А. заглоточный — кекиртек артындагы А.; А. твердого нёба — катуу тандайдагы А.; А. подглазничный — көздүн алдындагы А.; А. боковой поверхности носа — мурундун каптал жагындагы А.; А. челюстно-язычного желобка — тил-жаак ноочасындагы, А.; А. языка — тилдеги А.; А. наружной поверхности нижней челюсти — астыңкы жаактын сыртындагы А. Булар — стоматологияга гана тиешелүү абсцесстер. Медицинада абсцесстин түрлөрү өтө көп.

АВИТАМИНОЗ — витаминдин жоктугу. Тамак-ашта витаминдердин жетишсиздигинен же денедө зат алмашуу процессинин бузулушунан улам витаминдердин синбегенинин натыйжасында пайда болуучу оору. Мисалы, «С» витамининин жоктугунан тиштин бүйлөсүнүн жана ооз көндөйүнүн былжыр кабыкчасынын канашы пайда болот. Дарылабаса күчөп, кабылдап кетип, тиштердин бошоп, түшүп калуусуна алып келет.

АВИЦЕННА, Ибн Сина, Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах (б. з. 980-ж., Бухара шаарына жакын Афшана кыштагы — 1037-ж., Хамадан). Чыгыштын атактуу илимпозу, философ, дарыгер, акын, энциклопедиячысы болгон. Илим-билимдин бардык тармактары боюнча 280ден ашык эмгегинин 160ка жакыны биздин заманга жеткен. Ибн Синанын ысымы Гипократтын жана Галендин катарында турат. Анын «Медицина канону» деген эмгеги латынча 30 жолу басылган. Анда медицина теориясын, адамдын анатомиясын жана физиологиясын, түрдүү оорулардын себептерин жана белгилерин, тазалыктын жана тамактануунун эрежелеринин негизин

жазган. Атактуу «Канондо» ооз көндөйү менен тиштерге зор маани берилип, кеңири орун баяндалган. Ал жугуштуу ооруларды өзүнчө бир көзгө көрүнбөгөн козгогучтар пайда кылат деген оюн Пастерден 6 кылым мурда айтып кеткен.

АВТОКЛАВ — автоклав. Жогорку басымдагы температура менен микроорганизмдерди өлтүрүүчү аппарат.

АГГРАВАЦИЯ — аггравация. Ооруган жердин оорусунун белгисин ашыра айтуу.

АГЕВЗИЯ — агевзия. Даам сезүүнүн жок болушу.

АГЛОССИЯ — аглоссия. Тилдин тубаса болбой калышы, денедеги башка тубаса аномалиялар менен бирге болот.

АГНАТИЯ — агнатия. Үстүнкү же астыңкы жаактын тубаса жок болушу, эң сейрек кезигүүчү көрүнүш. Мындай бала адам болбойт.

АГРАНУЛОЦИТОЗ — агранулоцитоз. Четки кан тамырларда жетилбеген лейкоциттер — гранулоциттердин азайышы, организмдин дарыларга, химиялык заттарга сезгичтигинен пайда болот.

АДАМАНТИНОМА — адамантинома. Тиштин тамырында кездешүүчү зыянсыз шишик. Ал нык же ичинде сары суусу бар түрдө гана кездешет.

АДАМАНТОМА — адамантома. Тиштин коронкасынын туура эмес өсүшү, тиштин моюнчасында эмалдан же эмаль менен дентинден турган түйүнчө түрүндөгү жооноюу.

АДАПТАЦИЯ — көнүү. Организмдин же анын органдарынын айлана-чөйрөгө ыңгайланышы.

АДАПТАЦИЯ К СЪЁМНОМУ ПЛАСТИНОЧНОМУ ПРОТЕЗУ — пластиналуу кийме протезге көнүү. В. Ю. Курляндскийдин далилдөөсү боюнча мындай кийме протезге көнүү үч фазадан турат: 1-дүүлүктүрүү фазасы. Мында пациенттин оозундагы протез бөтөн нерсе болуп, кыжалаттанып эси-дарты протезде болуп, так сүйлөй албай булдуруктап калат. Шилекей көп чыгат, адамдын кускусу келет, тамакты чайнай албайт, жутушу кыйындайт. Бул 1 суткага чейин созулат. 2-фазада дүүлүктүрүү анча-мынча басаңдайт. Адам кичине көнө баштайт, шилекей азаят, айткан

сөзүн түшүнсө болот, тамакты жей баштайт. Бул фаза 1—5 суткага чейин болот. 3-фазада дүүлүктүрүү толук жок болот. Мында адам протези жок жүрө албайт, протез менен тамакты өз тишиндей жеп баштайт, сөздү так сүйлөйт. Бул фаза 5—33 күнгө чейин созулат.

АДГЕЗИЯ — жабышкактык, илээшкектик. Ар кандай катуу же суюк нерселердин бири-бирине жабышуусу. Стоматологияда кийме протездердин таңдайга же ар түрдүү кыттардын тишке жабышуусу адгезиялык касиетине байланыштуу.

АДГЕЗИОННЫЙ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ — жабыштырылган көпүрөчө протез. Тиштердин катарынан бир тиш жулунганда тишти өгөбөй жабыштырып коё турган көпүрөчө сымал жасалма тиш. Бул протезди **МЕРИЛЕНД МОСТ** — мериленд көпүрө деп айтышат. Мындай протездин конструкциясы 1961—1963-жылдары В. Н. Копейкин тарабынан сунушталган, бирок кенири таралган эмес. Мериленд университетинин Тиш хирургиясы институтунун кызматчылары Ливатидис менен Томпсон желим менен жабышуучу көпүрө протезди жасашып, аны «мериленд-көпүрө» деп аташкан. Мындай конструкция жасаганда протез таңдайга же тил жакка желим менен жабыштырылат.

АДГЕЗОР — адгезор. Эки компоненттүү цинк-фосфат цементи. Ал күкүм жана суюктуктан турат, ооздон алынбоочу тиш протездерин туруктуу бекитет. Күкүм менен суюктук тегиз аралашсын үчүн күкүмдү аз-аздан кошуп аралаштыруу керек. Адгезор ар түрдүү өңдө чыгарылат: № 1 ак, № 2 сары, № 3 боз-көгүш, № 4 күрөң. Катуу убактысы — 4,5—5,5 мүнөт.

АДГЕЗОР КАРБОФИНЕ — адгезор карбофине. Цинк поликарбонаттуу цемент, тишке жабышкактуулугу менен айырмаланат, ооздон алынбоочу тиш протездерин туруктуу бекитет, күкүм жана суюктуктан турат. Аралаштыруу үчүн 2 ченем күкүм жана 5 тамчы (1 г) суюктук алуу керек, аралаштыруу мөөнөтү 30 сек. Иштөө мөөнөтү 8—10 мүнөт, катуу мөөнөтү 6—8 мүнөт. Чехиянын «Спофа Дентал» фирмасы чыгарат.

АДДУ́КЦИЯ — аддукция. Бери буруу, тартуу, кыймыл-датуу, мисалы, оозду жапканда ылдыйкы жаакты жогору карай кыймылдатуу.

АДЕНОИ́ДЫ — аденоиддер. Алкым бездеринин чоноюп кетиши. Балдардын ар түрдүү жугуштуу ооруларынан жана жогорку дем алуу жолдорунун ар түрдүү сезгенүүлөрүнөн кийин пайда болушу мүмкүн.

АДЕНОКАРЦИНО́МА — аденокарцинома. Эпителийден пайда болгон коркунучтуу бездүү шишик (рак). Көбүнчө чон жана майда шилекей бездеринде пайда болот.

АДЕНО́МА — аденома. Без шишиги, бездүү мүчөлөрдүн (эмчек, боор, бөйрөк, калкан сымал без, жыныс бездеринин) коркунучсуз шишиги.

АДЕНОФЛЕГМО́НА — аденофлегмона. Лимфа түйүнүнүн жана бездеринин ириңдешинен, инфекциянын айланадагы ткандарга таралып, шишитиши.

АДЭ́НТИЯ — тиштин санынын азайуусу. Жаак сөөгүнүн ичинде тиш түйүлдүгүнүн тубаса болбой калышынан тиштин чыкпай калышы ар кандай себептер менен айрым тиштердин же бардыгынын жулунушу.

АДРЕНАЛИ́Н — адреналин. Бөйрөк үстүндөгү бездин гормону. Организмдеги негизги зат алмашуунун жүрүшүн, айрыкча углеводдук алмашууларды тейлейт, чет жакадагы майда кан тамырлардын тарышына алып келгендиктен, артериялык басымды көтөрөт. Ушунун негизинде адреналинди башка дарыларга кошуу менен кан агууну токтотот.

АКВАМЕРО́Н — аквамерон. Эки компоненттүү (күкүм жана суюктук) айнекиономерлүү универсалдуу эмаль менен дентинге жабышкактуулугу өтө күчтүү цемент. Мунун суюктугу тузсуздалган суу, ошондуктан «аква» деген сөз кошо айтылат. Германиядан чыгат.

А́КВА-СЕМ — аква-сем. Айнекиономерлүү өнү ачык цемент. Ооздон алынбоочу жасалма тишти (протезди) жана ортодонтиялык аппараттарды бекитүү үчүн колдонулат. Күкүмү айнектин алюмосиликаты жана полиакрил кычкылынан турат. Суюктугу тузсуздалган суу. АКШда чыгарылат.

АККУМИКС И АККУФЛЕКС — аккумулякс жана аккумуляфлекс. Тиштердин калыбын так алууда кенири колдонулуучу, силикон тобуна кирүүчү массалар. АКШда чыгарылат.

АККУМУЛЯЦИЯ — аккумуляция. Медицинада кээ бир ооруларда, анын ичинде, тиш ооруларында зыяндуу заттардын, дары-дармектин организмде чогулушу.

АКРЕЛ — акрел. Кийме тиштердин негизи болуучу, физикалык жана механикалык касиеттери боюнча башкалардан жогору сапаттагы пластмасса. Күкүмү полиметилметакрилаттан жана дибутилфтолаттан, суюктугу метилметакрилаттан жана басаңдатуучудан (ингибитор) турат.

Acrylic denture base resin пластмассасы стоматологиялык практикада кийме пластиналуу протездерди жамоодо, кийме протездин негизин тактоодо (перебазировка), бетжаак жана ортодонтиялык аппараттарды жасоодо, пародонттун оорусунда ар кандай шакшактарды жасаганда жана башка максаттар үчүн колдонулат. Кытайда чыгарылат.

АКРИЛАТЫ — акрилаттар. Акрил кычкылынын тааал эфири же анын туздары, алардан полиакрилатты синтездешет, стоматологияда кенири колдонулат.

АКРИЛОВЫЕ СТОМАТИТЫ — акрил оозулу. Акрил пластмассадан жасалган кийме тиштердин негизинде мономердин ашыкча болуп калышынан ооздун былжыр чел кабыкчасынын сезгениши. Көбүнчө тиш жасалган пластмассаны полимерлештиргенде анын даярдоо технологиясын бузгандан, б. а. полимерлештирүү тартиби бузулгандан болот.

АКРИЛОКСИД — акрилоксид. Тиштерди кыттоо үчүн колдонулуучу полимерлүү материал. Акрил жана эпоксид чайырларынын (смола) кошулмалары. Акрилоксиддин күкүмү полимерметакрилатка органикалык эмес толуктоочу кошулат, ал эми суюк абалындагысы болсо метилметакрилат, активатор, этил спирти жана эпоксид ашгомеринен турат. Өзүнүн физика-механикалык касиеттеринин жогорулугу, илээшкектиги жана жабышкактыгы менен айырмаланат. Ошондой эле ал өңүн өзгөртпөйт, жеңил иштелет.

АКРОДЕНТ — акродент. Өзү катуучу материал. Акрил-оксид пластмассасына окшош кылып чыгарылат № 10, 12, 16 ак түстөгү 20 г күкүмдөн (полимер) жана 50 г суюктуктан (мономер) турат. Ал убактылуу каптама жасаганда, кийме протездин тиштерин узартканда, пластмассадан жасалган каптаманын кырын тактаганда жана шиш тиштерди жасаганда колдонулат.

АКРОДЕНТ-2 — акродент-2. Жасалма тиштерди жасоодо ооз көңдөйүнүн, жаак сөөгүнүн калыбын алуу, кийме протезди жасаганда беттин ылдыйкы бийиктигин аныктоодо тиштелүүчү валикти жасоо үчүн колдонулуучу материал. Ал карагайдын чайыры, канифоль, стеарин, этилцеллюлоза, жумшарткычтар, толуктоочулар (каолин, ак цинк), боёк, ванилин ж. б. заттардан турат.

АКРОМЕГАЛИЯ — акромегалия. Гипофиз безинин шишигинен жана анын ички секреция кызматынын бузулушунан пайда болгон оору. Акромегалияда колдун, буттун (манжаларынын), ээктин, жаак, мурун жана кулак сөөктөрү өз калыбынан ашкере чоң өсүп кетет. Жаак сөөктөрү өзгөчө өсүп кеткени менен тиштердин көлөмү өзгөрүлбөйт, болгондо арасы ачылып кетет. Тиштин тамырынын учу жооноёт, тилдин көлөмү чоңоёт.

АКРОНИЛ — акронил. Кийме тиш протездин негизин жасоо үчүн колдонулуучу пластмасса, сууну аз сиңирет жана бекемдиги менен айырмаланат. Күкүмүндө поливинилацетат менен метилметакрилат жана суюктугунда метилметакрилат, басаңдатуучу жана токтотуучу заттар бар.

АКРОН М СИ — акрон м си. Акрил пластмассасы: мала кызыл, түссүз жана майда «тамырлуу» болот. Күкүм жана суюктуктан турат. Микротолкун нурунун таасири менен пластмасса суунун ичинде 3 мүнөттө полимерлешет. Микротолкундарды өткөрүү үчүн атайын аспап (кювета) колдонулат.

АКРО-СЕП — акро-сеп. Кийме тиш протездеринин негизи болгон пластмассаны гипстен чектөөчү катмар катары колдонулуучу суюк желим. Жасалма тиштин сырткы бетин тегиз, жылмакай кылат, андан оной сыйрылат. Японияда чыгарылат.

АКР II — акр п. Кийме тиш протези үчүн калып ала турган материал. Тиштери жок жаактарга кийме протездерди жасаганда, ар кимдин жаагынын көлөмү ар башка болгондуктан, стандарттуу ченкеп (орусчасы ложка) туура келбей калышы мүмкүн, ошондуктан үчүн ар бир пациент үчүн калып алынуучу өздүк ченкепти ушул материалдан жасайт, ошондой эле өздүк ченкеп менен калып алып жасалган кийме тиш жакшы кармалат.

АКТИВАТОР ВУНДЕРЕРА — Вундерер активатору. Астыңкы жаак өсүп, мандайкы тиштер алдыга чыгып кеткенде колдонулуучу ортодонтиялык активатор. Жабык түрдөгү каркастуу конструкциядагы активатор үстүнкү жана астыңкы жаактардын каптал тиштери үчүн негиз болот, төмөнкү мандай тиштерге зымдан вестибулярдык дого жана Вазенин атайын бурамасы коюлат. Үстүнкү, астыңкы негиздер атайын бурама менен бириктирилет.

АКТИВАТОР ХОФМАНА — Хофман активатору. Ылдыйкы жаак өтө өсүп, алдыга чыгып калганда колдонулуучу, пластмассадан жасалган ортодонтиялык аппарат. Аппараттын жардамы менен жогорку жаактын өсүшүнө өбөлгө түзүлүп, ылдыйкы жаактын өсүүсү токтотулат.

АКТИВАТОРЫ АНДРЕЗЕНА-ГОЙПЛЯ — Андресен-Гойпль активаторлору. Бул аппарат тиштердин катышынын туура эместигинде колдонулат. Аппарат оозго кийүүчү аппараттарга кирет, үстүнкү жана астыңкы жаактарга жасалат, аларды тиштер тийишкен жерден бириктирет.

АКТИНОМИКОЗ — актиномикоз. Нурлуу (лучевые) микроорганизмдер (грибки) себеп болгон өзгөчө өнөкөт оору. Микроорганизмдер ооз көңдөйүндө, жогорку дем алуу жолдорунда жана ичеги-карында жайгашышат.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ — аллергиялык оозул. Ооздун былжыр кабыкчасынын аллергияга байланыштуу сезгениши.

АЛЛЕРГИЯ — аллергия. Сезгичтиктин жана реактивдүүлүктүн өзгөрүшү, кайсы бир заттарды (дары-дармекти, жакпаган тамакты, белок заттарын) кайталап кабыл ал-

ганда пайда болот. Аллергия оорусунун негизин аллерген менен антидененин ортосундагы реакция түзөт. Антидене — бул глобулиндин өзгөрүлгөн жаңы түрү. Аллергиялык реакция акырын жана тез өтүүчү түрдө болот. Организмдин сезгичтиги өзгөрүлгөн кезде, 5—15 мүнөттүн ичинде болуучу реакцияга анафилаксия, Артюс феномени, Квинке шишиги кирет. Жай болуучу аллергия 5—6 сааттан 3—7 күндүн аралыгында билинет.

АЛОКС — алокс. Жасалма коронкаларды, көпүрөчө жасалма тиштерди жалтыратуу үчүн колдонулуучу жогорку катуулукка ээ болгон антимагниттүү альфа корунд, курамында 99,7% алюминий оксиди бар, көлөмү 50, 100, 250 мкм болгон учтуу курч зат. Германияда чыгарылат.

АЛОЭ — алоэ. Көп жылдык өсүмдүк (лилиялар тукумунан) маныздуу, жалбырактуу 180ден ашык түрү бар. Терапиялык стоматологияда тиштин бүйлөсү жана пародонт ооруганда колдонулат.

АЛУСТРАЛ — алустрал. 99,5% электркорунддан турган, металл куймалардын бетин тазалоодо кум куюлуучу аппараттарда колдонулуучу зат. Германияда чыгарылат.

АЛЬВЕОЛА ЗУБА — тиштин уясы. Жаак сөөктөгү тиштин тамыры туруучу чункур.

АЛЬВЕОЛИТ — альвеолит. Тишти кыйналуу менен тааал жулгандан кийин тиштин тамырынын орду (уясы) болгон жаак сөөгүнүн сезгенүүсүнөн жана ага инфекциянын кирип кетүүсүнөн пайда болот. Ошондой эле жулунган тиштин ордун таза күтпөгөндөн да келип чыгат.

АЛЬВЕОЛОТОМИЯ — альвеолотомия. Жаак сөөктүн альвеола чорчогунун кырын жонуу.

АЛЬВЕОЛЭКТОМИЯ — альвеолэктомия. Альвеола чорчогунун кырын жана тамырлардын ортосундагы тосмолорду кертип алып таштоо.

АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ДУГА — альвеолярдык дого. Жаак сөөгүнүн уландысы, тиштердин жайгашуусунун кыйшыктыгына жараша жаралган дого, ал жерде тиштердин тамырлары орношот.

АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ПИОРРЕЯ — альвеолярдык ириңдөө. Тиштердин тамырларынын айланасындагы байламталардын, жаактын, тиштердин жээгиндеги эттеринин сезгенип, ириңдеп, жоюлуп кетишинен тамырлары ачылып, тиштердин бошоп кетиши. Бул ооруну амфодонтоз деп да атаган, азыркы убакта муну пародонтоз деп айтышат. Бул ооруда бардык тиштер бошоп кетет. Эгерде бир-эки тиш бошосо, анда аны пародонтоз деп айтууга болбойт.

АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК ЧЕЛЮСТЕЙ — жаактардын альвеолалдык жөлөк сөөгү. Жаак сөөгүндөгү тиштин тамырын кармап турууга ыкталган жөлөк сөөк, жаак сөөгүнүн уландысы, кыры. Сөөктүн көлөмү тиштин тамырынын санына жараша болот; бир тамырлуу тиштерде энсиз, эки-үч тамырлуу тиштерде эндүү болот. Тиштер жулунгандан кийин жөлөк сөөк убакыттын өтүшү менен сорулуп, азайып, жоюлуп олтуруп, жокко тете болуп калат.

АЛЬГИДУР — альгидур. Тиштердин, кийме тиш протездери орун алуучу жаактын калыбын алууда керектелүүчү зат. Ал өтө бат жана жай ката турган чыгарылат. Атайын суюктук-басандатуучунун (стабилизатор) жардамы менен пашпай иштөөгө жана моделди көбүксүз, сапаттуу куюуга болот. Австрияда чыгарылат.

АЛЬГИНАТНЫЕ СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — калып алуучу альгинаттуу материалдар. Альгин кычкылынын калий жана натрий туздарынын негизинде жасалуучу ийкемдүү материалдар. Бул топко Стомальгин-73, -02, Новальгин (Россия), Эластик, Гидрогум, Юпен (Чехия), Кромопан, Кромопан-2000, Альгинмакс, Гидрогум (Италия), Дупальфлекс, Триклоральгин, Пальгофлекс, Пальгофлекс-КВИК (Германия), Ортопринт (Польша), Желтрейт, Желтрейт Плюс (АКШ), Альгидур, Протезил, Альгинат (Литва), Херопласт (Китай), Арома файн (Япония) ж. б. көп сандаган массалар кирет. Бул массалар күкүмдөн турат, аны сууга аралаштырып, коюу ботко жасап, металл же пластмассадан жасалган ченкепке салып, тиштерге коюп калыбын алат.

АЛЬТЕРА́ЦИЯ — **альтерация**. Клеткалардын, ткандардын жана органдардын (тиш, тил жана пародонт ж. б.) курамынын өзгөрүлүүсү менен алардын кызматынын бузулушу.

АЛЬФАКО́СТЬ 2 — **альфакост 2**. Алтындын кошундусун куюуда колдонулуучу фосфат-силикаттуу масса, куюлган металл бул массадан оңой ажырайт. Күкүмдөн жана суюктуктан турат. Германияда чыгарылат.

АМАЛЬГА́МА — **амальгама**. Курамында сымап бар бир же бир нече металлдын кошундусу. Амальгама тишти кыттоо үчүн колдонулат.

АМАЛЬГА́МА МЕ́ДНАЯ — **жездүү амальгама**. Жез менен сымаптын кошулмасы, курамында: 32–37% жез, 59–66% сымап жана 2–4% цинк болот.

АМАЛЬГА́МА СЕРЕБРЯ́НАЯ — **күмүштүү амальгама**. Курамында сымап менен металлдардын таарындылары бар куйма (сплав), 68,5% – күмүш, 28% – калай жана 3,5% га чейин жез болот.

АМО́РТИЗА́ТОРЫ — **амортизаторлор**. Урунууну, термелүүнү, басымды жана теңселүүнү басаңдатуучу түзүлүш.

АМО́ЦИД — **амоцид**. Белмөнү жана кийимдерди дезинфекциялап тазалоо үчүн колдонуучу дары. Россияда чыгарылат.

АМПУ́ТАЦИЯ ВЕРХУ́ШКИ КО́РНЯ ЗУ́БА — **тиштин тамырынын учун кесип алып таштоо**. Тиштин коронкасын, тамырын калтырып, тамырынын учун кесип алып таштайт. Бул бир жана көп тамырлуу тиштерде жасалат.

АМПУ́ТАЦИЯ ПУ́ЛЬПЫ — **өзөктү ампутация жасоо**. Тиштин коронка бөлүгүндөгү өзөктү ампутация жасоо, кесип алып таштоо, өзөктүн тамырдын ичиндеги бөлүгү калат.

АНА́ЛЬГИ́Н — **анальгин**. Ооруну басуучу дары. Стоματοлогиялык практикада бет-жаакта ар кандай себептерден улам (тиш оорулары, үчилтик нервдеринин невралгиясы, жара чыгуу, тиш жулунгандан кийин анын уясынын сезгенүүсү ж. б.) болуучу турган ооруну басуу, басаңдатуу үчүн колдонулат. Ошону менен катар премедикация жасарда оорулууну тынчтандыруу жана уктатуу дарыларына кошуп берилет.

АНАМНЕЗ — эске түшүрүү. Оорунун түрүн аныктоо жана белгилерин билүү үчүн оозеки чогултула турган маалыматтар. Анамнез чогулткан кезде, мисалы, кайсы тиш, кантип, кайсы убакта, эмнеден, качантан бери ооруйт деген сыяктуу суроолор менен, кайсы дарылоо ыкмалары туура келе турганы болжолдонот, аныкталат.

АНАСТОМОЗ — **анастомоз**. Кан, нерв жана лимфа тамырларынын операция жолу менен жалганышы.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА — беттин астыңкы үчүнчү бөлүгүнүн анатомиялык түзүлүшү. Алар төмөнкүлөрдөн турат: 1) мурун-эрин бырышы; 2) үстүнкү эрин; 3) фильтр (таноордун ортосунан эрирге чейинки нооча); 4) ооздун жамажайы; 5) эриндердин тийишкен сызыгы; 6) астыңкы эрин; 7) ээктин бырышы.

АНАТОМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРИКУСА БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ — борбордук окклюзия абалындагы тишсиз жаактардын ашташынын (прикусунун) бийиктигин аныктоонун анатомиялык ыкмасы. Бул ыкмада врач тиштери жок жаактарга момдон жасалган валикти негизи менен коюп, жарашабы же жокпу көрөт. Эгерде бет узарып, тартылып калса, валикти кесип төмөндөтөт, төмөн болуп калса валикке кошуп көтөрөт.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРИКУСА БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ — борбордук окклюзия абалындагы тишсиз жаактардын ашташынын бийиктигин аныктоонун анатомиялык физиологиялык ыкмасы. Мында пациенттин оозун атайын ачтырбай же жаптырбай, астыңкы жаакты бош салаңдатып коюу керек. Аны үчүн пациент менен стоматологияга тиешеси жок темада сүйлөшүп, эриндеринин болор-болбос тийишип туруусунда астыңкы жаакты кыймылдатпай туруусун өтүнүп, ээктин астынан таноого чейинки бийиктикти ченеп алуу керек. Бул бийиктик тынчтануунун физиологиялык салыштырма бийиктиги деп аталат. Андан кийин жогорку жаакка жогор-

ку мом валикти негизи менен коюп, каптал бетин кулактын ортосу менен таноонун кырына жарыш кылып жасайт (эки жагын тең), мандайкы бөлүгүн үстүнкү эриндин денгээлинде же 1 мм көрүнүп тургудай кылып тегиздейт, анан астыңкы жаактын мом валигин негизи менен жаакка коюп, валиктерди тиштетип, беттин төмөнкү бөлүгүнүн бийиктигин ченейт. Ошондо бийиктик салыштырмалуу физиологиялык бийиктиктен 1,5–2 мм аз болушу керек. Эгерде мындан көп болуп калса, астыңкы валикти кесүү же жетпесе кошуу керек. Бул ыкма менен туура иштесе каталык өтө аз болот.

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРИКУСА БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ — борбордук окклюзия абалындагы тишсиз жаактардын ашташынын бийиктигин аныктоонун анатомиялык-функционалдык ыкмасы. Ыкмалардын ичинен эң жакшысы ушул, муну Габер сунуш кылган, бирок бул ыкманы ишке ашыруу үчүн атайын аппарат керек, ансыз болбойт.

АНАФИЛАКСИЯ — анафилаксия. Денеге жат белокту кайталап куйганда байкалуучу ооруксунуу абалы. Мисалы, вакциналар, сывороткалар куюлганда, жат белокту (антиген) куйганда организм аны кээде оор кабыл алат. Тубаса анафилаксия идиосинкразия деп аталат.

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК — анафилактикалык сокку. Аллергиялык оорунун эң оор түрү. Соккунун себептери: дарылоо максатында денеге куюлган ар түрдүү дарылар, вакциналар, сывороткалар, ошондой эле ар кандай жаныбарлардын тиштеши, чагышы ж. б.

АНГИНА — басма. Алкым бездеринин былжыр кабыкчасынын жана анын лимфоиддик ткандарынын сезгениши. Аны жугуштуу стрептококк, стафилококк, дифтерия таякчасы ж. б. ириңдетүүчү микробдор козгойт.

АНЕСТЕЗИН — анестезин. Ооруган жерди баса турган дары. Ал дары күкүм, таблетка, эритме жана май түрүндө болот.

АНЕСТЕЗИЯ — жансыздандыруу. Ар түрдүү жансыздандыргычтар (анестетиктер) менен (2,0% дуу новокаин, 1,0% дуу тримекаин, 2,0% дуу лидокаин, 1,0% дуу рихлокаин 2% дуу септанест, 4% дуу убистезин ж.б.) белгилүү бир жерди жансыздандырса, былжыр кабыкчага же териге ийне сайылат, бул жергиликтүү анестезия (местная анестезия), ошол эле жерди жансыздандырат, ал эми импульс өткөрүүчү нерв бутагы аркылуу жансыздандыруу өткөрүүчү анестезия (проводниковая анестезия) деп аталат. Өткөрүүчү анестезияда ошол нерв тараган тери, былжыр кабыкча, сөөк, тиштер бүт жансыз болуп калат. Ал эми өтө коркок адамдарга жалпы наркоз берүү менен тиштерди жулуу, өгөө, жонуу, дарылоо иши жүргүзүлөт.

АНКИЛОЗ — сенек. Кыймылсыздыктан, муундун бүтүндүгүнүн бузулушунан пайда болуучу оору. Астыңкы жаак сынганда үстүнкү жаак менен бириктирип шакшактап, узакка калтырса сенек болот. Кол, бут сынганда коюлган таңуу көпкө чейин алынбаса, муундарды байланыштыруучу тарамыштар менен кемирчектер катууланып, сөөккө айланып, муундун кыймылы жоголот.

АНКИЛОЗ ВИСОЧНО-ЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА — чыкый-астыңкы жаак муунунун сенектиги. Бул оору көбүнчө катуу урунгандан (травмадан) пайда болот. Ал жарым сенек жана толук сенек болушу мүмкүн, ошондой эле бир жактуу жана эки жактуу болот.

АНОМАЛИЯ — аномалия. Тиштердин, жаак сөөгүнүн туура эмес өсүшү же кыйшыктыгы. Аномалия тиштердин өсүүсү, өнү, көлөмү, жайгашкан орду, түзүлүшү, саны, формасы, тиштердин катышы, чыгуу мөөнөтү боюнча ар кандай абалда болот.

АНОМАЛИЯ ПРИКУСА — тиштердин катарларынын катышынын, ашташынын кыйшыктыгы. Үстүнкү жана астыңкы тиштердин катарларынын өз ара катышынын шайкеш келбегендиги, туура эместиги.

АНТИВЕРСИЯ — антиверсия. Алдыга карай орсок-терсектик, мисалы, тиштердин алдыга кыйшаюусу.

АНТИДОТ — антидот. Ууга каршы дары. Мисалы, тиштин өзөгү сезгенгенде аны жансыздандыруу үчүн колдонулуучу мышьяк пастасынан ууланганда, ага каршы унитиол деген дары колдонулат. Унитиол магний кычкылы менен йоддун тундурмасынан турат. Дагы бир мисал, кийме тиштерди жаакка жакшы карматуу үчүн тез катуучу атайын пластмассаны аралаштырып даярдап, протездин ички бетине бир кабат жабыштырып, оозго коет, ошондо пластмассанын суюктугу (мономер) былжыр чел кабыкчаны күйгүзө баштайт. Мономердин күйгүзүү таасирин токтотуу үчүн соданын эритиндиси менен оозду бат-бат чайкоо керек.

АНТИМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ — микробдорго каршы агенттер. Микробдордун көбөйүшүнө тоскоол болуучу полимер материалдардын курамындагы кошулмалар.

АНТИСЕПТИКИ — антисептиктер. Жарааттын жана анын тегерегиндеги ткандардын ириндөөсүнө каршы колдонулуучу, ириндетүүчү бактерияларды өлтүрүүчү химиялык заттар.

АНТИОКСИДАНТЫ — антиоксиданттар. Стоматологиялык түшүнүктө полимерлердин эскирүүсүнө тоскоолдук кылуучу кычкылданууга каршы табигый же синтетикалык заттар.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ — антропометриялык божомолдоолор. Кийме тиш протезине жасалма тиштерди туура коюу үчүн үч сызык жасоо керек: 1) борбордук сызык; муну туура белгилеш үчүн таноодон эринге чейинки оюктун ортосу аркылуу үстүнкү эриндин ортосундагы дөмпөктү жана үстүнкү эриндин чектөөчүсүн бириктирип, бетти экиге бөлүү керек. Пайда болгон сызык боюнча мом валикке тик сызык белгилейбиз; 2) кылкыйма сызыгы; көздүн кареги жана таноонун четки кыры боюнча жогорудан ылдый карай түшкөн эки тик сызыкты байкап, ошолордун ортосуна тик сызыкты болжолдосо, кылкыйма тиштин дал ортосу менен өтөт; 3) жылмаюу сызыгы; мында пациент жылмаюу жасайт, ошондо үстүнкү эриндин ылдый жагынан түз сызык жүргүзүлөт. Бул жасалма тиштин бийиктигин көрсөтөт. Мунун максаты — чоң кишиге майда тишти, кичине пациентке чоң тиштерди коюп койбоо.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРИКУСА БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОКЛЮЗИИ — борбордук окклюзия абалындагы тишсиз жаактардын ашташынын (прикусунун) бийиктигин аныктоонун антропометриялык ыкмасы. Мында пациенттин бетин бирдей үч бөлүккө бөлүү керек: 1) маңдайкы, жогорку бөлүгү — чачтын четинен каштардын ортосуна чейин; 2) каштардын ортосунан таноого чейин; 3) таноодон ээктин астына чейин. Бул европеоиддерге туура келүүчү ыкма. Биздин элдин маңдай бөлүгү көбүнчө кууш келет. Анын үстүнө биздин пациенттердин көбү улгайган адамдар болгондуктан, чачтары түшүп, бул үч бөлүк бири-бирине шайкеш келбей калат. Ошондуктан башка ар кандай ыкмалар сунуш кылынган: Уайт-Водсворд ыкмасы боюнча көздүн кареги менен ооздун жамажайынын бийиктиги таноо менен ээктин астынын бийиктигине барабар болушу керек. Юпитц циркулу менен аныктоо. Беттин ылдыйкы бөлүгүн аты жок манжанын бийиктигине, кулак калканынын узундугуна тең кылуу. Бул ыкмаларда каталыктар көп болгондуктан, кенири колдонулбайт.

АПЕКС — апекс. Тиштин тамырынын учу.

АПЛАЗИЯ — аплазия. Дененин сырткы же ички бир мүчөсүнүн да тубаса жок болушу. Стоматологияда тиштин же анын эмалынын тубаса жок болушу.

АППАРАТ ГР-2 (ГАЛЬВАНИЗАТОР РОТОВОЙ) — ГР-2 аппараты (ооз гальванизатору). Бул аппарат менен тиш ооруларын гальванизация жана электрофорез мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп дарылайт.

АППАРАТ д'АРСИССАКА — д'Арсиссактын аппараты. Урунуп-согулуудан кийин дарылаганда чыккый-астыңкы жаак мууну сенек болуп катып калбасын үчүн колдонулуучу дарылоо гимнастикалык аппарат.

АППАРАТ БОЙСЛЕРА И ШРЕДЕРА — Бойслер жана Шредер аппараты. Жасалма тиш тизмегинен жана кашпадан турган, ооздон алынбоочу ортодонтиялык механикалык аппарат. Катуу таңдайдын ортоңку жигин кенейтүүгө арналган.

АППАРАТ ДЖОНСОНА — **Жонсон аппараты.** Кыйшык тиштерди, жаак сөөктөрдү ондоочу аппараттардын бир түрү.

АППАРАТ ДКС-2М (ДИАТЕРМОКАОГУЛЯТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ) — **ДКС-2М аппараты (стоматологиялык диатермокаогулятор).** Жогорку жыштыктагы өзгөрүлмө токту пайдалануу аркылуу бүйлөдөн аккан канды коагуляция (күйгүзүү) жасап токтотуучу аппарат. Ошондой эле тиштин эти ашыкча өсүп, кайсы бир иштерге жолтоо болуп жатса, аны да ушул аппарат менен күйгүзүп алып таштоого болот.

АППАРАТ ЛАРИНА — **Ларин аппараты.** Тиштери жок жаактарга кийме тиштерди жасоодо жасалма тиштердин катарын туура коюу үчүн керектүү мейкиндикти табууда колдонулуучу аспап.

АППАРАТ ЛИТЕЙНЫЙ — **куюу аппараты.** Тиштин ар кандай бөлүктөрүн куюуда керек болуучу аспап. Алды менен металлдын кошулмасын эритип, анан калыпка куюшат. Куюу аспабы негизинен электр мешинен жана вакуум үйлөткүчүнөн турат.

АППАРАТ «ЛУЧ-2» — **«Луч-2» аппараты.** Дарылоо касиетине ээ микротолкун нурларын чыгаруучу стоматологиялык аппарат. Тиш, жаак сөөк жана пародонт ооруларын дарылаганда кан менен лимфанын айланышын тездетип, зат алмашуу процессин жакшыртат, ткандардын коргонуу касиетин күчөтөт.

АППАРАТ ЛУРИ — **Лури аппараты.** Үстүнкү маңдай тиштер эринге карай кыйшайып, орсойуп калганда, аларды ооз жакка карай жылдыруу үчүн колдонулат.

АППАРАТ МЕРШОНА — **Мершон аппараты.** Жаак сөөгүн кеңейтип, тиштерди ордуна келтирүүдө колдонулуучу ортодонтиялык аспап.

АППАРАТ НАРКОЗНЫЙ — **наркоз аппараты.** Жасалма уктатуучу, наркоз берүүчү курал. Организмдин кээ бир жеринин же бүткүл организмдин бардыгынын сезүүсүн убактылуу жоготуу үчүн дары-дармекти берүүдө колдонулат. Наркоз менен уктаган адам кыймылдабайт, кескенди, сой-

гонду сезбейт, булчуң эттери жыйрылбай, операция жасоого тоскоолдук болбойт.

АППАРАТ ОКСМАНА — Оксман аппараты. Жаак сөөгү сынып, сөөктө кемтик пайда болгондо колдонулуучу, ж.б. көп кызмат аткаруучу аспап.

АППАРАТ ПЕТРОСОВА — Петросов аппараты. Чыккы-астыңкы жаак муунунун көнүмүш чыгып кетүүсүн болтурбоочу аппарат. Аны менен оозду чоң ачырбай, чектөө коюлат.

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ — рентген аппараты. Рентген шоолалары, нуру аркылуу сүрөткө тартууга арналган аспап.

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ — тиштин рентген аппараты. Тиштерди, жаак сөөктөрдү рентген нуру менен сүрөткө тартуучу курал.

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ПАНОРАМНЫЙ — панорамалуу тиш рентген аппараты. Үстүнкү жана астыңкы жаактарды тиштери менен чоңойтуп жалпы сүрөткө тартуучу аспап.

АППАРАТ РЕПОНИРУЮЩИЙ А. Я. КАТЦА — А. Я. Катцтын калыптандыруучу аспабы. Жаак сөөгү сынып, сыныктары бири-бирине дал келбей калганда бар тиштерге шакек, каптама жасап, аларга түтүкчөнү ширетип көтөрүү үчүн (рычаг катары) колдонулуучу аспап.

АППАРАТ РЕПОНИРУЮЩИЙ В. Ю. КУРЛЯНДСКОГО — В. Ю. Курляндскийдин калыптандыруучу аспабы. Жаак сөөгү сынып, кемтик пайда болгондо тиши бар же жок жаак сөөктөрүнүн сыныктарын ордуна келтирүүчү бурамалуу аспап.

АППАРАТ РЕТЕНЦИОННЫЙ — токтоткуч аппарат. Тиштерди ордунан жылдырбай туруучу жана ортодонтиялык дарылоодон кийин жылдырылган тиштерди жана өстүрүлгөн жаакты кайра артка кетирбес үчүн колдонулуучу аспап.

АППАРАТ В. В. РУДЬКО — В. В. Рудьконун аппараты. Сынган жаак сөөктү ордуна тууралап салгандан кийин, аны сыртынан карматып коюучу аспап.

АППАРАТ САМСОНА — Самсон аппараты. Чоң көлөмдөгү металл гильзаларды ырааттуулук менен кичирейтүүчү аспап.

АППАРАТ «УЛЬТРАЗВУК» — «Ультрадабыш» аппараты. Бул аппарат менен неврит, невралгия, кызыл ээк, тил ооруларын, беттин тыртыктарын дарылоого болот. «Ультрадабыш» аркылуу ткандарга дары-дармек сиңдирүү ультрофонофорез деп аталат. «Ультрадабыш» менен азыр стоматологияда йод, кальций ж. б. дарыларды сиңдиришет. Ультрадабыштын негизинде жасалган «Ультрастом» аппараты менен тиштердин ташын алууга болот.

АППАРАТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БУНИ — Бунни функционалдык аппараты. Ылдыйкы жаак өтө өсүп кеткенде колдонулуучу ортодонтиялык аппарат, ал оозго кийме болот.

АППАРАТ ХОДОРОВИЧ-БУРГОНСКОЙ — Ходорович-Бургонская аппараты. Чыкый-астыңкы жаак муунунун көнүмүш чыгып кетүүсүндө оозду чоң ачырбай, чектеп туруучу аппарат.

АППАРАТ ХОРОШИЛКИНОЙ — Хорошилкина аппараты. Бул эки бөлүктөн турган ортодонтиялык аппарат. Жогорку жаактын тандайынын ортосундагы бириктирген жикти ажыратып, кеңейтип, туура эмес чыккан тиштерди ондоого мүмкүнчүлүк берет.

АППАРАТ ХУРГИНОЙ — Хургина аппараты. Тиштердин катарын кеңейтүүдө колдонулуучу аспап. Тандайга коюлат, ортосунда кеңейтүүчү бурамасы бар.

АППАРАТ ЭЙНСВОРТА — Эйнсворт аппараты. Тиштердин катарында өспөй калган жерин гана кеңейтүүчү аппарат. Аспап таянып туруучу шакек же каптамадан турат, шакек же каптамага түтүк ширетилет, ага серпилмелүү (пружиналуу) догону киргизет. Серпилмелүү догонун түздөлүү аракети тиштерди ордунан керек жакка жылдырат.

АППАРАТ ЭЛОЗ-1 — ЭЛОЗ-1 аппараты. Тиштерди өгөгөндө ушул аппарат иштеп чыккан туруктуу токтун дене аркылуу өтүүсү менен пациент ооруну сезбейт, жумуш сапаттуу бүтөт.

АППАРАТ ЭНГЛЯ — Энглдин аппараты. Тиштер туура эмес чыгып, катары туура эмес, кыйшык болгондо колдо-

нулуучу механикалык аппарат. Эки учунда шакектери жана бурамалары бар. Шакектерди алтынчы тиштерге кадап бекитип, бурамаларды бурап тиштердин катарын кеңейтип, туура эмес турган тиштер ордуна келтирилет.

АППАРАТЫ ЗАМЕЩАЮЩИЕ — орун толуктоочу аппараттар. Бет, жаак сөөктөрү, тиш, тиштин катары жок болгондо ордуна коюлуучу аппараттар.

АППАРАТЫ ИСПРАВЛЯЮЩИЕ — ондоочу аппараттар. Ооздун сыртындагы ондоочу бурамалары менен тишти, тиштин тобун, жаактын альвеола бөлүгүнүн сөөгүн туура абалга келтирет.

АППАРАТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ — бириктирилген аппараттар. Бир нече кызматты аткаруучу аппараттар. Мисалы, ондоочу-бекемдөөчү жана механикалык-функционалдык принципте иштөөчү аппараттар болот.

АППАРАТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ — механикалык принципте иштөөчү аппараттар. Бул аппараттарда ортодонтиялык күч конструкциянын өзүндө жайгашкан, ал чайноо булчундарынын иштөөсүнө көз каранды эмес. Иштетүүчү күч катары серпилгич дого, серпилгич ором, резина жана бурамалар кызмат кылат.

АППАРАТЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ — багыттоочу аппараттар. Айдош тегиздиги бар аппарат, анын жардамы менен тиш же сөөктүн сыныгы керектүү багытта жылдырылат.

АППАРАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ — ортодонтиялык аппараттар. Туура эмес өскөн тиштер, тиштердин катарын жана тиштердин ашташын, жаак сөөгүн ондоочу аппараттар. Алар жумшаган күчүнө карата механикалык, функционалдык, бириктирилген (бир аппаратта механикалык да функционалдык да таасир этүүчү күчтөр болот) жана ретенциялык (ортодонтиялык дарылоонун натыйжасында болгон өзгөрүүлөрдү бекемдөөчү) болуп бөлүнөт.

АППАРАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ СЪЁМНЫЕ — пластиналуу кийме ортодонтиялык аппараттар. Кыйшык чыккан тиштерди ортодонтиялык жол менен ондоодо колдонулуучу оозго кийме аппараттар.

АППАРАТЫ РАЗОБЩАЮЩИЕ — бөлүп туруучу аппараттар. Бул аппараттар обтуратор деп аталат, алар ооз көндөйү менен мурун көндөйүн бөлүп турат.

АППАРАТЫ ФИКСИРУЮЩИЕ — бекемдөөчү аппараттар. Ортодонтиялык дарылоодон өтүп, жаак сыныктары ордуна коюлгандан кийин, аларды бекемдейт.

АППАРАТЫ ФОРМИРУЮЩИЕ — кейиптөөчү аппараттар. Бетке пластикалык операция жасаганда таяныч болуп, бет түзүлүшүн оңдойт.

АППАРАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ — функционалдык талапта аракеттенүүчү аппараттар. Бул аппараттарда ортодонтиялык күч конструкциянын өзүндө эмес, чайноо булчундарынын иштөөсүнө жараша болот. Булчундар иштегенде ал жантык тегиздик менен тишти керектүү багытта жылдырат.

АППАРАТЫ ЭОМ-3 (ЭЛЕКТРООДОНТОМЕТР), ЭОД (ЭЛЕКТРООДОНТО-ДИАГНОСТИКА) — ЭОМ-3, ЭОД аппараттары. Тиштердин нервинин соо же оору экени аныктай турган аспап. Соо тиштер күчү 3–6 мкА болгон токту сезет. Тиштин өзөгүнүн сезгичтиги төмөндөгөн болсо, анда ал тиш кайсы бир оорунун таасиринен жабыркаган болот.

АПЛИКАЦИЯ — бастырма. Ар кандай дары-дармектерди ооруган жерге коюу. Мисалы, тиштердин эти сезгенгенде рапин, парафин, бутацион майларын кебезге же бинттин үзүндүсүнө синирип, шишиген жерге басып коюу.

АРГИЛ — аргил. Ооздон алынбоочу тиш протездерин туруктуу бекитүү үчүн колдонулуучу цинк-фосфаттуу цемент, күкүм жана суюктуктан турат. Күкүмүнө күмүш кошулат, бактериостатикалык касиетке ээ. Ак, сары, боз-көгүш, күрөң түстө болот.

АРОМА ФАЙН — арома файн. Ооздон алынбоочу жана жасалма кийме тиштерди жасоодо калып алуу үчүн колдонулуучу материал. Альгинат тобуна кирет. Японияда чыгарылат.

АРТИКУЛЯТОР — артикулятор. Астыңкы жаактын кыймыл-аракетин (жогору, төмөн, алдыга, артка, сол жакка, оң жакка) так кайталап бере турган аспап. Артикуля-

тор көбүнчө тиштер толук жулунуп, кийме тиш жасаганда колдонулат.

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ БУМАГА — артикуляциялык кагаз. Калыңдыгы 200 мкм болгон эмаль, дентин, металл, фарфор, пластмассанын бетине так калтыруучу кагаз. Көк жана кызыл түстө болот. Үстүнкү жана астыңкы тиштердин катарынын катышын текшерүүдө колдонулат. Мындай кагаздардын түрлөрү көп. Мисалы, АРТИ-ФОЛ калыңдыгы 8 мкм, эки жагына сууну сиңирүүчү мом жабыштырылган, эни 22 мм болгон чыгырыкка оролгон түрдө чыгарылат, ал кара, кызыл, жашыл, көк түстө болот. СЛ артикуляциялык кагазы көк түстө, мом жабыштырылып, узундугу 80 мм, эни 22 мм болуп, чыгырык түрүндө чыгарылат. Калыңдыгы 40 мкм болгон артикуляциялык кагаз тиштердин катарындагы биринчи тийишкен тиштерди табуу үчүн чыгарылат, анын эни 22 жана 16 мкм болот. МЕДСТАР — калыңдыгы 40 мкм кызыл жана көк түстө болот; фарфордон жасалган коронкалардын карама-каршы турган тиштер менен тийишип ашташуусун текшерүүдө кызыл кагазда колдонулат, ал эми көк кагазда темирдин оксиди бар болгондуктан фарфорго эмес, башка материалдарга колдонулат, фарфорго боёгу сиңип, өңү өзгөрүлүп калат. АРТИЛОН — негизи нейлондон турат, эни 70 мм, өңү кызыл, жашыл, көк түстө чыгарылат, тиштердин тийишүү бетин аныктоодо колдонулат. Бардыгы Германияда чыгарылат.

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ПЯТЁРКА ГАНАУ — Ганаунун артикуляциялык бештиги. Алар төмөнкүлөр: 1) кескич тиштердин сагитталдык жолу; 2) муундун сагитталдык жолу; 3) чайноо тиштеринин дөмпөктөрүнүн билинүүсү; 4) Шпее кыйшыктыгынын, үстүнкү маңдай тиштердин кыйшаюусунун билинүү даражалары; 5) муун жолунун кыйшаюу даражалары.

АРТИКУЛЯЦИЯ ЗУБОВ — тиштердин артикуляциясы. Тамак жегенде, тиштегенде, чайнаганда, жутканда, ошондой эле ырдаганда, сүйлөгөндө ылдыйкы жаактын жогорку жаак менен болгон байланыш кыймылынын аралыгы.

Артикуляция ЧЕЛЮСТИ — жаактын артикуляциясы. Астыңкы жаактын үстүңкү жаакка карата болгон ар кандай кыймылы: тамакты тиштегенде, чайнаганда, жутканда, ошондой эле ырдаганда, күлгөндө, сүйлөгөндө астыңкы жаактын үстүңкү жаак менен болгон аралык катышы. Астыңкы жаактын бардык кыймылы бири-бирине менен кесилишкен үч тегиздикте болот: фронталдык, сагитталдык жана горизонталдык.

АРТРАЛЬГИЯ — артральгия. Муундун оорушу. Бул термин 1848-жылдан бери колдонулат.

АРТРИТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА — чыккый-астыңкы жаак муунунун сезгенүүсү. Сезгенүүнүн себептери ар кандай. Убагында дарыласа, бат айыгып кетет.

АРТРОЗ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА — чыккый-астыңкы жаак муунунун чордонушу. Сезгенүү оорусу узакка созулуп, өнөкөткө айланганда пайда болот. Мындай абалда ооруйт. Астыңкы жаакты кыймылдатканда катуу ооруйт, күчөйт. Муундун башы өзгөрүп, жылмакай болбой, убакыт өткөн сайын татаалдаша берет. Бул ооруда жаакты ачып, жапканда чыккыйда кырсылдаган үн чыгып турат, ооруйт. Бара-бара муун аралыктары кичирейип муунду түзүп турган ткандар ката баштайт.

АРТРОПАТИЯ — артропатия. Жалпы эле муун ооруларын туюнткан жалпы түшүнүк.

АСЕПТИКА — асептика. Операцияда, жараны дарылоодон колдонулуучу аспаптарды тазалоо аркылуу жараны ырбап, күчөп кетүүдөн сактоо. Асептика ар кандай жол менен ишке ашат: физикалык (сууда кайнатуу, автоклавда жогорку ысыктыкта буулоо ж. б.) жана химиялык (карбол кычкылы, хлорамин, спирт ж. б.).

АССИМЕТРИЯ ЛИЦА — беттин кыйшыктыгы. Беттин оң жагы менен сол жагынын дал келишпестиги бири-бирине окшошпогондугунан көрүнүп, билинип турушу. Бул тубаса, тукум куучулук же ар кандай себептерден улам пайда болот. Мисалы, дайыма бир жак менен гана чайнай берсе, ошол жактын тиштери жешилип, чайнабаган жактын тиштери жешилбей, жаак чайнаган жакка кыйшайт.

АСФИКСИЯ — тумчугуу. Аба өтүүчү жолдордун жабылышынан адамдын тумчугуп калышы. Баштын бет бөлүгүнө ар кандай доо кетүүнүн натыйжасында болот: ок жеп жараат алгандан, бет менен тамактын айланасынын ириндеп, сезгенүүсүнөн, бет-жаактагы чоң операциядан кийин болушу мүмкүн.

АТТАЧМЕНЫ — аттачмендер. Ооздон алынуучу кийме тиш протезин жасаганда колдонулуучу ашык-машыкка окшош тетик. Бул пародонту ооруган тиштерди бириктирүүдө, доголдуу же көпүрөчө сыяктуу тиш протездерди ооздо жакшы карматыш үчүн пайдаланылат.

АТТАЧМЕН РООХА — Роох аттачмени. Тамакты чайнаганда тик басымда майдалоочу шарга окшош курал.

АТЕРОМА — атерома. Май бездеринин кызматынын бузулушунан пайда болгон сары суулуу шишик. Ал баштын жана беттин терисинде болот. Эгерде инфекция кошулса ириндеп кетет.

АТРОПИН — атропин. Мендубана сыяктуу уулуу өсүмдүктөрдөн алынуучу алкалоид. Стоматологияда шилекей бөлүп чыгарууну тездетүүдө жана операция жасар алдында премедикациялык максат үчүн колдонулат.

АТРОФИЯ — жоюлуу. Органдардын же ткандардын клеткаларынын азыктанышынын бузулгандыгынан же органдардын, ткандардын ар түрдүү себептер менен басылып же кысылып калышынан алардын көлөмүнүн кичирейиши. Физиологиялык же патологиялык жоюлуу болот. Мисалы, жаш өткөн сайын тиштердин этинин качышы бул физиологиялык атрофия, ал эми жаштарда тиштердин эти сезгенүүдөн азайып, жоюлуп кетсе бул патологиялык атрофия деп аталат.

АУРИТ — аурит. Курамы кристобалиттин, гипстин күкүмдөрүнүн кошулмаларынан турган аралашма. Суу менен аралаштырылып, алтындын кошулмасын куюу үчүн колдонулат.

АУТОГЕМОТЕРАПИЯ — аутогемотерапия. Ооруган адамдын кан тамырынан канын алып, булчунунун ичине (көбүнчө жамбашка) же теринин алдына куюу аркылуу дарылоо.

АФОНИЯ — афония. Тамактын же нерв системасынын ооруларынын натыйжасында үндүн жок болуп калышы.

АФТА — оюк жалак жара, ыйлаакча. Ооз ичиндеги былжыр чел кабыкчага чыга турган жара. Анын формасы төгөрөк, узун келип, бети кызарып, айланасы канталап турат. Сүйлөгөндө, тамак жегенде тил тийип, шилекей жабышып ооруйт. Бул жара көбүнчө тил, таңдай, уурт, эрин жана алкымда болот.

АФФИНАЖ — тазалоо. Асыл металлдарды (алтын, платина, күмүш) жогорку тазалыкта (проба) башка кошулмалардан ажыратып алуу ыкмасы. Ортопедиялык стоматологияда алтындын ылдыйкы тазалыктагы (3750, 5830) аралашмаларынан күмүштү жана жезди ажыратып, жогорку (9000, 9160) белгини алуу үчүн колдонулат.

АХД 2000 — СПЕЦИАЛЬ и ЛИЗАНИН – АХД 2000 – специаль жана лизанин. Колго сыйпалуучу тери антисептиктери.

АЦ-1 ЛАК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ — чектөөчү АЦ-1 лак. Ацетил целлюлозанын ацетондогу эритиндиси. Ацетондун учуп кетүүсүнүн натыйжасында гипстин бетинде жука чектөөчү катмар пайда болот да, гипске башка эч нерсе жабышпайт.

Б

БАББИТЫ — баббиттер. Металлдардын стоматологияда колдонулуучу женил эрүүчү кошулмасы, тиш салуу техникасында металл штамптарды жасоодо колдонулат. Курамында 12 бөлүк цинк, 3 бөлүк сурьма, 2 бөлүк жез бар. Эрүү температурасы 220°С.

БАЗАЛЬНАЯ ДУГА — негизги дого. Тиштердин тамырынын учунун денгээлинде үстүнкү жана астыңкы жаактардын сырткы бетинен өтүүчү ийри сызык.

БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА — негизги мембрана. Ооз ичиндеги эпителий менен бириктиргич ткань арасындагы ичке аргирофилдүү талчалардан турган чел кабык.

БА́ЗИС ПРОТЕ́ЗА — протездин негизи. Оозго кийме тиштин негизин түзөт, жасалма тиштерди, илмектерди кармап турат. Көбүнчө жасалма тиштин негизин пластмассадан жасашат, кээ бир убакта анын металлдан жука жалпак түрүн да жасашат. Металлдан жасалган негиз жука пластинка болуп, ооздо орунду аз ээлеп, сүйлөгөнгө, тамак жегенге ыңгайлуу келет. Бирок металлдан протездин негизин жасоо кыйын, пластмассадан жасоо оңой. Пластмасса негизге деле адам бат көнүп кетет, көнүү мөөнөтү В. Ю. Курляндский айткандай 3 күндөн 31 күнгө чейин.

БА́ЗИСЫ С ПРИКУСНЫ́МИ ВА́ЛИКАМИ — негиздеги тиштетүүчү момдуу валиктер. Жаактарда тиштер аз болуп же жок болгондо беттин астыңкы бөлүгүнүн бийиктигин туура аныктоо үчүн альвеола сөөгүнүн бетине болочок протездин чек арасына тууралап, момдон негиз жасалат. Анан альвеола сөөгүнүн кырынын ортосуна туурасы 1 см, бийиктиги каптал жакта 1 см, мандайда 1,5 см болгон момдон валик жасалып, бириктирилет.

БАКРИЛ — бакрил. Жогорку катуулуктагы акрил пластмассасы, кийме тиштер үчүн негиз болуп колдонулат. Жарака кетүүгө, сүрүлүүгө, урунууга туруктуу бышык материал. Күкүмү өзгөчөлөнгөн эластомери бар полиметилметакрилаттан, суюктугу метилметакрилаттан турат.

БАЛЛОНИ́РУЮЩАЯ ДЕГЕНЕРА́ЦИЯ — баллон түрүндөгү ыдыроо. Ооз ичиндеги сырткы чел кабык (эпителий) клеткаларынын биригип туруучу байламталарынын бузулуп ажырашы, кээ бир убакта ал байламталардын өз ара биригип калышынын натыйжасында ыдыроо пайда болот.

БАЛО́ЧНОЕ КРЕПЛЕ́НИЕ ПРОТЕ́ЗА — протезди тосун менен бекитүү. Тиштердин катарынын кемтиги пайда болгондо, кемтикти чектеп турган тиштерге жасалма каптама жасап, ортосуна металлдан төрт кырдуу же тоголок тосунду ширетет. Анын үстүнө оозго кийме тиш протезди жасашат. Муну биринчи болуп, Румпель сунуш кылган.

БАРЛОВА БОЛЕ́ЗНЬ — Барлов оорусу. 6 айдан 2 жашка чейинки курактагы жаш балдардын тиштеринин С ви-

тамининин жетишсиздигинен болгон оорусу. Мында ооздун ичиндеги былжыр кабыкча шишип, кызарып эң сырткы чел кабыгы (эпителий) түлөйт, тил кыпкызыл, кургак, жалтырак болот. Балага узак убак уйдун сүтүн же витамини кем ундан жасалган тамак бергенде пайда болот.

БЕГОДУР — бегодур. Өтө катуу гипс, α – жарым гидрат, катуу убактысы 8–10 мүнөт, кеңейүүсү 0,07%, 1 сааттан кийин басканда катуулугу 30 н/мм.

БЕГОСТАЛ — бегостал. Асыл металлдын куймасын эритип куюуда форма жасоо үчүн колдонулуучу материал. Ушуга окшош дистирленген сууга аралаштырылуучу АУРОВЕСТ СОФТ, ДЕГУВЕСТ СОФТ жана ДЕГУВЕСТ НFG деген массалар бар. Бардыгы Германияда чыгарылат.

БЕДНАРА АФТЫ — Беднар ыйлаакчалары. Бул оору эмчектеги жаш балдардын таңдайындагы былжыр чел кабыкчада пайда болот. Таңдайда симметриялуу жайгашкан, орто ченинде саргыч өңдүү ыйлаакча пайда болот. Тамактанууда оорутат. Жеңилдетүү үчүн 10% анестезиндин эмульсиясын бастыруу, жабыштыруу керек, 10% лидокаиндин аэрозолун чачуу керек.

БЕЙСИК — бейсик. Үч катмарлуу пластмассадан жасалган тиштер, катмарлары тиштин моюнча жагында, дентин жана эмаль катмарында болот.

БЕЛАГЕЛЬ О — белгель О. Тиштин эмаль катмарын агартуу, фторлоо жана сезгичтигин азайтуу үчүн колдонулуучу бир нече килкилдектен турган пастадай зат. Россияда чыгарылат.

БЕЛАДОНТ — беладонт. Стоматологиялык кыттоочу цемент. Россияда чыгарылат.

БЕРНАРА ТОКИ (ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ) — Бернар токтору. Жыштыгы 50 жана 100 Гц болгон туруктуу токту дарылоо үчүн колдонулуучу жарым синусоидалык импульстары. Француз стоматологу Р. Бернар (1929) биринчи ойлоп таап, неврит, невралгия, глоссалгия ж. б. ооруларды дарылоо үчүн колдонгон.

БИ КРАУН МОЛЯР КИТ — би краун моляр кит. Убактылуу жасалма азуу каптамаларды жасоо үчүн поликар-

бонаттуу нейлондон жасалган азуу тиш комплекти. Муну тиштерди өгөп, калыбын алгандан кийин, ошол эле убакта кайчы же курч скальпель менен туура келтирип кесип, убактылуу бекитип коёт. Туруктуу каптама бүткөнчө пациент тамакты чайнап жей берсе болот. АКШда чыгарылат.

БИОКРОН, БИОПЛЮС — биокрон, биоплюс. Кийме тишке коюлуучу жасалма тиштер, алар акрил пластмассасынан жасалат. АКШдан чыгат.

БИОПСИЯ — биопсия. Оорунун түрүн (диагнозун) аныкташ үчүн тирүү тканды кесип алып гистологиялык жол менен изилдөө.

БИОСТАБИЛ, АРТИПЛЮС — биостабил, артиплюс. Кийме тиштердин азуу тиштерине коюлуучу акрил пластмассасынан жасалган жасалма тиштер. АКШда чыгарылат.

БИОСТИМУЛЯТОРЫ — биостимуляторлор. Биологиялык күчтөндүргүчтөр, организмдеги зат алмашуу процессин жөнгө салып, организмдин күч-кубатын арттырат. Буга өсүмдүктөрдөн, жаныбарлардан алынуучу заттар кирет. Азыр БАД биологиялык активдүү кошумчалар (биологические активные добавки) деп аталат.

БИПРОГНАТІЯ — бипрогнатия. Тиштердин физиологиялык катышынын бир түрү. Маңдайкы үстүнкү жана астыңкы тиштердин жаак сөөк менен кошо алдыга эңкейип калышы.

БІСИКО — бисико. Германиялык компаниянын аты. Тиштердин калыбын алууда колдонулуучу ар кандай материалдардын жалпы аталышы. Мисалы, БИСИКО ПЛАТ, БИСИКО ИКЗЕТ, кийме тиш протезин жасоо үчүн калып алууда колдонулуучу БИСИКО ФРАНКШН, негизи силикон массасынан турган БИСИКО-S 1, БИСИКО-S 2, БИСИКО-S 4, БИСИКО-S 4 ХАЙДРОФИЛ, БИСИКО МЭНАЙЗЛ, БИСИКО ПРИСАЙЖН ж. б. түрлөрү болот.

БИФУРКАЦІЯ — бифуркация. Эки тамырлуу азуу тиштердин тамырынын ачаланган жери. Өпкөнүн трахеясынын оңго жана солго бөлүнгөн жери да бифуркация деп аталат.

БОКСИЛ ЭКСТРА — боксил экстра. Тиштерге спорттук шакшак жасоо үчүн колдонулуучу силикон массасы. Россияда чыгарылат.

БОЛЕЗНЬ — оору, ноокас, сыркоо, дарт. Сырткы жана ички чөйрөнүн дүүлүктүргүч таасиринен функционалдык же морфологиялык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында организмдин иштешинин бузулушу.

БОЛЕЗНЬ ВАКЕЗА — Вакезин оорусу. Оору көбүнчө 40–60 жаштарда кездешет. Ооздун ичиндеги белгилери: ууртгун, эриндин өңү кочкул кызыл болуп, көгөргөнсүп турат, жумшак таңдай өтө көгөрөт, ал эми катуу таңдай болсо агарып турат (Куперман белгиси). Оорулардын 95% ынын терисинин өңү өзгөрөт, кычышат, ооз ичиндеги былжыр кабыкчанын сезгичтиги жоголот.

БОЛЕЗНЬ ВЕРЛЬГОФА — Верльгоф оорусу. Кандын курамында тромбоциттердин жетишсиздигинен болгон оору. Тромбоциттердин сөөк кемиктеринен аз иштелип чыгышынан же таптаза болбой калгандыгынан улам кан аккан, кесилген, жараланган жерлердин канын токтотуп, карттандырууга тромбоциттер жетишсиз болуп, адамдын мурдунан, тиштин этинен ж. б. жерлерден кан өзү эле агып кетет.

БОЛЕЗНЬ БОУЭНА — Боуэн оорусу. Бул ооруну 1912-жылы J. T. Bowen жазган. Ал башынан эле cancer in situ экенин билдирет. Ооз ичинде жалгыздан пайда болгон чымкый кызыл түстүү так, бети жылмакай же майда түкчөлөрү бар болсо баркыт сыяктуу болот. Атрофиянын натыйжасында былжыр кабыкчанын ортосу чункурайып калат. Гистологиялык текшерүүдө рак экени билинет.

БОЛЕЗНЬ ЛАЙЕЛЛА — Лайелл оорусу. Кандайдыр бир жакпаган дары ичкенде токсикалык аллергиялык түрдө теринин чириши менен мүнөздөлгөн оору.

БОЛЕЗНЬ ЛЕТТЕРА-ЗИВЕ — Леттер-Зиве оорусу. Бардык тиштер пародонтит менен оорушу, жаак сөөктөрдүн өтө тез жоюлуп кетиши менен мүнөздөлгөн оору. Рентген менен караганда тиштердин ортосундагы жана жаак сөөгүнүн денесиндеги сөөктөр жоюлганын көрүүгө болот.

БОЛЕЗНЬ МИКУЛИЧА — Микулич оорусу. Шилекей жана көз жаш бездеринин эки жагы бирдей (симметриялуу) чоңоюшу. Себеби белгисиз, ооз ичиндеги жана көздүн кошулма тканы сезгенет.

БОЛЕЗНЬ ПЕДЖЕТА — Педжет оорусу. Чучуктуу жиликтерде, баш, жамбаш, бет жана жаак сөөктөрдө пайда болуучу оору. Мында эски сөөктөр жоюлуп, жаны сөөктөр бат пайда болуп, кыйшайып өсүп кетет.

БОЛЕЗНЬ СЛЮННОКАМЕННАЯ — шилекей түтүкчөсүнө таш туруп калуу оорусу. Шилекей бөлүнүп чыгуучу түтүктө таш пайда болуп, шилекейдин жолун тосуп, аны өткөрбөй калышы. Тамак ичкенде ооруганы күчөйт. Себеби ушул мезгилде бездер шилекей бөлүп чыгарат, бирок ал өтө албай түтүктү кенитип, оорутат.

БОЛЕЗНЬ ТАНИСОНА — Танисон оорусу. Бул оорунун өзгөчөлүгү тамакты чайнаган кезде чайноо булчундары бир топко тырышып катып калат. Бул оору тубаса болот жана тукум кууйт.

БОЛЕЗНЬ ТАРАТЫНОВА — Таратынов оорусу. Сөөктүн кемигинде, чучукта ретиколоэндотелий элементтеринин чектен ашык иштелип чыгуусу (гиперплазия), көбүнчө ак кандын эозинофил тобу көбөйөт, турмушта өтө сейрек кездеше турган оору. Бул ооруну эозинофил бүртүкчөсү (гранулема-сы) деп да аташат.

БОЛЕЗНЬ ХЕНДА-ШЮЛЛЕРА-КРИСЧЕНА — Хенда-Шюллер-Крисчен оорусу. Клиникалык көрүнүштө ооз ичинде бардык тиштер пародонтит менен ооруйт. Рентген менен караганда жаак сөөктөрдүн жоюлушу (ичкерип жукарышы) байкалат. Дененин башка сөөктөрүндө шишиктер пайда болот, көзү чоң көрүнөт (экзофтальм), кантсыз диабеттин клиникасы билинет.

БОЛИ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКИЕ — гетеротопиялык оору. Ооруну пайда болгон жерден эмес башка жерден сезүү дегенди билгизген жалпы түшүнүк.

БОЛТАЮЩИЙСЯ ГРЕБЕНЬ — саландаган таажы. Тиштери жок үстүңкү жаактын мандай жана астыңкы жаак-

тын азуу тиштеринин ордунда былжыр кабыкчанын сөөккө жабышпай ашыкча болуп кабатталып турушу. Мындай абал кийме тиш протездерди жасаганда жолтоо болот; кийме тиштин алдында кабатталып калып, оорутат.

БОЛЬ — оору. Себептери ар кандай болуп адамдын тынчын алган патофизиологиялык абал. Мында оорунун белгиси болуп сайгылашуу, какшоо, зыркыроо, салмактануу ж. б. эсептелет.

БОРМАШИНА — бормашина. Стоматологияда колдонулуучу машина. Тиш чирип, кариес болгондо терапевт стоматологдор бормашина менен бургулап, тазалап кыт коюшат. Ортопед стоматологдор тиштерди өгөп, жасалма тиш салышат. Биринчи чыккан бор машиналар бут менен айландырылчу. Азыр алар электр менен иштейт, ал тургай, турбинный деп аталган аба менен иштетилүүчү түрү бар.

БОРОДАВЧАТЫЙ ПРЕДРАК КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБЫ — эриндин кыюусунун рак оорусуна жакын сөөлү. 1965-жылы А. Л. Машкиллейсон сыпаттап жазган. Көбүнчө ылдыйкы кызыл эринде кездешет, көрүнүшү оорубаган түйүнчөктөй, жарым тоголок, бетинде сөөлү бар, 0,4–10 мм. Өңүнүн өзгөчөлүгү аз, бир аз кызаргансып гана турат, бети боз кабырчыктанат. 1–2 айда рак оорусуна өтүп кетет.

БОРОЗДА ДЕСНЕВАЯ — тиштин бүйлөсүнүн ноочасы. Тиш менен тиштин бүйлөсүнүн ортосундагы аралык, ноочанын тереңдиги 0,5–2 мм болот.

БРЕКЕТ СИСТЕМА — брекет системасы. Жаактардын туура эмес өсүшүн, тиштердин кыйшык чыгышын айыктырууда колдонулуучу заманбап аспап жана ыкма. Брекетти тиштердин сыртынан жана ич жагынан жабыштырып дарылайт.

БРОМШТРОМ И ПЕСТИК — бормштром жана пестик (сок билекче). Металлдан жасалма каптама (коронка) жасаганда кураштырылган ыкма менен штамптай турган аспап.

БРУКСИЗМ — уктаганда тишти кычыратуу. Мындай көрүнүштөр көбүнчө ичегилерде мите курттар бар болгондо байкалат. Эгерде адам күндүз уктабай жүрүп эле тиштерин кычыратса анда БРУКСОМАНИЯ деп айтышат.

БРУЦЕЛЛЁЗ — бруцеллёз. Мальта безгеги, ооруну пайда кылуучу бруцеллалар ооз, тери жарааттары, сүт жана эт аркылуу адамга жугат. Оору башталганда ооз ичиндеги былжыр кабыкчада инфекциялык бүртүкчөлөр пайда болот. Астынкы жаак алдындагы бездер чочуп, чоңоюп, кол тийгизбей ооруйт.

БУГОРОК — дөмпөкчө. Көбүнчө кургак учук жана котон жара (сифилис) ооруларынын белгиси, былжыр кабыкчанын бардык катмарына таралат, ириндеп жүрүп айыкканда ордунда тыртык так калат.

БУГОРОК АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ — альвеолалык дөмпөкчө. Үстүнкү жаактын азуу тиштеринин катарынын ары жагында жайгашышкан сөөктөрдүн дөмпөкчөлөрү.

БУГОРОК СУСТАВНОЙ — муун дөмпөкчөсү. Чыккый сөөгүнүн бет сөөк жактагы жөлөк сөөгү, ал муун чункурунун алды жагын түзүп турат, анын жаныгы менен ылдыйкы жаактын муундун башы оозду чоң ачканда жана ылдыйкы жаакты алдыга карай кыймылдатканда жылат. Орто эсеп менен жанык 33°ка барабар.

БУРА — бура. Ак кристаллдуу зат, эрүү температурасы 741°С, химиялык формуласы $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, ал кычкыл-текти өзүнө соруп алуу менен, ширетүү бетине кандоочтун жабышуусуна көмөкчү болот.

БУТАДИОН — бутадион. Сезгенүүгө каршы дары. Тиштер пародонтит менен ооруганда колдонулат, ошондой эле дененин ысыгын баса турган касиетке да ээ.

БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ — буфердик зоналар. 1962-ж. Е. И. Гаврилов жана В. И. Кулаженко сыпаттаган, ал тандайдын арткы бөлүгүндөгү былжыр кабыкчада жайгашкан. Анда майда кан тамырлардын, май жана былжыр ткандарынын көптүгүнүн натыйжасында калың тартып, кандайдыр бир жумшактыкка ээ болот. Басканда тамырлардан кан агып чыгып кетип, тандай сөөккө такалып, баспаганда кан кайра толуп, көтөрүлгөндүктөн, бул жер серпилгич оромдой солкулдак болуп турат.

БЮГЕЛЬ — дого. Кийме тиштердин ар түрдүү бөлүктөрүн бириктирип туруучу дого.

БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ — доголуу протез. Кийме тиштин бир түрү. Бул протездин айырмачылыгы анын догосунда гана эмес, ал өзүнүн таянып-кармоочу илмектери менен чайноо басымын былжыр чел кабыкчага толук түшүрбөй, бар тиштерге таянып, ошолорго басым жасагандыгында. Бул жасалма тиште адам сүйлөгөнгө, тамак жегенге бат көнөт, себеби тандай ачык болот, тилдин алдында дого орунду аз ээлейт.

БЮГОДЭНТ — бюгодент. Доголуу тиш протезинин каркасын куят. Кобальттын жана хромдун кошундусунан турат. Ал жумшак, орто жана катуу болот. Буга кошумча молибден кошулат, көмүртектин саны 0,5% тен ашпайт. Кээде жез, ниобий, бор, кремний элементтери колдонулуучу максатына жараша аз-аздан кошулат. Россияда чыгарылат.

В

ВАЛЮКС ПЛЮС — валюкс плюс. Бузулган мандайкы тиштердин турпатын калыбына келтирүүдө колдонулуучу материал. Ал 100% цирконий менен кремнийдин кошундусунан турат. Ушул түрдөгү ар кандай түстө СИЛЮКС ПЛЮС жана КОНСАЙЗ деген материалдар АКШда, жарыкта катуучу ПЕРТАК 11 Германияда чыгарылат. Блэктин классификациясы боюнча 1-У класстарда тиштердин турпатын калыбына келтирүүдө колдонулат.

ВАН СТЕП — ван степ. Жарыкта катуучу универсалдуу жабышкак (адгезив) материал. Ал дентинге, эмалга, металлга, фарфорго жана амальгамага жакшы жабышат.

ВАРИАНТ — вариант. Доголуу (бюгельный) жасалма тиштерди электр-химиялык жол менен эки каркасты бир дегенде жалтырата турган аппарат, электролит куя турган өзүнүн атайын идиши болот. Вариантка окшош УНОПОЛ деген аппарат бар, ал доголуу жасалма тиштердин каркасын бирден гана электр-химиялык жол менен жалтыратат.

Электр тогунун кубаттуулугу 80 Вт, күчү 3,5–4,5 А, электролитти 35°–45°С жылытуу жакшы натыйжа берет. Германияда чыгарылат.

ВАСКУЛИТ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ (болезнь Шенлейн-Геноха) — геморрагиялык васкулит (Шенлейн-Генох оорусу). Оору иммундук системанын бузулушунан келип чыгат. Мында ооз ичиндеги былжыр челде кандуу темгил пайда болот, анын ортосу чирип, ириндеп турат. Оору айрыкча тандайда, ууртта, тиштин этинде көп болот. Бул ооруда айрыкча бөйрөк жабыркайт. Тишти жулганда жана былжыр чел кабыкка дарт тийгенде кандын агышы көпкө созулат.

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ — ыйлаакчалуу оозул. Ооздун тегерегинде, эринде, ооздун ичинде чыбырчыктар пайда болуп, алардын жарылып кызарышы менен мүнөздөлгөн илдет. Оорунун козгогучу вирус болгондуктан, жугуштуу.

ВЕКТРИС — вектрис. Ивоклар фирмасы тарабынан чыгарылган үч компоненттүү өңсүз материал. Алынбоочу протездин каркасы үчүн колдонулат, ал бир нече катмар айнек буладан турат. Лихтенштейнде чыгарылат.

ВЕНЕЧНЫЙ ОТРОСТОК — таажы өсүк. Чыккый-астыңкы жаак муунунун алды жагындагы сөөктүн өсүгү.

ВЕСТ ДЖИ — вест джи. Металлдардын ар кандай куймаларын алууда форма жасоо үчүн колдонулуучу фосфаттуу материал. Анча катуу эместиги куюлган металлдын оңой ажырашына көмөк берет. Ушуга окшош ФУДЖИВЕСТ СУПЕР (Япония), АЛЬФАКАСТ-2, КЕРАМИКОР (Швейцария) массалары бар.

ВИБРОБЕРИ — вибробери. Форма жасалуучу масса менен гипсти вакуумда аралаштыруу үчүн атайын аспап. Ушуга окшош ВИБРОМИСТЕР, КВ-16, КВ-36, КВ-56 деген атайын аспаптар бар, алар моделди көбүксүз, сапаттуу кылып куюга мүмкүнчүлүк берет. Германияда чыгарылат.

ВИВОПЕРЛ-ПЕ — вивоперл-пе. Кийме тиштерге коюлуучу Россияда жана КМШ өлкөлөрүндө кенири таралган

мандайкы фарфор тиштер. Азуу тиштердин ордуна коюлуучу ВИВАПЕРЛ-ПЕ ОРТОПРИНТ фарфор тиштери болот. Германияда чыгарылат.

ВИГАЛЕН-30 — вигален-30. Санкт-Петербургдагы синтетикалык каучук илим-изилдөө институтунда винилсилоксан каучугунун негизинде иштелип чыккан, тиштердин калыбын алуу үчүн колдонулуучу масса. Ошол эле жерден ушуга окшош СИЛЛИТ, Москвадан ЭРЛОСИЛ массалары чыгарылат.

ВИКАРНАЯ ФУНКЦИЯ — эки эсе иштөө. Жуп органдардын (бөйрөк, көз, өпкө, кол, бут ж. б.) бири иштебей калганда, экинчиси өзү үчүн да, иштебей калган орган үчүн да иштеп, эки эсе кызмат аткаруусу.

ВИКАСОЛ — викасол. Тиштерди жулганда, гингивит, пародонтит болгон тиштин этин дарылаганда кан токтобой агып калса, канда токтотуу үчүн колдонулуучу дары.

ВИКОПРЕС — викопрес. Функционалдык калып алуу үчүн чыгарылган цинкоксидэвгенол пастасы. Өзүнүн сууну соруу касиети менен калып алууда аянттын көчүрмөсүн өзгөчө так түшүрөт. Викопрес менен кошо ВИКО-1 деген оорулуунун эрдине жана врач стоматологдун колуна сыйпай турган крем берилет, ВИКО-2 дегени менен Викопрестин аспаптарга жабышып калган калдыктары тазаланат.

ВИНИРЫ — винирлер. Мандай тиштердин вестибулярдык бетине жасалып коюлуучу косметикалык жасалма катмар.

ВИНОКСОЛ — виноксол. Тиштерге кыт (пломба) коюуда колдонулуучу материал.

ВИНТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ — ортодонтиялык бурамалар. Туура эмес өсүп жаткан тиштерди, жаак сөөгүн ондоочу ортодонтиялык бурамалар. Бурама пластмассадан жасалган таңдай пластинкага орнотулат.

ВИРОВЕСТ — вировест. Металл куймасын куюуда форма жасоо үчүн колдонулуучу масса. Ал эки түрдүү болот: 1-сууга аралаштырылуучу, катуулугу 140 Н/мм^2 жана атайын чыгарылган өзүнүн суюктугуна арашуучу, катуулугу 180 Н/мм^2 . Катуулугу 190 Н/мм^2 масса ВИРОПЛЮС деп аталат.

ВИРОН-88 — **вирон-88**. Курамы 60–65% никель, 23–26% хром, 6–11% молибден, 1,5–2% кремнийден турган никель-хром, дат баспоочу болоттун куймасы. Мындай металл куймасынан тиштерди, каптамаларды, көпүрөчө тиш протезде-рин куят. Башка дат баспоочу болоттордон айырмасы курамында көмүртек болбойт. Германияда чыгарылат.

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ — **чыккый-астыңкы жаак мууну**. Ал муундун кабынан, чыккый сөөгү-муун чункурчасынан, муун дөмпөкчөсүнөн, астыңкы жаактын муун башчасынан, акыркы экөөнүн ортосундагы дөңгөлөкчөдөн, байламталардан жана аларды майлап турган синовиалдык суюктуктан турат.

ВИСФАТ ЦЕМЕНТ — **висфат цемент**. Ооздон алынбай турган жасалма тиштерди өз тиштерине жабыштыруу үчүн колдоно турган үч түрлүү түстөгү, күкүм жана суюктуктан турган препарат, фосфаттан айырмасы — курамында висмуттун кычкылы бар.

ВИТА АКЦЕНТ — **вита акцент**. Майда дандуу күкүмдөр (20 түстүү). Фарфордон жасалган тиштерди өз тиштерге окшоштурууда колдонулуучу атайын боёктор, фарфор тиштерди үч өлчөмдүү кылып көргөзгөндө өз тиштерден айырмасы болбой калат. Ушул массага окшош ВИТА-ИНТЕРНО деген 12 түстүү масса бар. Германияда чыгарылат.

ВИТА-ВАКУМАТ — **вита вакумат**. Фарфордон жасалган тиштерди күйгүзүү үчүн чыгарылган вакуум меши, жалпы аралыктан башкаруу менен бирге, температураны автоматтык башкаруу программасы бар.

ВИТА ЛЮМИН ВАКУУМ — **вита люмин вакуум**. Дүйнө жүзүндө 50 жылга жакын убакыттан бери таралып, керамика үчүн жасалган жана стандарт катары кабыл алынган өң таануу (расцветка). Ар кимдин тиши ар кандай түстө болот. Жасалма тиштерди жасаганда аны өз тиштерге окшотуп жасоо үчүн колдонулат. Анын А-1, А-2, А-3, А-3,5, А-4; В-1, В-2, В-3, В-4; С-1, С-2, С-3, С-4; Д-2, Д-3, Д-4 деген түстүү тиштери бар. Кимге кандай түс туура келсе ошол түстөгү масса менен жасап коёт. Керамика материал-

дары үчүн ушуга окшош Омега/Омега 800, Вита УМК 68/95, Вита Титанкерамик, Вита Хай Керам, Витадур Альфа расцветкалары бар. Пластмасса жана фарфор үчүн Витапан, Витапан ЗД мастер деген өндөр (расцветкалар) болот. Бардыгын Германия чыгарат.

ВИТАЛЬНАЯ АМПУТАЦИЯ ПУЛЬПЫ (ПУЛЬПОТОМИЯ) — тиштин өзөгүн тирүүлөй ампутация жасоо. Тиштин тамырындагы өзөктү сактоо.

ВИТАЛЬНАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ — тиштин өзөгүн тирүүлөй жулуп алуу. Тиштин өзөгүнө мышьяк коюп, аны некроз кылбай эле ийне сайып жансыздандырып, өзөктү жулуу.

ВИТА ОМЕГА 900 — вита омега 900. Жасалма каптама, тиш жасай турган фарфор материалы.

ВИТАДУР — витадур. Алюминий оксидинен турган фарфор массасы. Жасалма каптама, көпүрөчө сымал жасалма тиш жасалат.

ВИТАКРИЛ — витакрил. Россияда чыгарылуучу айнекиономерлүү цемент, күкүмү — алюмофторсиликаттуу айнек, суюктугу — полиакрил кычкылынын суудагы эритиндиси. Ортопедиялык стоматологияда ооздон алынбоочу жасалма тишти бекитет. Витакрил фтор иондорун бөлүп чыгарат, эмаль менен дентинге жакшы жабышат. Үч түстө болот: ак-сары – № 10, сары – № 16, боз-сары – № 24.

ВИТАФТОР — витафтор. Тиштердин жана сөөктөрдүн жакшы жетилишине өбөлгө болуучу, курамында фтор, ретинол, эргокальциферол, А, С, Д витаминдери ж. б. бар дары. Ичүүчү суудагы фтордун саны 0,5 мг/л ден ашпаса бул дарыны бир жыл бою күнүнө 1 чай кашыктан тамактын алдында, ичүү керек.

ВИТРЕБОНД — витребонд. Тиштин өзөгүнүн сезгенүүсүнө жеткирбей сактап калуу үчүн туруктуу кыттын таманына, түбүнө фторду бөлүп чыгаруучу айнекиономерлүү цемент. Терендеген кариесте коюлат. АКШда чыгарылат.

ВКЛАДКИ — кыпчыктар. Бузулган (кариес, травма, шынаа кетиктери) тиштердин анатомиялык формасын калыбына келтирүү үчүн тиштин жасалма бөлүгү. Кыпчыкты

металлдан, пластмассадан, фарфордон жана металл-пласт-масса, металл-фрафордон жасоого болот. Вкладка жакшы кармалыш үчүн тиштин бузулган жерин өгөп, төрт бурчтуу кутуча жасашат.

ВКУС — даам сезүү. Ачуу, таттуу тамак ичкенде, дары-дармекти оозго алганда тилдин учу таттууну, капталы ачуу, кычкылды сезет. Эгерде даам сезүү ооздо толук жок болсо агевзия, аз болсо гипогевзия, көп болсо, жогоруласа гипер-гевзия, айныган болсо прогевзия деп аталат.

ВЛИЯНИЕ РАЗНОРОДНЫХ СПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ НА СЛІЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА — табияты ар кандай металл куймалардын ооздун былжыр кабыкчасына тийгизген таасири. Кээ бир асыл (алтын, күмүш, палладий, платина) жана асыл эмес (хром, никель, темир, кобальт, кадмий, титан, марганец, кремний ж. б.) металлдардын куймаларынан жасалган жасалма каптамалардын, дат баспоочу көк тиштердин өнүн сары кыла турган титандын нитриди менен капталган жасалма тиштер бир ооздо болуп калышы мүмкүн. Ушундай клиникалык абалда кээ бир пациенттерде ар кандай тынчсыздануу пайда болот. Белгилери ачуу, кычкыл тамак жегенде күчөйт. Эртең менен турганда ооздон темир даам сезилет. Ооздун былжыр кабык-часы кычышат, жыбырайт, ачышат, сайгылайт, ооруйт, деми кыстыгып аба жетпей калат. Шилекей бирөөлөрдө көп чыкса, бирөөлөрдө аз чыгып, оозу кургайт. Адамдын башы, чыкыйы, кежигеси оорушу мүмкүн.

ВОДЯНОЙ РАК (НОМА) — суулуу жара. Териден баштап сөөккө чейин сезгенип, ткандар эзилип сөөктөн өзүнчө ажырап калышы мүмкүн. Ооз ичинде жарааттанып чириген оозул коштоп жүрөт. Бул оору менен көбүнчө 2–15 жаш-тарда оорушат.

ВОКОЛОИД — воколоид. Тиштердин калыбын алууда колдонулуучу масса. Ал жагымдуу жыты бар күкүм, сууга аралаштырылат. Воколоид-3 үч мүнөттө, Воколоид-4 төрт мүнөттө катат. Германияда чыгарылат.

ВОКОСЕПТ — вокосепт. Жугуштуу микробдорду жок кылуучу (дезинфекциялоочу) эритинди, аэрозоль. Германия-да чыгарылат.

ВОКОТЕМП — вокотемп. Эки компоненттүү цемент, курамында гвоздика майы бар, ооздон алынбоочу жасалма тиштерди убактылуу бекитет. Германияда чыгарылат.

ВОЛДЫРЬ — исиркек ыйлаакча. Бөрү жатыш оорусунда байкалуучу, ар түрдүү көлөмдөгү териден бир аз көтөрүлүп, бөлүнүп турган жана тез таркай турган майда темгилдер, ыйлаакчалар.

ВОСК — мом. Стоматологияда момдун ар кандай түрлөрү колдонулат. Мисалы, негиз үчүн (базисный) (калыңдыгы 2 мм) дегени оозго кийме протезди жасап жатканда анын негизин түзүп, жасалма тиштерди, илмектерди өзүнө жабыштырып турат, дого үчүн (бюгельный) делгени (калыңдыгы 0,2 мм) доголуу протездерди жасоого керектелинет, жабышкак (липкий) делгени ар кандай бөлүктөрдү жабыштыруу үчүн, ошондой эле калыптандыруучу (моделировочный) делгени, лавакс, модевакс, катуу формамент 0,2 деген түрлөрү өтө көп. Мом табиятына жараша үч түрдө болот: жаныбарлардан (бал аары мому, ланолин – жаныбарлар жүнүнөн), өсүмдүктөн (жапон, карноуб), минералдан (озокерит, парафин ж. б.) алынуучу.

ВОСПАЛЕНИЕ — сезгенүү. Организмге дартка чалдыктыруучу таасир тийгенде, таасир тийген жердин ткандары менен кан тамырларынын коргонуу катары татаал реакциясы. Сезгенүүнүн белгилери: шишүү, кызуу-ысуу, кызаруу, ооруу.

ВРЕ́МЯ ЗАТВЕРДЕВА́НИЯ — катуу мезгили. Жумуш убактысынын бир бөлүгү. Гипс менен калып алганда, жасалма тиштерди цементке бекиткенде, пластмассаны бышырганда алар суюк абалынан катуу абалына өтүү үчүн талап кылынган убакыт.

ВСА́СЫВАНИЕ — соруу, сиңүү. Клеткалардын пардасы, тоскучу аркылуу заттардын өтүп кетиши менен мүнөздөлгөн физиологиялык процесс. Сиңүү негизинен ичегилерде жүрөт.

ВТОРИ́ЧНАЯ (ПРИВЫ́ЧНАЯ) ЦЕНТРА́ЛЬНАЯ ОККЛЮ́ЗИЯ — экинчи (көнүмүш) борбордук окклюзия. Ал жаактарда кайсы бир тиштер түшүп калганда аргасыздан калган тиштер менен тамакты чайнагандыктан, астыңкы

жаактын үстүнкү жаакка болгон алгачкы апташынын, катышынын өзгөрүлүүсү.

BT-100 — BT-100. Титандын маркасы. Жасалма коронканы штамптап жасоодо анын калыңдыгы 0,14–0,28 мм баракча түрүндөгү кошулмасы колдонулат.

ВЫВИХ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА — чыкый-астыңкы жаак муунунун чыгуусу. Бардык муундардын чыгып кетүүсүнө салыштырмалуу бул 1,5–5,7% ды түзөт. Көбүнчө аялдарда кездешет. Себеби аялдардын чыкый сөөгүнүн муун чуңкурчасы тайыз, муун дөмпөкчөсү жапыз келет. Бул чыгуу оозду чоң ачып эстегенде, кусканда, азуу тиштерди жулганда, ашказанга зонд жуткурганда, операция жасоо үчүн наркоз бергенде ж. б. учурларда болот.

ВЫВИХ ЗУБА — тишин чыгуусу. Ар кандай урунуп-согулуудан, жыгылуудан көбүнчө жогорку жаактын маңдай тиштери чыгып кетет.

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ПРОТЕЗ — тегиздөөчү протез. Жаак сөөгү сынып, кыйшык салынып, айыгып калганда үстүнкү жана астыңкы тиштер бири-бирине дал келбей калат. Ошондо жасалма тиш салып аларды тегиздейт.

ВЫСОТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЯ — салыштырмалуу физиологиялык тынчтыктын бийиктиги. Жаактардагы тиштер бар болсо, алар тийишпейт, ал эми тиштердин бардыгы түшүп калган болсо деле, бул абал сакталат. Себеби астыңкы жаакты көтөрүүчү жана астыга тартуучу булчуңдар тең салмакта болушат. Астыңкы жаак салмагына жараша салаңдап турат.

ВЫСОТА ПРИКУСА — тиштердин катнашынын (прикустун) бийиктиги. Табигый тиштери же кийме тиштер менен тиштенип тургандагы бийиктик. Бийиктикти ээк асты менен мурундун таноосуна чейин ченейт.

ВЯЗКОСТЬ — илээшкектик, ички сүрүлүү. Газдын жана суюктуктун сырткы таасирлерге болгон каршылыгы.

ВЯЛОЕ ЖЕВАНИЕ — жай чайноо. Тиштердин катары толук болбосо, тиштер таптакыр жок же тиштердин катышы туура эмес болсо, адам тамакты узакка чайнап, жеп калат. Азуу тиштери кариес, пульпит, периодонтит менен ооруса, тиштер кыймылдап калса да, тамакты жай жеп калат.

Г

ГАЙМОРИТ ОДОНТОГЕННЫЙ – каңылжарынын (Гаймор көңдөйүнүн) былжыр кабыкчасынын тиш себеп болгон сезгениши. Гаймор көңдөйү (кобулу) үстүнкү жаакта көздүн астында жайгашкан. Биринчи жолу изилдеп, жазып кеткени үчүн бул көңдөй Гаймордун атынан аталып калган.

ГАЛЛОДЕНТ-М — галлодент-М. Галлий элементинин негизинде жасалган, металлдан кыт коюу үчүн колдонуучу материал. Курамында күкүм жана суюктук бар. Кыт коюлгандан кийин галлодент ооз ичинде 10–15 мүнөттө катат.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ — гальванизация. Ооруну дарылоо үчүн төмөнкү чыналуудагы электрдин туруктуу тогун колдонуу.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА — гальванопластика. Электрлиттин жардамы менен кайсы бир буюмдун бетин металл менен каптоо.

ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ — гальваностегия. Акрил пластмассасынан жасалган кийме тиш протезинин ички бетине күмүштү жабыштыруу. Мындай ыкма пластмассанын мономерине аллергия болгондо колдонулат.

ГАММА — гамма. Фарфор массасы, ал өтө майда күкүмдүү, түрдүү түскө боёлгон силикат массасы. Массаны 1100–1110°C ысытканда тирүү ткандарга зыяны жок (индифференттүү) болуп, аларга эч кандай таасир этпейт. Тазартылган (дистирленген) сууга аралаштырылып, жогорку температурада вакуум мешинде атайын режимде күйгүзүлөт.

ГАНГРЕНА — гангрена. Териден сөөккө чейинки ткандар жараланып, өлүп, иридетүүчү микробдордун пайда болушу менен бирге, ал жердин чиреши аркылуу өзү эле органдан ажырап калышы. Алар көбүнчө күйүктөн, үшүктөн, урунуп-согулуудан кийин пайда болот.

ГАСТРИТ — гастрит. Ашказандын былжыр кабыгынын сезгениши.

ГЕКСОРАЛ, ЭЛЮДРИЛ — гексорал, элюдрил. Ооз көңдөйдө ар кандай оорутуучу микрофлораларды жоготуу үчүн колдонулуучу антисептикалык заттар.

ГЕЛИН — гелин. Форманы кайталоочу масса. Ал деңиз балырынан алынган агардан, этиленгликолдон жана дистириленген суудан турат. Доголуу жасалма тиштерди жасоодо моделдин тескери көчүрмөсү гелиндин жардамы менен алынат. Масса 70–80°C жылуулукта эрийт, ал эми 35°C болгондо жумшак, килкилдек болуп катат.

ГЕМАНГИОМА — майда кан тамырларынын калыңдап кеткен шишиги. Адамдын бетинин же ооз ичиндеги былжыр кабыгынын гемангиомасынын өңү ачык кызыл, кочкул кызыл болот. Үстүнөн басканда ал агарып калат да, колду алганда кайра кызарып калат. Тезинен дарылабаса, беттин сөөк формасын өзгөртөт.

ГЕМАТОМА — уюган кандуу шишик. Кан тамырынын жарылганынын себебинен, кан анын айланасына толуп кетет. Кичинекей гематома болсо убакыт өтүшү менен өзү жок болуп кетет, ал эми чоң болсо, анан ага инфекция кошулса, ириндеп денени ысытып, оор болушу мүмкүн.

ГЕМИГИПЕРТРОФИЯ — гемигипертрофия. Беттин бир жагынын өтө өсүп кетиши, ээктин алдыга чыгып кетиши менен прикустун бузулушу 14–19 жашта болот.

ГЕМИСЕКЦИЯ — гемисекция. астыңкы жаактын чоң азуу тиштеринин тамыры экиден болуп, пульпит, периодонтит болгондо бир тамырынын каналын дарылаганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Андай учурда тиштин коронкасын тең бөлүп (сепарациялык диск менен), дарыланбаган тамыры менен кошо жулуп салууга туура келет. Тиштин коронкасынын жарымы бир тамыры менен калат.

ГЕМОФИЛИЯ — гемофилия. Кан уюбай, өзүнөн өзү агып көп кыйынчылыктарга дуушарлантуучу, көбүнчө эркектерде кездеше турган оору. Негизинен кан токтотуучу факторлордун жетишсиздигинен пайда болот. Тишти жулганда кан токтобой калышы мүмкүн.

ГЕНИОПЛАСТИКА — гениопластика. Ээктин формасын өзгөртүү боюнча жасалуучу хирургиялык операция.

ГЕПАРИН — гепарин. Кандын уюшун жайлата турган дары. Аны ири мүйүздүү малдын өпкөсү менен боорунан алышат.

ГЕРБСТА МЕТОД — Гербст ыкмасы. Тиштери жок, кызыл ээк кезде жасалма кийме тиштерди сапаттуу жасаш үчүн жана өзүмдүк ченкеп менен функционалдык калып алыш үчүн колдонуучу ыкма. Ыкма үстүнкү жаактын ченкеби үчүн өзүнчө, астыңкы жаактын ченкеби үчүн өзүнчө болот. Мында калып алып жатканда кийме тиш кийүүчү киши оозун чоң ачып жутунат, тилинин учу менен үстүнкү жана астыңкы эриндерин жалайт, тилдин учун мурунга жеткирет, эки эринди түтүктөй, үйлөгөндөй кылып созот. Бул сыноолорду бир нече жолу кайталап, ченкепти ордунан жылбай турган абалга жеткирет.

ГЕРКУЛАЙТ — геркулайт. Тишке кыт койгондо жарык менен катуучу паста. Швейцарияда чыгарылат.

ГЕРМЕТИКИ — тыгыздоочулар. Азуу тиштердин чайноо бетиндеги кычыктардын, чуңкурчалардын кариеске кабылбоосу үчүн жасала турган чаптоо, жабыштыруу ыкмасы. Бул ыкма 95% га жакшы жардамын берет. Герметиктер синтетикалык зат акрилаттын негизинде жасалат.

ГЕРПЕС — учук. Ооз менен эриндин былжыр кабыгында боло турган оору. Ооруну вирус таратат. Башталганда майда-майда исиркектенген жара болуп, бара-бара биригип, чоңоюп кетишет.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА — ооз көңдөйүнүн тазалыгы. Тиш пастасы, күкүмү, дагы башка атайын тиштерди жуучу, ооз ичин чайкоочу заттарды колдонуу аркылуу оозду таза кармоо.

ГИДРОТЕРАПИЯ — суу менен дарылоо. Ысыктыгы ар кандай суу менен тиштин бүйлөсүн чайкоо. Бул ыкманын касиетин жогорулатуу үчүн сууга туз, аш содасы, календула, эвкалипт, ромашка ж. б. дарыларды кошсо болот. Сууну же дарыларды кошкон сууну оозго ууртап алып, 3–5 минут кармап туруу керек.

ГИЛЬЗЫ — гильзалар. Жасалма коронкаларды жасоо үчүн керектелүүчү дат баспас болоттон заводдо даярдалуучу оймок сыяктуу жабдык. Эгерде тиштин каптамасы (коронкасы) алтындан же башка асыл металлдардан жасалса, Самсон аппаратынын жардамы менен гильзаны лабораторияда жасоого болот.

ГИНГИВА ЛИКВИД — гингива ликвид. Алюминий хлоридинин гексагидратынын 10% эритиндисине жип салынат. Коронкаларды жасаш үчүн тишти өгөрдө ошол жипти тиштин бүйлөсүнүн кырынын астына ороп коёт, ошондо жип бүйлөнү куруштуруп көтөрөт жана кан токтотууга өбөлгө түзөт.

ГИНГИВИТ — тиштин бүйлөсүнүн сезгенүүсү. Жергиликтүү жана жалпы терс таасир этүүчү факторлордун таасиринде пайда болот. Сезгенүүдө тиштин бүйлөсү менен тиштин жабышкан, тыкыс байланышы бузулбайт, б. а. тиш менен тиштин бүйлөсүнүн ортосунда ажыроо же чөнтөкчө пайда болбойт. Созулушу боюнча курч мүнөздө жана өнөкөт түрүндө болот.

ГИНГИВИТ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ — тиштин бүйлөсүнүн өсүп сезгениши. Тиштин бүйлөсүнүн бир же бир нече тиштердин айланасында өтө өсүп, кызарып кетиши. Алар тиштерди щетка менен жууп тазалаганда, катуу тамакты тиштегенде (алма, алмурут, сабиз ж. б.) канап, ооруп кыйнайт. Мындай учурда адамдын оозунан сасык жана ириндин жыты келип турат.

ГИНГИВИТ КАТАРАЛЬНЫЙ — тиштин бүйлөсүнүн сууланып сезгениши. Оозду таза күтпөгөндөн, периодонтиттен, оор металлдардын туздары менен уулануудан ж. б. себептерден улам болот. Турмушта өтө көп кездешет.

ГИНГИВИТ ЯЗВЕННЫЙ — тиштин бүйлөсүнүн жараланып сезгениши. Тиштин бүйлөсүнүн жаралуу сезгениши көбүнчө суулуу сезгенүүнүн калдыгынан же кээде өзүнчө эле пайда болот. Жараланып-чириген сезгенүү организмдин кайдактыр бир жалпы оорунун натыйжасы катары да пайда болот. Адамдын мындай дарттан жабырланганы аны менен сүйлөшкөндө алыстан эле сезилет.

ГИНГИВОПЛАСТИКА — гингивопластика. Тиштин бүйлөсүнүн кырын өзгөртүү боюнча операция. Бул төмөнкү убакта жасалат: 1) гипертрофиялык гингивит болуп, тиштин бүйлөсү өсүп кеткенде; 2) тиштин моюнчасы боюнча жогору же ылдый карай кесип, операция жасоого туура келгенде.

ГИНГИВОТОМІЯ — гингивотомия. Тиштин бүйлөсүн өйдөдөн ылдый карай кесүү, тилүү. Тиш менен тиштин бүйлөсүнүн ортосунда чөнтөкчө пайда болгондо, ага тамак толуп, ириндеп адамды кыйнайт, ал жерде тиштин ташы көбөйөт. Тиштин бүйлөсүн тилип, ачып таштарын, грануляциялык ткандарын кырып алып тазалап, кайра жаап, тигип коёт.

ГИНГИВОЭКТОМІЯ — гингивоэктомия. Тиштин бүйлөсүн кесип алып таштоо. Тиштин бүйлөсү өтө өсүп кеткенде, аны тиштин моюнчасынын денгээлинде скальпель же электрокаогулятор менен кесип таштайт. Тиштин бүйлөсүнүн чөнтөкчөсү өтө тереңдеп, тамыр көп ачылып кетсе, бул операция оң натыйжа бербейт.

ГИПЕРАЛЬГЕЗИЯ — гиперальгезия. Оорунун катуу күчөп оорушу.

ГИПЕРДОНТИЯ — ашыкча тиштердин чыгуусу. Себеби белгисиз, тиштердин түйүлдүктөрү пайда болгондо ашыкча болуп калып, кийин чыгат. Көбүнчө алар үстүңкү жаактын маңдайкы тиштери болот.

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ ТВЁРДЫХ ТКÁНЕЙ ЗУБА — тиштин катуу ткандарынын ашыкча сезгичтиги. Эмаль катмары жешилип, дентин катмарына өтүп жатканда жана дентин катмары жешилип жатканда, тиш ысык-суукту, кычкылтаттууну сезгич болуп калат. Ошондой эле тиштин айланасындагы бүйлөсү, жаак сөөгү жоюлуп, тиштин тамыры ачылып кетсе да тиш сезгич болуп калат. Соо тишти өгөп каптама жасаганда деле тиштер сезгич болуп, аны цементке бекиткенде гана сезгичтик жоголот.

ГИПЕРКЕРАТОЗ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРЕДРАКОВЫЙ — эриндин кыюусунун оорусу күчөп, рак оорусуна жакындап калышы. Жаш балдарда жана орто жашаган кишилерде бул ооруну өз убактысында дарылабаса рак дартына айланып кетет. Жараланган эрин ак сур келип, кабырчыктап, эринден бир аз көтөрүлүп, бети тегиз болот.

ГИПЕРКИНЕЗ — гиперкинез. Борбордук нерв системасынын кайсы бир ооруларында колу-буттун, ылдыйкы жаак-

тын ыксыз көп кыймылдоосу. Тиштердин капталын сепарациялык диск менен өгөө бул учурда коркунучтуу.

ГИПЕРОСТÓЗ ВИСÓЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА — чыккый-астыңкы жаак муунундагы сөөк өсүшү. Муундун тийишүү бетинде сөөктөн тикенектей өсүктөр пайда болот.

ГИПЕРПЛАЗИЯ — гиперплазия. Ткандардын ыксыз өтө өрчүп кетиши.

ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ — гиперсаливация. Шилекейдин ар кандай себептерден улам көп бөлүнүп чыгуусу.

ГИПЕРЦЕМЕНТОЗ — гиперцементоз. Тиштин тамырынын айланасындагы цементтин катмары калыңдап, көбөйүп кетиши. Тиш пульпит, периодонтит менен ооруганда анын өзөгүн алып тишти дарылайт. Бир топ убакыт өткөндөн кийин ушундай тиштердин тамырынын сыртындагы цемент катмары калыңдап, сөөккө жабышып калат. Бошоп кыймылдап калган тиштердин өзөгүн алып каналын толтуруп, шакшак менен 6 айдан 12 айга чейин кыймылдатпай койсо, алар деле кыймылдабай катып калат.

ГИПОКСИЯ — гипоксия. Ткандагы кычкылтектин көлөмүнүн азайышы. Азаюунун себеби болуп уулануу, гиповитаминоз, ички секреция бездеринин сезгениши, закымданышы ж. б. Гипоксиянын тишке тийгизген таасирин Л. Б. Сабурова изилдеген. Анын айтуусунда деңиз деңгээлинен 2500–3000 метр бийиктикте жашаган элдерге кычкылтектин абада аздыгы, алардын тиштеринин айланасындагы ткандарга терс таасирин тийгизип, алардын ооруп калуусуна жана тиштердин түшүүсүнө себепкер болот.

ГИПОПЛАЗИЯ ЭМАЛИ — эмалдын жетилбегендиги. Ар кандай ткандын, органдын жана организмдин бүтүндөй же бир бөлүгүнүн өсүп жетилбегендиги. Тиштин эмалынын өсүп жетилбегендиги. Буга Стентон-Капдепон оорусу мисал боло алат.

ГИПОСАЛИВАЦИЯ — гипосаливация. Шилекейдин ар кандай себептерден улам аз бөлүнүп чыгуусу.

ГИПС МЕДИЦИ́НСКИЙ — медициналык гипс. Стоматологиялык ортопедияда байыртадан бери колдонулуп келе жаткан материал. Ал клиникада жана лабораторияда кеңири иштелип келе жатат. Жаратылыштагы гипсти майдалап, кургатып, күйдүрүп майда көзөнөктүү элек менен элеп, эки суулуу $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ гипстен, жарым суулуу $(\text{CaSO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ кылышат. Гипс менен тиштердин калыбын алганда, ал ооздо батыраак катышы үчүн ар кандай туздардын (NaCl , Na_2SO_4 , KCl , K_2SO_4) 3–4% дуу эритиндисине аралаштырат. Булар — катализаторлор. Ал эми гипсти жайыраак катыруу үчүн ингибиторлорду кошуу керек. Алар бура, крахмал, кумшекер, желим, сода ж. б. заттардын эритиндилери.

ГИПСОВО́ЧНАЯ КО́МНАТА — гипстөөчү бөлмө. Бул бөлмөдө моделдерди куюшат, моделдерди окклюдаторго же артикуляторго гипстешет, кюветадан полимерленген протезди алышат, ооздон алынбай турган протездерди ширетүүдөн мурун гипстешет.

ГИ́ПСОГАЛ — гипсогал. Гипстин катуу түрү, диагностикалык жана жумушчу моделдерди куюп даярдоодо колдонулат. Курамында кальций сульфатынын жарым гидраты бар.

ГИ́ПСОЛ — гипсол. Аспаптарга жабышкан гипсти эритип тазалоочу зат. УЛ-10 да ушундай эле касиетке ээ. Германияда чыгарылат. Японияда ушуга окшош эритинди РОКЛИН деп аталат.

ГЛАБЕ́ЛЛА — глабелла. Эки каштын ортосундагы түгү жок (же аз) жери, антропометриялык чекит: борбордук сызык боюнча мандай сөөктүн эң алды.

ГЛАЗУ́РЬ — айнектөө. Фарфордон, металлкерамикадан тиштерди жасаганда анын сырткы бетин эритип, өтө жалтырак айнектей кылып коёт.

ГЛАС СПАН — глас спан. Кыймылдап бошоп калган тиштерди кыймылдатпоо үчүн шакшак жасап коюуда колдонулуучу айнек була. АКШда чыгарылат.

ГЛЕЙЗ — глейз. Кыт койгондон кийин анын бетин шыбап коюучу зат. 1 флакону 200 кыттын бетин жабууга жетет. Кыттын бети жылмакай болуп, сырткы таасир азаят.

ГЛОРІЯ СПЕЦІАЛЬ — глорія спеціаль. Бат эрүүчү металлдардын куймаларын куюуда форма берүүчү масса, негизин кварц жана катуу гипс түзөт. 1000°Ста эрийт. Чехияда чыгарылат.

ГЛОССАЛГИЯ или **ГЛОССОДИНИЯ (СТОМАЛГИЯ)** — глоссалгия же глоссодиния (стомалгия). Тилдин, ооз ичиндеги былжыр кабыкчанын ачышып, сайгылашып оорушу. Бул оору нерв жана ашказан оорусуна байланыштуу. Стоматология жактан себепкер болуп беттин төмөнкү бөлүгүнүн кыскаруусу эсептелет. Оорукчал киши тилинин дуулдап ачышып, күйүп калгандай тызылдап турганын айтат. Тилде, былжыр кабыкчада өзгөрүүлөр байкалбайт.

ГЛОССИТ — глоссит. Ар кандай жергиликтүү травмалардын (тиштин, протездин кыры, күйүк ж. б.) таасиринен пайда болуучу тилдин оорусу. Ал катмарлуу, түлөгөн түрдө, бурчтуу, кылдуу болот.

ГЛОССОПТОЗ — тилдин тубаса кемтиги. Тил толук өсүп жетилбегендиктен, артка карай салаңдашы. Бала өскөн сыйын тили өсүп, жетилип кетет.

ГЛОТКА — алкым. Ооз менен кызыл өңгөч башталган чекке чейин жеткен кобул, көңдөй, тамак жутуучу мүчө.

ГЛУБОКИЙ ПРИКУС — маңдайкы тиштердин терең айкашуусу. Мында астыңкы жаактын маңдайкы тиштери, үстүнкү жаактын маңдайкы тиштеринин таңдай жагындагы былжыр кабыкчасына тийип такалып, оорутат. Үстүнкү жаактын маңдай тиштери ылдыйкы жаактын маңдай тиштерин толук жаап калат. Тиштердин туура катышы боюнча үстүнкү маңдай тиштер астыңкы маңдай тиштерди $\frac{1}{4}$ ге гана жаап турушу керек.

ГНАТОДИНАМОМЕТР — гнатодинамометр. Тиштерге түшө турган басымды ченей турган аспап. Бул аспапты алгач 1893-ж. Блек сунуш кылган. Кээ бир булактарда гнатодинамометрди биринчи Габер ойлоп тапкан делет. Булардан башка Тиссенбаум, Курляндский, Конюшко, Перзашкевич, Амираев, Рузуддинов ж. б. жасаган аспаптар бар. Гнатодинамометр механикалык, электрондук, гидравликалык болуп бөлүнөт.

ГНАТОСТАТ — гнатостат. Тиштери, жаак сөөктөрү туура эмес өскөндө ортодонтиялык жол менен дарылоодо керектелүүчү аспап.

ГНАТОСХИЗИС — гнатосхизис. Ээктин эки ачалуулугу.

ГНУСАВОСТЬ — ич маңка. Адамдын кеңилжээринин анатомиялык түзүлүшүнүн бузулушунан келип чыккан абал. Ошондой эле тилдин кыскалыгы, узартыш үчүн тилдин чектөөчүсүн кесүү (френулотомия), чоңоюп кеткен тамакмурун бездерин кесип алып таштоо (аденоэктомия) маңкалыкты жоёт.

ГОНОКОККОВЫЙ СТОМАТИТ — гонококктуу оозул. Көбүнчө жаны төрөлгөн балдарда кездешет, алар оорукчан энесинен жукутуруп алат. Улгайгандарда, гомосексуалисттерде болот.

ГОССИЛ, СИЛЭП — госсил, силэп. Катуу пластмассадан жасалган кийме протезге экинчи кабат кылып жабыштырылуучу силикондуу жумшак пластмассалар.

ГРАНУЛЁМА НА ВЕРХУШКЕ КОРНЯ — тиштин тамырынын учундагы түйүн. Тиштин оорусун өз убактысында дарылабай, кечиктирип, кариес кобулу ачык калып, сырттан ар кандай тамактын калдыктары кирип, тиштин тамырынын учунда көлөмү 5–6 мм жеткен баштыкча пайда болот. Ичи ирин-канга толуп, оорутуп, кыйнайт.

ГРАТ — грат. Металл буюмдарды чарыкка тарткандан кийин калган кыпындар.

ГРЕБЕНЬ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ — альвеоланын кыры. Тиштери жок жаак сөөгүнүн мурда тиштерди кармап турган альвеола учу, анын кыры курч, томпок жана жалпак болот.

ГРЕБЕНЬ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ БОЛТАЮЩИЕСЯ — альвеоланын кыймылдак кыры. Ылдыйкы жаактын азуу тиштери жулунгандан кийин, жаак сөөгүнүн кыры бат жоюлуп кетет, үстүнөн жаап турган былжыр кабыкча жоюлуп жетишпейт да, ашыкча болуп калат. Бул көрүнүш азуу тиштери бошоп түшкөндөрдө кезигет. Кол менен кармалап көргөндө кыймылдап турат. Кийме тиш жасоо үчүн калып алганда кабатталып калып, аны кийгенде оорутат.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ — баткак менен дарылоо. Дарылык касиетке ээ болгон баткактардын бир топ түрлөрү бар. Аларды жаак сөөгүнүн узакка созулган кулгуна, тиштердин пародонтит деген ооруларын дарылоо үчүн колдонушат.

ГУБА́ — эрин. Үч бөлүктөн турат: 1-тери бөлүгү. Анын түзүлүшү теридей, кылдары, тер жана май бездери бар. 2-эрин кыягы. Ал сырткы жана ички бөлүктөн турат, кылдары, тер жана май бездери жок. 3-былжыр бөлүгү. Ал катмарлуу чордонбоочу эпителийден турат, шилекей бездери бар былжыр кабыкча менен капталган.

ГУБА́ ДВОЙНА́Я — кабатталган эрин. Жогорку эриндин тубаса өзгөрүлүшү. Мында жогорку эриндин былжыр бездеринин чоңоюп, былжырлуу кабыкчанын алдындагы майдын өсүүсү жогорку эриндин катарына дагы бир эрин пайда кылат. Сүйлөгөндө, күлгөндө тиштерге тийип, урунуп турат. Бул көбүнчө эркектерде кезигет да, кош эрин болуп, косметикалык кемчиликке алып келет.

ГУБА́ ЗАЯ́ЧЬЯ — жырык эрин (нышан). Баланын үстүнкү эринин тубаса кемтиги, жырыгы.

ГУТТАКОНДЕНСОР — гуттаконденсор. Тиштин тамырынын каналын гуттаперча менен кыттоочу аспап.

ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ ШТИ́ФТЫ — гуттаперчадан жасалган шиштер. Тиштин каналын дарылаганда, каналга орнотулуучу шиштер.

Д

ДАВЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЕ — чайноо басымы. Тамакты майдалап чайноо үчүн булчуңдар менен белгилүү бир күч, басым жумшоо.

ДАЙРКЕТ СЕМ — дайркет сем. Ооздон алынбоочу жасалма тишти туруктуу бекитүүчү жабышкактыгы жакшы цемент.

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ — дарсонвализация. Электр тогунун жогорку жыштыктагы күчүн басайтуу менен алынган абалын физиотерапиялык дарылоо ыкмасында колдонуу.

ДЕВИТ-АРС — девит-арс. Тиштин өзөгүн жансыздандырууда колдонулуучу курамында мышьягы бар паста. Россияда чыгарылат.

ДЕВИТАЛИЗАЦИЯ — девитализация. Тиштин өзөгүн жансыздандыруу үчүн мышьяктуу жана мышьягы жок параформальдегид пасталарды колдонуу.

ДЕГЕНЕРАЦИЯ — дегенерация. Ар кандай зыяндуу таасирлердин натыйжасында клеткалардын калыбына келбес болуп өзгөрүүсү.

ДЕГУВЕСТ СОФТ, ДЕГУВЕСТ Н10 — дегувест софт, дегувест Н10. Асыл металлдардын куймаларын куюуда форма берүүчү массалар. Германияда чыгарылат.

ДЕГУФЛЭКС — дегуфлекс. Тиштердин калыбын алууда колдонулуучу силикон массасы. Германияда чыгарылат.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ — дезинфекция. Оору козгоочу микробдорду атайын дарылар аркылуу жок кылуу.

ДЕЗОДОРАЦИЯ — дезодорация. Ооздогу жагымсыз жыттарды жок кылуу. Ооздун ичинде, тиштердин кычыктарында тамактын калдыктарындагы микробдордун көбөйүшүнөн ооздо жагымсыз жыт пайда болот. Аны жоготуу үчүн тиш пастасына, күкүмүнө, сагызга ар түрдүү дарыларды, жыт жоготуучу заттарды кошушат.

ДЕЗОККЛЮЗИЯ — дезокклюзия. Тиштердин кыркасынын тиштөө, чайноо беттерин бири-биринен ажыратуу, алыстатуу. Ал үчүн тиштердин тийишүү бетине кайсы бир аспаптарды тиштердин патологиялык жоюлушунда, тиштердин кыркасында кемтик пайда болуп, өзгөрүү болгондо коюу керек.

ДЕКАЛЬЦИФИКАЦИЯ — декальцификация. Денедги кальций элементинин азайышынын сөөктө, тиштерде байкалышы.

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ — декомпенсация. Өз кызматын аткара албай калуунун анатомиялык жана физиологиялык шарттары. Мисалы, тиштер соо кезинде алар өз милдетин аткара алышат, тиштин бүйлөсү качып, сөөгү жоюла баштаса аткаруу кызматы начарлай берет, тиштердин тамыры

ачылып, тиштер өтө кыймылдап, бошоп калса, алар кызматын аткара албай калып, декомпенсация абалына келет.

ДЕКУБИТАЛЬНАЯ ЯЗВА — ооздогу жара. Туура эмес жасалган тиш протездеринен, ортодонтиялык аппараттардан, курч кырдуу тиштерден пайда болуучу жара. Эгерде аппарат-аспаптар туура жасалган болсо, мындай жара болбойт. Жаранын өнөкөт түргө өтүшү, орой айтканда, рак оорусуна алып келет. Ошондуктан өнөкөт дүүлүктүргүчтөр ооз ичинде болбоо керек.

ДЕМАРКАЦИЯ — демаркация. Гангрена, некроз болгондо өлүү ткань менен тирүү тканды бөлүп турган чек.

ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ — минералсыздануу. Денедеги зат алмашуу процессинин бузулушунун (кант оорусу, зат алмашуунун бузулушу ж. б.) натыйжасында минералдык элементтер организмден заара, заң менен чыгып кетет да, ар кандай оорулар пайда болот. Тиштер бат чирип (кариес), бузулат, пародонт ооруга чалдыгат.

ДЕНС НОБИЛИС — денс нобилис. Пластмассадан жасалган, жешилүүгө туруктуу жасалма тиштер. Маңдайкы тиштер үчүн 29 түрдүү, азуу тиштер үчүн 18 түрдүү чыгарылат. АКШда чыгарылат.

ДЕНТА — дента. Стоматологиялык кызмат көрсөтүүдө пациенттин кийимин булгап койбоо үчүн көп жолу колдонулуучу жапкыч, бир жолу колдонулуучусу СИМПЛЕКС деп аталат. Германияда чыгарылат.

ДЕНТАКОЛ — дентакол. Силикат жана фосфат массаларынан турган, көп жолу иштелүүчү, отко чыдамдуу моделдерди алуу үчүн колдонулуучу гидроколлоиддик агардан турган масса.

ДЕНТАЛОН ПЛЮС — денталон плюс. Убактылуу жасалма коронка жасоодо колдонулуучу пластмасса. Клиникада иштелет, ал эми ушул эле максатта, бирок лабораторияда иштелүүчү ПАЛАВИТ-55 VS пластмассасы бар. Японияда чыгарылат.

ДЕНТАФИКС — дентафикс. Стоматологиядагы чекиттик электр ширеткич, ширетүү убактысы 0,1–1,0 секундга созулушу мүмкүн. Токтун күчү 10 эсеге азаят.

ДЕНТАФÓЛЬ — дентафоль. Тиштери жок жаактардан кийме протез жасоо үчүн ысытып, жумшартып калып ала турган масса. Негизин жаратылышта кезигүүчү чайырлар жана синтетикалык заттар түзөт (карагай чайыры, стеарин, глицериндүү канифоль эфири, этилцеллюлоза, алюминий уну, тальк жана ар кандай жумшартуучу заттар).

ДЕНТИКЛЬ — дентикль. Тиштин өзөгүндө пайда болгон катуулугу дентиндей зат. Эгерде дентикль чоңоюп кетсе, анда өзөктү кысып, тишти оорутушу мүмкүн.

ДЕНТИМЕТР, БИНДРАТ — дентиметр, биндрат. Ричмонд конструкциясындагы шиштүү тишти жасоодо тиштин молтогунун айланасын ченей турган ичке жез зым.

ДЕНТИН — дентин. Тиштин негизин түзүүчү зат. Дентинди тиштин коронка бөлүгүндө эмаль, тамыр бөлүгүндө цемент каптап турат, ал сөөккө окшош келет. Курамында 70% органикалык эмес заттар, 28% органикалык заттар жана 2% башка туздар бар. Дентин көп сандаган каналчалардан турат, алар пульпага жакын жагында 1 мм^2 15000, теренинде, эмалга жакын жагында 75000ге чейин жетет.

ДЕНТИН ДЛЯ ПОВЯЗОК — карматуучу дентин. Тиштердин кариесин дарылаганда тиштин чункурчасында дарыларды токтотуп турат жана убактылуу кыт койгондо колдонулат. Дентинди сууга аралаштырып, дарынын үстүнөн жаап коёт. Туруктуу тиш протезин убактылуу бекитүү үчүн сууга аралаштырып, коронканын ичине дентин боткосун салып тишке бекитет. Өзү цинк кычкылынан жана ак топурактан (каолин) турат.

ДЕНТИН ПАСТА — дентин пастасы. Карматуучу дентинден айырмасы, ошол эле күкүмдү өрүк, шабдалы, калемпир майлары жана эвгенол менен аралаштырып коюшат. Бул деле тиштин чункуруна коюлган дарыларды жаап турат, убактылуу кыт боло алат жана цемент кыттын түбүнө төшөнчү катары колдонулат.

ДЕНТИПЛАСТ — дентипласт. Тиштери жок жаактардан калып алыш үчүн ченкептин кырына жабыштырып, ар түрдүү кыймыл-аракет жасатып, чекти тактоо үчүн колдонулат. Чехияда чыгарылат.

ДЕОНТОЛО́ГИЯ — деонтология. Медицина кызматкерлеринин жүрүш-турушу жана пациентке жасаган адистик, юридикалык жана моралдык мамилеси, этикасы.

ДЕПУРАЛ — депурал. Тиштерди жалтыратуу үчүн колдонулуучу паста. Россияда чыгарылат.

ДЕРИПЛА́СТ — дерипласт. Эки пастадан турган, маңдайкы тиштерди кыттоодо колдонулуучу масса, тиштин өңүнө жараша тандап алып, тишти кыттап койсо, билинбей калат. Австрияда чыгарылат.

ДЕРМАТО́З — дерматоз. Тилге, эриндин кыюусуна, ооз ичиндеги былжырлуу кабыкчага чыга турган оору. Алар: лейкоплакия (тилге жана ууртка чыга турган ак тактар), кызыл жалпак темир өткү (красный плоский лишай), кызыл чакалай (красная волчанка), бөрү жатыш (крапивница).

ДЕСЕНСИБИЛИЗА́ЦИЯ — сезимталдыкты жоюу. Организмге кирген аллергендерге жараша аллергиялык реакциянын пайда болушун, сенсбилизацияны (өтө сезгичтикти) ар кандай жолдор менен басуу, организмдин нормалдуу реактивдүүлүгүн калыбына келтирүү, башкача айтканда, аллергендерге туруштук берүү.

ДЕСКВАМА́ЦИЯ — түлөө. Эпителий клеткаларынын кабырчыктанып түлөшү. Эпителийдин, теринин физиологиялык жана патологиялык түлөө түрлөрү бар. Бала төрөлгөндөн 1–2 күн өткөндөн кийин терисинин түлөп түшүүсү физиологиялык болуп эсептелет. Ооз көңдөйүнүн, эриндин же дененин башка жерлеринин түлөшү патологиялык түлөө.

ДЕСНА́ — тиштин бүйлөсү. Үстүнкү жана астыңкы жаактын альвеола чорчогуна, тиштин моюнчасын каптап туруучу былжыр кабыкча.

ДЕСНА́ ПРИКРЕПЛЁ́ННАЯ — бекилген бүйлө. Сөөктүн чел кабыгына тыгыз, катуу жабышып турган бөлүгү. Аны тиштин кыймылдабай турган бүйлөсү деп аташат.

ДЕСНА́ СВОБО́ДНАЯ — тиштин бош бүйлөсү. Тиштин бүйлөсүнүн тишке тийип турган кыры, бирок ал тишке жабышпайт. Тиш менен тиштин этинин кырынын ортосунда 1–2 мм тереңдикте жылчык болот, бош бүйлө ошол жылчыктан жогору жайгашат.

ДЕСНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ — бүйлөнүн суюктугу. Курамында альбумин, глобулин, ферменттери бар кандын сөлүнө (сывороткага) окшош суюктук.

ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС — бузулуу процесси. Ткандардын жана клеткалардын бузулушу, бүтүн органдын бузулушу дегенди түшүндүрөт, мисалы, жаак сөөктүн альвеола бөлүгүнүн жоюлушу.

ДЕТАЗИЛ — детазил. Бул массанын жардамы менен тиштердин калыбын алганда бир нече модель куюп алууга мүмкүнчүлүк болот. Германияда чыгарылат.

ДЕТАТРИН — детатрин. Тиштердин таштарын алгандан кийин тиштердин бетин ушул паста менен жылмакайлайт. Жылтыратып жана фтор менен жууш үчүн **ДЕТЕТРИН ФЛОУРЕ** пастасы менен иштешет. Булар Францияда чыгарылат.

ДЕФЕКТЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ — тиштердин катарларынын кемтиктери. Ар кандай себептер менен (кариес, пульпит, периодонтит, пародонтоз, урунуу ж. б.) тиштерди жулууга туура келет. Тиштердин катарынан 1 тиш жулунса да, 15 тиш жулунса да, тиштердин катарынын кемтиги деп аталат. Тиштердин кемтиги жөнүндө айтылганда ар бир жаакты өзүнчө түшүнүп айтуу керек.

ДЕФЕКТЫ КОРОНОК ЗУБОВ — тиштин коронкасынын кемтиктери. Тиштин чирешинен, урунуп-согулуудан, тиштин эмаль катмарынын жетилбей калганынан (гипоплазия) жана дарынын таасиринен тиштин коронка бөлүгүнүн өнүнүн, формасынын өзгөрүп, нормалдуу болбой калышы.

ДЕФЕКТЫ НЁБА — тандайдын жырыгы, кемтиги (нышаны). Бул оору тубаса жана туулгандан кийин ар кандай себептер менен (ок тийгенден, механикалык травмадан, шишиктерге операция жасагандан) пайда болот. Тубаса жырык менен кийин пайда болгон жырыктын айырмасы, тубаса жырыкта кемтик так ортодо болуп, четтери тегиз, жылмакай болот. Ал эми кийин пайда болгон жырык тандайдын туш келген жеринде жайгашып, четтери бодур-бүдүр берчтенген болот.

ДЕФОРМАЦИЯ — бузулуу. Тиштерди жулгандан кийин дароо жасалма тиш салбаса, тиштердин катары бузулат, тиш жулунган жерди чектеп турган тиштер кыйшайт же болбосо тиштер жулунган жерге карай үстүңкү жана астыңкы тиштер өсүп кетет.

ДЖЕЛТРЕЙТ, ДЖЕЛТРЕЙТ ПЛЮС — джелтрейт, джелтрейт плюс. Альгинат массасынын тобуна кирүүчү, тиштердин калыбын алуу үчүн ийкемдүү масса. Күкүмдү сууга аралаштырат. АКШда чыгарылат.

ДЖЕКСОНА КЛАММЕР — Жексон илмеги. Доголуу тиш протезинде колдонулуучу арта салма илмек.

ДИАГНОЗ — **дарттын аты**. Ооруган кишинин ал-ахвалын, кандай ооруга кабылганын алды менен карап, сурап, кармалап, тыңшап, текшерип көрүп, анын чыгарылган медициналык тыянак менен заманбап түшүнүктө аныкталган оорунун аты.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ — **диагностикалык моделдер**. Гипстен куюлган жаактар, булар ортодонтиялык же ортопедиялык дарылоо башталганга чейин алынып, диагнозду толук аныктоо үчүн колдонулат.

ДИАГРАММА ХАУЛЕЯ-ГЕРБСТА — Хаулей-Гербст диаграммасы. Бул диаграмманын жардамы менен үстүңкү жаактын туурасынан өсүш деңгээлин аныктоого болот.

ДИАЛОГ — **диалог**. Жарык менен катуучу тиштердин бетин жабуу үчүн шприцтеги пастага окшош бир компоненттүү масса, 8 түстүү. Германияда чыгарылат.

ДИАСТЕМА — **диастема**. Чоң кашка тиштердин ортосундагы аралык, ал тубаса жана кийин пайда болот. Тукум куучулук касиетке ээ.

ДИАТЕЗ ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ — **геморрагиялык диатез**. Жалпы түшүнүк, өзгөчөлүгү, урунуп-согулуудан же өзүнчө эле кандын агышы.

ДИАТЕРМИЯ — **диатермия**. Атайын аппарат аркылуу алынуучу жогорку жыштыктагы, чоң күчү бар электр тогунун жардамы менен ткандарды ысытып дарылоо.

ДИВЕРГЕНЦИЯ — **дивергенция**. Тиштердин катарындагы кемтикти чектеп турган тиштердин кемтиктен четке карай кыйшаюусу.

ДИЕТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ В СТОМАТОЛОГИИ — стоматологиядагы алдын ала мүнөздөп тамактануу. Келечекте бала жакшы өссүн, тиштери жакшы болсун үчүн ал төрөлө электе эне убактысы менен жакшы, сапаттуу тамактануу керек. Керектүү витаминдер, микроэлементтер энеге, балага сиңип туруу үчүн жашылча-жемиштерди жеп, күндүн нурунда, таза абада болуу керек.

ДИЗАРТРИЯ — чулдур. Сүйлөөнүн бузулуусу, кээ бир сөздөрдү, муундарды, тамгаларды айта албай токтоп, балдырап айтуу.

ДИКАИН — дикаин. Тийген жеринин нерв учтарынын сезгичтигин жоготуучу, ооруну сездирбөөчү зат. Стоматологияда тиштердин ташын алууда, кариес, пульпит ооруларын дарылаганда жана оозулду оорутпагандай кыла турган дары.

ДИОКСИФІСФАТ — диоксифисфат. Ооздон алынбоочу тиш протездерин тиштерге жабыштыруучу күкүм жана суюктуктан турган, фосфат-цементтин ордуна чыгарылган препарат. Фосфат-цементтен айырмасы күмүштүн тузунун ордуна бактерияны өлтүрүүчү диоксидин кошулган. Күмүштүн тузу тиштин өнүн өзгөртөт.

ДИСБАКТЕРИОЗЫ — дисбактериоздор. Денедегі микрофлоранын санынын ыксыз бузулушу. Себептери: рентген нурларынын терс таасири, бир эле дарыны чексиз көп ичүү (тетрациклин ж. б.), туура эмес тамактануу жана инфекциялык оорулар.

ДИСБИОЗ, БИОЦЕНОЗ, МИКРОБИОЦЕНОЗ — дисбиоз, биоценоз, микробиоценоз. Ооз көңдөйүндө ар кандай бузулуулар (патология) болгондо бактериялардын, вирустардын, грибоктордун, дрожжи, спирохета, трепанема, таякчалар жана башка микроорганизмдердин көбөйүп кетиши.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ — диспансеризация. Өнөкөт оорулууларды эсепке алып, мезгил-мезгили менен аларды чакырып, көрүп, зарыл болгон кошумча дарылоону жүргүзүп туруу. Стоматологияда көбүнчө тиштердин пародонтунун сезгенүүсүнөн жабыркагандар диспансердик эсепке алынып, жылына 2 жолу чакырылып, керек болгон дарылоо жүргүзүлөт.

ДИСПЛАЗИЯ КАПДЕПОНА — Капдепон дисплазиясы. Биринчи жолу Капдепон сыпаттап жазган. Тиштин коронкасынын эмаль катмарларынын жоктугу же дентиндин бетинде арал-арал гана болгондугу менен мүнөздөлгөн оору, дентин катмары катуу болуп, ысык-суукту өткөрбөйт.

ДИСТОПИЯ — дистопия (ууру тиш). Тиштин чыгышынын аномалиясы. Мында тиш өз ордунан башка жерге же тиштердин катарынын ары же бери жагына чыгат. Кыргызда мындай тишти «ууру тиш» деп коёт.

ДИСТРОФИЯ — дистрофия. Организмдеги зат алмашуу процессинин бузулушунун натыйжасында клеткаларга жана ткандарга керектүү заттар сан жана сапаты жагынан жетишпегендиктен нормалдуу процесстин бузулушу, арыктоо алсыздык менен коштолот.

ДИСФУНКЦИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА — чыккый-астыңкы жаак муунунун кыймыл ишинин бузулушу. Чыккый-жаак муунунун морфологиялык өзгөрүүсү жок эле иштөөсүнүн бузулушу. Бул оору психосоматикалык оорулардын катарына кирет.

ДОНДЕРСА ПРОСТРАНСТВО — Дондерс мейкиндиги. Адам оозун жаап кыймылдабай турган мезгилде тил менен катуу жана жумшак таңдайдын ортосундагы мейкиндик, көңдөй.

ДРИЛЬБОРЫ — дрельборлор. Тиштердин каналын кеңейтүүгө жана жууп тазалоодо колдонулуучу аспап.

ДРОБИТЕЛИ НАГРУЗОК — басымды бөлүүчүлөр. Доголуу тиш протезин жасаганда, тишке таянып-кармап туруучу илмектер колдонулат. Кээ бир убакта таянып турган тиштер бошоп, кыймылдап калганда чайноо басымын кыймылдаган тишке көп түшүрбөй, жаактын былжырлуу кабыкчасына көбүрөөк түшүрүү үчүн жасалат.

ДУГА АЛЬВЕОЛЯРНАЯ — альвеолалык дого. Альвеолалык жөлөк сөөктүн сырт жагындагы нооча аркылуу өтүүчү дого.

ДУГА БАЗАЛЬНАЯ — негизди түзүүчү дого. Үстүнкү жана астыңкы жаактагы тиштердин тамырынын учунун денгээлинен өтүүчү дого.

ДУГА́ ЗУБНА́Я — тиштердин догосу. Тиштердин катары боюнча алардын кыры жана чайноо бети менен өтүүчү дого.

ДУПЛО́ — көндөй, кобул. Стоматологияда биз, албетте, тиштин көндөйүн түшүнөбүз. Көндөй кариесте пайда болот, эгерде аны кыттап койбосо, ал тереңдеп тиштин өзөгүнө жетет да, пульпит болот, андан ары чирип олтуруп, тиштин учунан өтүп, периодонтит, периостит, остеомиелитке кетет. Тиштин чириген көндөйүн элибизде «тишти курт жеди» деп коюшат.

ДУРОГАЛ — дуругал. Жарык менен катуучу материал. Коронка жана көпүрөчө тиш протезинин бетин өз тиштердин түсүндөй кылуу үчүн чапталат. Металл куймаларынын бардыгына жакшы жабышат. 16 түстө чыгарылат. Дуругал менен капталган тиш протезинде жарака пайда болсо, аны ооздон чыгарбай туруп эле ЛЮКСОГАЛ деген көк жарык чыгаруучу аппарат менен оңдоп, жамап койсо болот.

Ж

ЖА́БЕРНЫЕ ДУ́ГИ — бакалоордогу дого сымак кемирчек. Ал төмөнкү омурткалууларда жана жогорку омурткалууларда (буга адам дагы кирет) түйүлдүк кезинде болот.

ЖА́РОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕ́ДСТВА — дененин ысыганын баса турган заттар. Буга аспирин (ацетилсалицил кислотасы), антипирин, амидопирин, феноцетин, антигриппин ж. б. кирет.

ЖЕВА́НИЕ — чайноо. Жеген тамакты сиңирүү үчүн майдалоо процессинин башталышы, тамак ооздун ичинде майдаланылып, шилекей менен аралашуучу физиологиялык акт.

ЖЕВА́ТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕ́НИЕ — чайноо басымы. Чайноо булчуңдары жыйрылганда тишке келтирилген басым.

ЖЕ́ЛЕЗЫ — бездер. Адамдын жашоосу үчүн эң керектүү заттарды иштеп чыгаруучу эпителий клеткаларынан турган органдар, ошондой эле ал денеге керек эмес болгон

заттарды, алмашуу процессинин эң акыркы керексиздерин бөлүп чыгарат.

ЖЕЛОБОК ДЕСНОВОЙ — тиштин бүйлөсүнүн ноочасы. Бүйлөнүн бош кыры менен тишке бириккен бүйлөнүн ортосундагы тереңдиги 0,5–1,5 мм ге барабар болгон аралык.

ЖЕЛУДОК — аш казан, карын. Тамак сиңирүү аппаратына тиешелүү орган, кызыл өңгөч менен 12 эли ичегинин ортосунда жайгашкан, тамакты чогултуп, аз-аздан сиңирип баштайт.

3

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ — дартка чалдыккандык. Жалпы элдердин же алардын бөлүгүнүн жашына, жынысына, кесибине жана жашаган жерине жараша белгилүү бир оору менен оорوشунун эсеби.

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ — бет-жаак аймагындагы нервдердин оорулары. Бет-жаактагы ар кандай оорулар, аларга ар кандай невралгия оорулары кирет. Мисалы, желке нервинин невралгиясы, үчилтик нервинин невралгиясы, тил-алкым нервинин невралгиясы жана бет нервинин сезгенүүсү аттуу оорулар кирет.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА — пародонттун оорулары. Аларга папиллит, гингивит, пародонтит, пародонтоз, пародонтолиз, травма, идиопатикалык оорулар жана пародонтомалар кирет.

ЗАВЕСА РЕЗИНОВАЯ — резина тосмосу. Англиялык дантист С. Барнум ооз ичинде операция жасаганда ал жерге шилекей келтирбөө үчүн «кофердам» сунуш кылган. Аны «рубердам» же резина менен тосуу деп да аташат.

ЗАГИПСОВКА МОДЕЛЕЙ В КЮВЕТУ — моделди кюветага гипстөө. Гипстөөнүн 3 жолу бар: 1-түз жолу. Моделди окклюдатордон же артикулятордон бошотуп, негизин кюветага кенен баткыдай кылып кесип даярдайт. Суюк боткодой болуп аралаштырылган гипсти кюветанын негизине толтура куюп, моделди таман жагы менен суюк гипске ор-

нотот, мандай жана азуу тиштерди сырт жагынан гипс менен 3–4 мм калыңдыкта жаап, шыбайт. Протездин сырткы бети да гипс менен жабылат. Протездин ооз жагы – таңдай, тилдин бети момдуу негизи менен ачык калат. Кюветанын бөлүктөрү оңой ажырасын үчүн четин жантайма жасоо керек. Гипс каткандан кийин анын бетин чектөөчү лак менен сүртөт. Бул үчүн самындын суусун, вазелин майын, талькты колдонсо болот же болбосо кюветаны 15–20 мүнөт сууга салып койсо да болот. Андан кийин кюветанын жогорку бөлүгүн капкаксыз негизине орноштурат да, суюк гипс боткосун куят. Аба туруп калбасын үчүн гипсти куюп жатканда кюветаны силкилдетиш турат. Кюветага гипс абасыз толгонуна толук ишенгенден кийин капкагын жаап, ашык гипсти чыгаруу үчүн пресске бастырат. Гипс каткандан кийин, аны идиштеги кайнак сууга салып момду эритет. Кюветаны ачып, анда калган момдун калдыгын кайнак суу менен эритип, жууп кетирип, муздатат жана кургатат. Эми гипстин бетине протездин бети жылмакай болсун үчүн чектөөчү лакты, кагаз желимин, кастор майын сүйкөйт. Бул жол менен тиштери жок жаакка протез жасаганда, сынган протезди жабыштырып ондогондо иштешет. Эритилип алынган момдун ордуна пластмасса эритиндисин куят. Пластмассанын күкүмү суюктукта текши эрип, жумшак жана идиштин бетине жабышпагандай болушу керек. Эми пластмассаны кюветага салып, кюветанын эки бөлүгүн бириктирип, пресске бастырып, бюгелге (струбцинага) кысып сууга салат. 2-тескери жолу. Мында протез жасалып жаткан модель бир бөлүгүндө, тиштер жана илмектер экинчи бөлүгүндө болуп калат. Тескери жол менен гипстегенде моделди момдогу турган тиштери менен кюветанын жогорку бөлүгүнө өтмө катмарга чейин гипстейт. Гипс каткандан кийин 15–20 мүнөткө сууга салып коюп, анан төмөнкү бөлүгүн жогорку бөлүгүнө кийгизип, суюк гипс боткосун менен толтурат, аба калып калбасын үчүн силкилдетет, капкагын жаап пресске бастырат. Ысык сууга салып, момду эриткенден кийин кюветаны ачканда тиштер илмектер менен кошо

кюветанын төмөн жагына өтүп калат. Момдун калдыктарын кайнак суу менен жууйт, кургатат. Бул жол анча-мынча тиштери бар кийме протез жасаганда колдонулат. 3-кураштыруу жолу. Мында жогоруда айтылган эки жолдун жумушу колдонулат. Протезди кюветанын төмөнкү бөлүгүнө гипстейт. Кийме протезди жасаганда альвеоланын маңдай бөлүгүндөгү жаак сөөгү жоонойгон, чоң болсо, бул жерге жасалма бүйлө коюлбайт да, аны на приточке деп айтат, ал эми азуу тиштерде болсо пластмассадан жасалган жасалма бүйлө болот. Протезди кураштыруу жолу менен гипстегенде маңдайкы тиштер кырына чейин эрин же тил жагынан гипстелет, азуу тиштер ачык бойдон калат. Ушунун натыйжасында азуу тиштер карама-каршы бөлүккө өтүп кетет, маңдай тиштер кюветанын төмөнкү бөлүгүндө калат. Кайсы гана жол менен моделди кюветага гипстебесин, пластмассаны моделге коёрдун алдында жасалма тиштерди, илмектерди мономер менен сүртүп, майдан арылтат. Ошондо алардын пластмассага жабышуусу жакшы болот.

ЗАБДА — жамажайдын сезгенүүсү. Ооздун жамажайына кээ бир мите, микробдордун таасир тийгизүүсүнөн пайда болгон оору. Жамажайдын кабаты тереңдеп, кесилип кетет. Себеби тиштери жок же тиштери бар, бирок алар патологиялык жешилүүгө дуушар болгондуктан, беттин ылдыйкы бөлүгүнүн бийиктиги кыскарат да жамажай тереңдеп, дайыма сууланып тургандан улам сезгенүү пайда болот.

ЗАКАЛКА — чыңалуу. Металлды жана анын куймасын кызарганча ысытып, тез муздак сууга салганда, ал чыңалат. Эгерде аны акырындап муздатса, ал чыңалбай жумшак болуп калат.

ЗАКÓНЫ БÓНВИЛЯ — Бонвиль мыйзамы. Ал төмөнкүлөрдөн турат: 1-астыңкы жаактын муун башчаларынын жана астыңкы жаактын борбор кескич тиштеринин ортосундагы чекиттин аралыгы 10 см; 2-маңдайкы тиштердин катышынын тереңдиги кичи жана чоң азуулардын дөмпөктөрүнүн бийиктигине жараша; 3-тик прикуста кичи жана чоң азуулардын дөмпөктөрү жокко эсе; 4-маңдай тиш-

тердин терендиги канчалык көп болсо, сагиталдык окклюзиялык кыйшык ошончолук көп билинет.

ЗАКОНЫ (ПЯТЁРКА) ГАНАУ — Ганау мыйзамы (бештиги). Ал төмөнкүлөрдөн турат: 1 — муун жолунун эңкейишинен; 2 — кашка тиштердин жабуусунан; 3 — сагитталдык жана трансверзалдык ийриликтерден; 4 — болжол мейкиндиктин эңкейишинен; 5 — тиштердин дөмпөктөрүнүн бийиктигинен. Кийме тиштерди жасаганда ушул 5 далил бири-бирине байланыштуу болот.

ЗАЩИТА ПРЕПАРИРОВАННЫХ ЗУБОВ — өгөлгөн тиштерди коргоо. Тиштерге жасалма коронкаларды жасарда аларды өгөшөт. Өгөгөндөн кийин тиштер температуралык, химиялык, биологиялык дүүлүктүргүчтөргө сезгич болуп калат. Сезгичтикти жоготуу үчүн ал тиштерди лак менен шыбап же убактылуу коронка менен каптап коёт.

ЗЁРНА ТРЕЛЯ — Трель данчалары (бүртүктөрү). Ооз көндөйүндөгү былжырлуу кабыкчадагы туберкулёздуу жара (кургак учук). Жаранын айланасында майда сары тактар пайда болот. Алгач аны Трель изилдеп, сыпаттап жазган.

ЗЕТАПЛЮС — зетаплюс. Металл-керамика, металл-пластмасса ж. б. жасалма коронкаларды, тиштерди жасаганда эки катмарлуу калып алууда колдонулуучу, эки компоненттүү силикон массасы. Италияда чыгарылат.

ЗМЕНТ — змент. Каптама, көпүрөчө протезди убактылуу беките турган цинкоксидэвгенолдук цемент, шилекейге туруштугу бекем. Убактылуу бекилген тиш протездерин кайра чыгарганда оной чыгат. АКШда чыгарылат.

ЗОЛОТО — алтын. Тиштерди салуу ишинде алтындын куймалары нечен кылымдан бери колдонулуп келе жатат. Жаратылышта химиялык таза алтын сары түстө кездешет, салыштырма салмагы 19,32, эрүү температурасы 1063°C, кайноо температурасы 2970°C. Таза алтын жумшак болот, ошондуктан ага жез жана күмүш кошсо катуу, өңү да жагымдуу болуп калат. Алтындын тазалыгына жараша ага белги коюлат. Мисалы, орустардын мурунку белги системасы боюнча таза алтын 96 золотник деген белгиге бара-

бар. Ал эми алыскы чет мамлекеттерде бул 24 каратка барабар. 1927-жылы Совет өлкөсүндө таза алтынга 1000 деген метрикалык белги коюлган. Демек, 1000 белги = 96 золотник = 24 карат. Ошондо 1 карат $1000 : 24 = 41,66$ метрикалык белгиге же $96 : 24 = 4$ золотникке, 1 золотник $1000 : 96 = 10,4$ метрикалык белгиге барабар. Союз мезгилинде 916, 900, 750 белгидеги 10% платина жана 750 белгидеги 8–10% кадмий менен болуучу. 916, 900 белгидеги алтындан коронка, көпүрөчө тиш протездерин жасаса, 750 белгидеги жана 10% платина кошулган куймадан илмектерди, шиштерди, доголуу тиш протезинин каркасын жасашат. 750 белгидегиге 8–10% кадмий кошуп койсо, ал каңдооч болуп калат. Ширетме менен тиш протездеринин ар кандай бөлүктөрүн, мисалы, көпүрөчө протездерди даярдоодо, коронка менен коронканы ширетип шакшак жасоодо колдонулат. Кадмий кошулган алтын төмөнкү ысыктыкта эрийт, кадмий аралашмада калбайт, ал буранын жардамы менен күйүп кетет. Данакерленген жердин алтыны кайра жогорку белгиде болуп калат. Алтындын кошулмалары ооз ичинде дат баспайт, анын зыян, пайдасы жок, башка металлдар (дат баспоочу болот, амальгама, сырты титан нитриди менен капталган дат баспоочу болот) болгондо реакцияга катышышы мүмкүн. Белгиси жок болсо алтындын тазалыгын текшерүү үчүн, хлордуу алтындын суудагы эритиндиси жана азот кислотасы колдонулат. 600-белгиге чейин хлордуу алтын, андан жогорку белгидегисине азот кислотасы колдонулат.

ЗОНД — зонд. Учу түз же бүгүлгөн, учу ийнедей болгон стоматологиялык аспап. Тиштин тамыры менен бүйлөсүнүн ортосунда пайда болгон чөнтөкчөнүнүн тереңдигин, каптаманын, вкладканын кырын, тиштин көңдөйүнүн тереңдигин аныктоо үчүн колдонулат.

ЗОНДИРОВАНИЕ — зондоо. Стоматологиялык зонд менен чириген тиштин көңдөйүн изилдөө, ооруган жерин табуу, тиштин каналын чукуу, ошондой эле тиш менен тиштин бүйлөсүнүн ортосундагы чөнтөкчөнүн тереңдегин аныктоо.

ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЗУБОВ — тиштердин коопсуз зонасы. Тиштин өзөгүнө доо кетирбей тиштерди өгөөчү жерлери.

ЗУБНАЯ БЛЯШКА — тиштин кири. Бактериялардан, клетка аралык заттардан, лейкоциттерден, макрофагдардан, эпителий клеткаларынан, шилекейдин компоненттеринен жана тамактын калдыктарынан турган структуралуу жабышкак зат.

ЗУБНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ — тиштин имплантациясы. Тиш катарынын аяккы же чектелген кемтигинде кошумча таяныч жасоо. Имплантаттын формасы жана материалы ар кандай болот.

ЗУБНАЯ КИСТА — тиш кобулу. Тиштин тамырынын учунда, жаак сөөгүнүн ичинде пайда болгон кобул, көңдөй. Аны рентгенге тартуу менен аныкташат, көлөмү 1 см²ден кем эмес.

ЗУБНОЙ КАМЕНЬ — тиштин ташы. Тиш таштары жайгашкан ордуна карай тиштин бүйлөсүнүн астында жана үстүндө болуп бөлүнүшөт. Үстүнкү катмары жумшак келет, ал кальций фосфатынан турат. Тиштин ташынын өнү, катуулугу, калыңдыгы шилекейдин курамынан жана оозду убактысы менен жууп жүрбөгөндүктөн болот. Тиштеринде таштары бар адамдар менен сүйлөшкөндө алардын оозунан жагымсыз жыт келип турат.

ЗУБНОЙ ЭЛИКСИР — тиш эликсири. Тиштерди, ооз ичин чайкоо менен дезинфекциялоочу жана жагымдуу сезим пайда кылуучу суюктук. Курамы кандай заттардан турат.

ЗУБНЫЕ КАПЛИ — тиш тамчылары. Курамында ар түрдүү дары-дармек бар, тиш ооруган учурда колдонулуучу эритме.

ЗУБНЫЕ НИТИ (ФЛОССЫ) — тиш жиби. Атайын гигиеналык жана оорулардын алдын алуу үчүн чыгарылуучу синтетикалык жип. Ал тиштердин ортосундагы тыгылып калган тамактын калдыктарын тиштин этин оорутпай алат. Жипти атайын даамдуу, жыттуу кылат. Жиптерди тиш тазалаш үчүн колдонуу жакшы натыйжа берет.

ЗУБНЫЕ ПРОТЭЗЫ — тиш протездери. Тиштердин катарында кемтик пайда болгондо, же тиштердин бардыгы түшүп калганда, аны калыбына келтирүү үчүн жасалган ар түрдүү жасалма тиштер. Бул түшүнүккө вкладка, шиштүү тиштер, жарым коронка, жасалма коронка, көпүрөчө протез, доголдуу протез, пластиналуу протез кирет.

ЗУБОДЕСНЕВОЙ КАРМАН — тиш менен тиштин бүйлөсүнүн ортосунда пайда болгон чөнтөкчө. Чөнтөкчө тиш кыймылдап бошоп кеткенде пайда болот. Анын терендигин бурчтуу зондду киргизүү менен аныктайт.

ЗУБОЧИСТКИ — тиш чукугучтар. Алар катуу жыгачтан же пластмассадан жасалат. Тиштердин ортосундагы тамактын калдыктарын чыгаруу үчүн колдонулат. Тиштери тыгыз жайлашкан кишилер колдонсо анча жакшы эмес, тиштеринин арасы ачык адамдарга жакшы. Тиш чукугучтун жаман жери эки тиштин ортосундагы тыгылып калган этти чукуганда, тиштин этинин бүртүкчөсүн басып, тиштин тамырынын ачылышына себепкер болот.

ЗУБЫ — тиштер. Ооз ичинде катар тизилип жайгашкан, эң катуу сөөктөн турган, тамакты майдалап, чайнап, жутууга даярдоочу, ошондой эле тыбыштарды так айтууга катышуучу орган. Жайланышкан ордуна жана аткарган кызматына жараша алар чоң азуулар (акыл азуу да), кичи азуулар, кылкыйма, кичине жана чоң кашка тиштер болуп бөлүнүшөт. Жаш балдардын тиши сүт тиш, ал эми сүт тиштер түшкөндөн кийин чыккан тиш — туруктуу тиш деп аталат. Жаш балдарда тиштердин саны 20, ал эми чоң кишилерде 32 болот.

ЗУБЫ БОКОВЫЕ — каптал тиштер. Үстүнкү жана астыңкы кичи жана чоң азуулар.

ЗУБЫ ГЕТЧИНСОНА — Гетчинсон тиши. Бул жогорку кашка тиштердин кескич кырынын жарым ай сыяктуу кетик болуп чыгышы. Бул котон жара (сифилис) менен ооруган энелердин балдарында тубаса болот.

ЗУБЫ ДИАТОРИЧЕСКИЕ — тешиктүү тиштер. Түп жагында чуңкурчасы, тишке тийишкен капталында тешикте-

ри бар фарфордон жасалган жасалма тиштер. Кийме тиш протезин жасаганда протездин негизи пластмассадан болот. Фарфор тиштерди пластмассага карматуу үчүн атайын таманына, капталына көндөй жасалат, көндөйгө пластмасса кирип калып, фарфор тиш жакшы кармалат. Аларды тешиктүү же түтүктүү деп да айтышат.

ЗУБЫ ИМПАКТНЫЕ — алмашып чыккан тиштер. Туркутуу тиштердин өз ордуна эмес, жанындагы тиштин жолтоосу менен башка жерге чыгышы.

ЗУБЫ ИСКУССТВЕННЫЕ — жасалма тиштер. Байыркы замандан бери жасалма тиштерди, колу ар нерсеге эптүү адамдар жасап келген. Аны катуу жыгачтын түрлөрүнөн, мамонттун, пилдин сөөктөрүнөн, тишинен, кийин металлдын кошулмаларынан жасашкан. Азыр алтындан, анан дат баспоочу болоттон, пластмассадан, фарфордон жана металлпластмассадан, металлкерамикадан жасашат. Азыр металлфарфорду металлкерамика деп айтышат.

ЗУБЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ — табияты түрдүү материалдардан кураштырылган жасалма тиштер. Мындай тиштердин көрүнүп турган бети өз тиштердей ак (пластмасса, фарфор, ситалл) болот, чайноо бети жана таңдай, тил беттери металлдан болот. Мындай тиштер фасетка деп аталат.

ЗУБЫ МУДРОСТИ — акыл азуулар. Бул тиштер 18 жаштан 25 жашка чейин чыгат. Тамак жегенге, тиш протезин карматканга жардам берет.

ЗУБЫ ПЕРЕДНИЕ — маңдай тиштер. Алар жогорку жана ылдыйкы жаактардагы борбордук жана кичине кашка тиштер жана кылкыйма тиштер.

ЗУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ — пластмассадан жасалган тиштер. Акрил пластмассасынан адамдын тишине окшотуп жасалат, мында көлөмү, формасы, түсү ар түрдүү болот.

ЗУБЫ РЕТИНИРОВАННЫЕ — чыкпай калган тиштер. Тиштин түйүлдүгү жаак сөөктө кыйшык жайгашып калгандыгынын натыйжасында, коңшу тиштер жолтоо кылбаса деле жаак сөөктө чыкпай калган тиштер.

ЗУБЫ ФАРФОРОВЫЕ — фарфордон жасалган тиштер. Тиштер маңдайкы жана азуу тиштер болуп бөлүнөт. Маң-

дайкы тиштерде пластмасса же металл менен жакшы карматуу үчүн күмүш-палладийден, алтындан, платинадан жасалган урчук зымдары (крампоны) болот, ал эми азуу тиштерде болсо тешиктер болот. Тешиктерге протездин негизи болгон пластмасса кирип, тишти жакшы кармап турат.

ЗУБЫ ШТИФТОВЫЕ — **шиштүү тиштер**. Ооздон алынбай турган тиш протези. Тиштин коронка бөлүгү чирип, сынып жок болгондо, тиштин каналы дарылоочу материал менен толтурулат. 2–3 күн тиш оорубаса, каналды бор машина менен кайра ачып, каналдын тереңдигин ченейт, ал тамырдын узундугунун жарымынан узун, жок дегенде тамырдын узундугунун жарымындай болуу керек. Ошончо тереңдикке шиш киргизилет, шиштин сырткы учун кайырып коёт. Коронка жагын өгөлгөн тиштей кылып пластмассадан жасайт же момдон коронка жагын калыптап, аны металлдан куюшат. Шиштүү тиштерди Ричмонд, Ахмедов, Ильина-Маркосян, Копейкин, Перзашкевич, Амираев сунуш кылышкан. Шиштүү тиштерди бир тамырлуу маңдайкы тиштерге жана көп тамырлуу азуу тиштерге жасоого болот.

И

ИВАКЛАР — **Иваклар**. Тиш жасалуучу ар кандай аспаптарды, материалдарды жана тишти таза күтүү үчүн керектелүүчү заттарды чыгаруучу германиялык фирма.

ИВАКРИЛ — **ивакрил**. Кийме тиштерге коюлуучу маңдайкы жана каптал жактагы жасалма тиштер. 9 түстө болот. Москвада чыгарылат.

ИГЛОТЭРАПИЯ — **ийне менен дарылоо**. Дарттын мүнөзүнө жараша белгилүү бир жерлерге ийне сайып дарылоо ыкмасы.

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ — **пайда болуу себеби белгисиз болгон оорудан азап чегүү**. Ушул аталыш пародонттун ооруларынын кайсы бир түрлөрүнө да карата колдонулат.

ИДИОСИНКРАЗИЯ — идиосинкразия. Адамдын тамакка, дары-дармекке болгон жогорку сезгичтиги.

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ (ИЛИ МИКРОТОКОВ) В ПОЛОСТИ РТА МЕЖДУ МЕТАЛЛАМИ, МЕТАЛЛАМИ И ДРУГИМИ УЧАСТКАМИ ТЕЛА — ооз ичиндеги металлдардын жана металлдар менен дененин башка жерлеринин ортосунда пайда болгон электр чыналуусун (же микротокту) ченөө. Ооз ичинде пайда болгон электр чыналуусун жана токту потенциометр, микроамперметр, милливольтметр деген аспаптар менен ченейт. Норма катары эки көпүрөчө тиш протезинин ортосундагы пайда болгон 50 мВ чыналуу, 1–3 мкА ток күчү эсептелет. Ошондой эле ушул аппараттар менен тиш жана дененин башка (баш, ээк, төш, оң жана сол колдор, оң жана сол буттар) жерлеринин ортосундагы пайда болгон токту ченөөгө болот.

ИЗОДЕНТ — изодент. Гипстин бетин чектөө боюнча катмар жасоодо колдонулуучу суюктук. Чехияда чыгарылат.

ИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ — бөлүүчү, ажыратуучу материалдар. Гипс менен пластмассаны бири-биринен чектеп туруучу — материал. Акрил пластмассасынан ар кандай тиш протездерин жасаганда, гипстен жасалган форманын (моделдин) бетине пластмасса жабышпас үчүн кандайдыр бир затты сыйпап коюу керек. Ал пластмассадан жасалып бүткөн тиш протезинин бетине гипсти жабыштырбай, жылмакай кылып чыгарат. Буга кагаз желими, изол кирет.

ИММЕДИАТ ПРОТЕЗ — иммедиаат протез. Тиштер бошоп, жарабай калган кезде, аларды жулбай туруп калыбын алып, жасалма тишти даярдап, анан тиштерди жулуп, даяр жасалма тиш протезин коюп коюу. Бул учурда оозго кийме жана алынбай турган, дайыма тиштерде тура турган жасалма тиш протезин жасоого болот. Тиш жулунгандан кийин жарым же бир сааттын ичинде адам жасалма тиш менен кете берет.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ — кыймылдатпай тануу. Шакшактын жардамы менен сынган жаак сөөктөрүн кыймылдат-

пай таңып байлап коюу, бошоп кеткен тиштерди шакшак менен кыймылдатпай коюу.

ИММУНИТЕТ — иммунитет. Оору козгоочу микробдорду организмдин кабыл албоочулугу, микробдорго каршы күрөшүүсүнүн күчтүүлүгү, туруштук берүүсү.

ИМПЕТИГО — импетиго. Пиодермиянын оорусунун биринчи башталышы стрептококк менен башталып, анан стафилакокк кошулат. Ал балдардын бет терисинде, эрининде пайда болот, өтө жугуштуу оору.

ИМПЛАНТАТ — имплантат. Тиштин, жаактын, беттин протезине керектелинүүчү жасалма таяныч катары колдонулуучу атайын курал. Кээ бир стоматологдор жана тиш техник лаборанттар «имплант» деп туура эмес айтышат.

ИМПЛАНТАЦИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ — ортопедиялык стоматологиядагы имплантация. Ооздон алынбоочу тиш протездерин жасоо үчүн тиштери жулунган жаак сөөккө хирургиялык жол менен имплантатты киргизип, бекитип коюу. Бул эки түрдө жасалат, биринчиси жаак сөөк кабыгынын астына, экинчиси жаак сөөктүн мурун тиштер турган альвеола кырынын ортосунан чүңкүр жасап, ошол жерге дат баспоочу болоттон, хромокобальттан, алтындын, титандын куймаларынан ар кандай формадагы казыкчаларды бурап коюшат. Казыктын бурама сайы (резьба) бар. Имплантат тоголок жана жалпак пластинка түрүндө болот. Пластинка имплантатты койгондо жаак сөөктүн кырын арыкча кылып оюп орнотот. Андан кийин имплантаттын үстүнө ооздон алынбоочу жасалма тиш жасалат.

ИМПРЕГНАЦИЯ — импрегнация. Тиштердин тамырынын каналынын тардыгынан, анын учуна чейин өтө албаган кезде, калып калган тиштин өзөгүн зыянсыз кылып катыруу үчүн резорцин-формалин же күмүштүн кошулмасынын эритмеси каналдан ичине синирилет.

ИНГИБИТОР — ингибитор. Химиялык реакцияны, физиологиялык аракетти токтотуучу же кечендетүүчү зат.

ИНДЕКС ВОССТАНОВЛЕННОСТИ КОРОНКИ ЗУБА (ИВКЗ) — тиш коронкасынын толукталгандык көрсөткүчү (ТКТК). Тиштин коронкасындагы кыттын чоңдугуна жара-

ша коронка жасоо же жасабоо аныкталат. Эгерде кыт тиштин бетин 0,2–0,4ке толуктаса, жасалма коронка жасаштын кереги жок, 0,5 болсо бир аз убакытка коронканы жасабай байкоо керек, кыт тиштин четинде болсо коронка жасоого туура келет, ал эми кыт 0,6–0,9га чейин толуктаса, айрыкча, тиштин кайсы бир капталы жок болсо, анда жасалма коронка менен каптоо керек. Муну У. А. Амираев сунуш кылган.

ИНДЕКС ГИГИЕНЫ ФЁДОРОВА И ВОЛОДКИНОЙ — Фёдоров менен Володкинанын тазалык көрсөткүчү. Тиштердин тазалыгын аныктоо үчүн Люголь эритмесин (йоддун глицериндеги эритмеси) астыңкы жаактын алты тишинин эринге караган беттерине сыйпайт. Эгерде тиштердин беттери бүтүн бойдон толук боёлсо 5 балл, төрттөн үчү боёлсо 4 балл, тиштердин жарымы боёлсо 3 балл, төрттөн бири боёлсо 2 балл жана тиштер таптаза бойдон калып, эритинди жабышпаса 1 балл. Индексстин формуласы:

$$K_{\text{орт}} = \frac{K_n}{\Pi};$$

мында $K_{\text{орт}}$ — бардык боёлгон тиштердин орточо көрсөткүчү, K_n — бардык тиштердин көрсөтүчтөрүнүн жыйынтыгы, Π — текшерилген тиштердин саны. Көрсөтмө боюнча таза тиштердин даражасы 1,0–1,2 болуу керек. Индекс саны канчалык жогору болсо, ооздун ичинин тазалыгы ошончолук төмөн болот.

ИНДЕКС ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ (ДС) — дикротикалык тишчелердин теңселүүсүнүн реопародонтограмманын теңселүүсүнүнө болгон катышы.

$$ДС = \frac{h_5}{h_2} \cdot 100\%;$$

мында изилденип жаткан органдан, ткандан кандын агып өтүүсүн көргөзөт, эгерде өзгөрүү (патология) бар болсо, кан агып өтүү азаят же көбөйөт.

ИНДЕКС ДИКРОТИЧЕСКИЙ (ДИ) — инцизуранын теңселүүсүнүн реопародонтограмманын теңселүүсүнө болгон катышы.

$$\text{ДИ} = \frac{h_4}{h_2} \cdot 100\%;$$

артериолдордун абалын көргөзөт, өзгөрүү (патология) болгондо кан агып өтүү азаят же көбөйөт. Мисалы, кан тамырлар бошошуп кеткенде (атония) 20–30%, ал эми алар жыйрылганда (спазм) 80–90% болот.

ИНДЕКС ПАПИЛЛЯРНО-МАРГИНАЛЬНО-АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ (РМА) — тиштин этинин бүртүкчөсү менен кырынын жана жаак сөөгүнүн кырынын уясынын көрсөткүчү. РМА индекси же тиштин этинин сезгенүүсүнүн (гингивит) көрсөткүчү ар бир тиштин айланасындагы тиштин этинин сезгенүү көлөмүн үч баллдык көрсөткүч менен эсепке алат. Тиштин этинин бүртүкчөсүнүн шишимек тартуусу (Р) — 1 балл; тиштин этинин кыры сезгенсе (М) — 2 балл; тиштин этинин тиш уясынын (жаак сөөгүнүн кырынын) шишип кетиши (А) — 3 балл. РМА индексинин көлөмдүк көрсөткүчү төмөнкү формула менен чыгарылат:

$$\text{РМА} = \frac{\text{баллдардын жыйынтыгы}}{3 \cdot \text{тиштердин саны}} \cdot 100\%;$$

ИНДЕКС ПАРОДОНТАЛЬНЫЙ (РИ) — пародонт көрсөткүчү. Пародонттун ооруларынын таралышын жана жыштыгын аныктоо үчүн 1956-ж. Рассел сунуштаган индекс. Ошондон бери клиникада колдонуп келе жатат. Ал ар бир тишке 0дөн 8 баллга чейин баа берген. 0 болсо сезгенүү жок; 1 — тиштин эти жеңил сезгенген, бирок тишти айланасын толук курчаган эмес; 2 — сезгенүү тиштин айланасын толук курчаган; 6 — сезгенүү күчөп, тиш менен эттин ортосунда чөнтөкчө пайда болгон, тиштин чайноо кызматы мурункудай, тиш өз ордунда; 8 — пародонт ткандары

бузулуп жарабай калгандыктан, чайноо кызматын аткаруудан калып, өтө эле шалкылдап бошоп, кыйшайып калган.

$$PI = \text{ар бир тишке карата } \frac{\text{баллдардын жыйынтыгы}}{\text{тиштердин саны}} ;$$

алынган сан PI индексин көргөзөт. Мисалы 0,1–1,0 — пародонт ооруларынын алгачкы белгисин; 1,5–4,0 — пародонт ткандарынын орточо бузулушун; 4,0–8,0 — пародонт ткандарынын оорусунун оор экендигин көрсөтөт.

ИНДЕКС ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (ИПС) — чет жактагы кан тамырлардын каршылыгынын көрсөткүчү. ИПС — инцизураны теңселүүсүнүн эң ылдыйкы чекити менен кан тамырдын бат толүшүнүн катышы.

$$ИПС = \frac{h_4}{h_1} \cdot 100\% .$$

Өзгөрүүлөрдө каршылык чукул көтөрүлөт, нормада 70–80% га барабар.

ИНДЕКС ПОНА — Пондун көрсөткүчү. Тиштердин катарынын энинин көрсөткүчү, индекси. Оң жак, сол жак кичи азуулардын же чоң азуулардын аралыгын ченеш үчүн төмөнкү формулаларга кайрылуу керек:

$$\frac{\text{мандайкы 4 кашка тиштин энинин суммасы} \cdot 100}{80} = \text{кичи азуулардын аралыгы};$$

$$\frac{\text{мандайкы 4 кашка тиштердин энинин суммасы} \cdot 100}{64} = \text{чоң азуулардын аралыгы}.$$

Орто эсеп менен кичи азуулардын индекси 80ге барабар, ал эми чоң азуу индекси 64. Пондун индексинде эсептөөлөр туура чыгат, ошого карап өзгөрүүлөр канчалык экенин билүүгө болот.

ИНДЕКС РАЗРУШЁННОСТИ ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА (ИРОПЗ) — тиштин чайноо бетинин бузулуу көрсөткүчү (ТЧББК). Бул түшүнүктү В. Ю. Миликвич сунуш кылган. Тиштин чайноо бетинин бузулушу кичине (0,2–0,4) болсо, аны кыттап коюуну, ал эми бузулуу чоң болсо (0,6–0,8) вкладка жасоону сунуш кылган.

ИНДЕКС РЕОГРАФИЧЕСКИЙ (РИ) — реографиялык индекс. Артерия кан тамырындагы агуунун эң чоң көрсөткүчү. Ом менен ченелет.

ИНДЕКС СОСТОЯНИЯ РАСТЯЖИМОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ (ИРЕС) — мезгилдин бир бирдигинде кан тамырдын бетинин чоюлушунун көрсөткүчү. Бул реографиялык толкундун анакротунун узундугуна болгон катышы.

ИНДЕКС ЭЛАСТИЧНОСТИ (ИЭ) — чоюлуу индекси. Кан тамырга кандын бат (h_1) жана жай (h_3) толушунун катышы.

$$\text{ИЭ} = \frac{h_1}{h_3} \cdot 100\%.$$

Бул кан тамырдын жумшактыгын мүнөздөйт, кандайдыр бир бузулуулар (патология) болсо катуулап калат, норма боюнча 80–90% га барабар.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА ПО БОЯНОВУ — Боянов боюнча өздүк ченкеп. Боянов өздүк ченкепти патефон пластинкасынан даярдоону сунуш кылган. Пластинка иштөөгө жеңил жана анын жолдорунда калып алуучу масса жакшы кармалат.

ИНИЦИАТОРЫ — демилгечилер. Кайсы бир заттардын ажырап, эркин радикалдарга бөлүнүүсүндө пластмассада полимерленүү реакциясы башталат.

ИНКЛЮЗИЯ ЗУБА — тиш инклюзиясы. Кандайдыр бир себептер менен тиштердин жаак сөөктүн ичинде калып чык-

пай калышы. Бул көрүнүш көбүнчө тиштердин түйүлдүгүнүн туура эмес (тик эмес) жайгашуусунан, сүт тиштин түшпөй калышынан, жаак сөөк кичине болуп, чыгууга орун жетпей же чыгуучу тиш бир кыры менен жанындагы тишке такалып калуусунан болот.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА — жат нерселер. Ок, темир-терсектин сыныгы, жыгач ж. б. нерселер бет-жаак айланасына кирип калып, өзү менен кошо ар кандай инфекцияны киргизип, абсцесс же флегмонанын пайда болушуна себеп болот.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА — тамыр каналын өтүү үчүн аспаптар. Бул аспаптарды жалпы жонунан римерлер (K-Reamer) деп атайт. R-Flexoreamer, R-Flexoreamer Golden Medium, K-Reamer Forside деген түрлөрү бар.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА — тамыр каналын кенейтүү үчүн аспаптар. Аларга K-Flexo File, K-Flexo File Golden Medium, Hedstrem File, ProFile, Greater Taper, Pro Taper кирет.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ УСТЬЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА — тамырдын каналынын оозун ачуу үчүн аспаптар. Дрилдин узундугу 15–19 мм болгон иштөөчү бөлүгү тамчы сыяктуу кыска – Gates Gliden, дрилдин иштөөчү бөлүгү узунураак жана катуу – Largo, никель-титандын кошулмасынан учу томпок жасалган бир канча аспап, кесүүчү бети 10 мм — Profile Orifice Shapers.

ИНТАКТНЫЙ — соо абал. Тиштин өзү жана аны кармап турган ткандардын сопсоо экендигин билгизүү үчүн колдонулуучу термин.

ИНТЕГРАЦИЯ КОСТНАЯ — сөөк интеграциясы. Сөөккө коюлган имплантаттын сөөккө биригиши, бул остеоинтеграция деп да аталат.

ИНТЕГРАЦИЯ ФИБРОЗНАЯ (ФИБРОИНТЕГРАЦИЯ) — фиброздук интеграция (фиброинтеграция). Сөөктүн ичине орнотулган имплантат менен жаак сөөктүн ортосунда пайда болгон бириктирүүчү талчалар, фиброздук капсула.

ИНТОКСИКА́ЦИЯ ОДОНТОГЕ́ННАЯ — тиш оорудан уулануу, залалдануу. Тиштин бузулушунан пульпит, периодонтит, тиштин этинин чөнтөкчөсүнүн тереңдеп, сезгенип, шишип кеткенинен улам интоксикация болот. Тиште пайда болгон ириндер кан аркылуу бүт денеге таралып, ууландырат. Тиштин залалы менен жүрөк, бөйрөк, боор, көз, алкым, муундар оорушу мүмкүн. Мындай учурда адамдар тишинин оорушу менен бирге өзүлөрүн алсыз сезишет, денеси ысыйт, башы ооруйт.

ИНТРАДЕНТА́ЛЬНО — тиштин ичинде деген түшүнүк.

ИНЦИЗИО́Н — инцизион. Үстүнкү жана астыңкы кескич тиштердин ортосуна келүүчү антропометриялык чекит.

ИНФИЛЬТРА́Т — шишик. Оору процессинин натыйжасында организмге клеткалык элементтердин чогулуп жыйылып, суюктуктун толуп калышы.

ИНФИЛЬТРА́ЦИЯ — шишип-көбүү. Кайсы бир жерди жансыздандыруу үчүн дары сиңирүү жана ар түрдүү заттардын денеге киришинен көөп калышы, сезгенүүнүн негизги бир белгиси.

ИНФРАДЕНТА́ЛЕ — инфрадентале. Астыңкы жаактын борбордук кашка тиштеринин моюн деңгээлинде, тиштердин алды жагында альвеоланын желөк сөөгүнүн кырына тиешелүү антропометриялык чекит.

ИНФРАОККЛЮ́ЗИЯ — инфраокклюзия. Бир же бир нече тиштердин окклюзиялык мейкиндиктен төмөн түшүп турушу.

ИНЪЕ́КЦИЯ — инъекция. Ийне саюу аркылуу организмге дары жиберүү.

ИОНОСЦЕ́Л — ионосцел. Ооздон алынбоочу тиш протездерин туруктуу бекитүүдө колдонулуучу айнекиономерлүү цемент. Францияда чыгарылат.

ИРРАДИА́ЦИЯ — иррадиация. Дененин бир жериндеги ооруну башка жерден сезүү. Мисалы, кайсы бир тиш ооруса, анын ооруганы бет, жаак, чыккый кулакка чейин берилип, какшатып кыйнайт.

ИРРИГАЦИЯ — ирригация. Жараланган, сезгенген жерди батыраак айыктыруу үчүн суюк дарыларды жаранын бетине, арасына себүү же жараны жуу, чайкоо.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ — жасалма тиштер. Тиштер жарым жартылай түшүп, тиштердин катарында кемтик пайда болгондо же тиштер толук түшүп калганда жасалма тиштер менен тиштердин катары толукталат. Жасалма тиштерди металлдан (дат баспоочу болот, алтындын куймасы, күмүш-палладий куймасы, платина), пластмассадан, фарфордон, металл-пластмасса, металл-фарфордон жасашат.

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ — аспаптар менен жана лабораториялык изилдөөлөр. Аспаптар менен изилдөөдө алдын ала угуу, сүйлөшүү, анан көрүү, сыйпалоо, анан сол колго стоматологиялык күзгү, оң колго зонд же пинцет алып, астынкы жаактын оң жактагы чоң азуу тиштеринен баштап, катары менен көрүп, сол жактагы азуу тиштерге жетип, анан үстүнкү жаакка көтөрүлүп, азуу тиштерден баштап катары менен көрүп олтуруп оң жактагы азуу тиштер менен бүтүрүү керек. Лабораториялык изилдөөлөргө тиштин тирүүлүгүн билүүчү аппараттар ЭОД-1, ооздун былжыр кабыкчасынын ийкемдүүлүгүн, рентгенография, миотонометрия, гнатодинамометрия, миография, артрография, ар түрдүү материалдан жасалган тиш протездеринин ортосунда пайда болгон токтун күчүн ченөө (гальванометр, потенциометр), тиш жасоочу материалдардын ооз ичине жакпай калышын аныктоо ж. б. изилдөөлөр кирет.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ — оорунун тарыхы. Поликлиникада же ооруканада дарылануучу оорулуулардын оорусунун жүрүшүн байкап, анын абалын баалоочу, аныктоочу медициналык жана юридикалык документ.

К

КАЙМА́ КРА́СНАЯ — эриндин кыюусу. Эриндин ортонку бөлүгү, эриндин кыясы. Ал сырткы жана ички бөлүктөн турат.

КА́ЛВЕЛИСА ПЛАСТІ́НКА — Калвелис пластинкасы. Калвелис сунуш кылган ортодонттялык аппарат. Муну менен үстүнкү жаактагы алдыга жылып калган кылкыйма тиштерди артка жылдырат. Аппаратта Коффин жана кол сымак серпилмелери бар.

КАЛСИНÓЛ — калсинол. Цинкоксидэвгенолдуу цемент, кариес тередеп кеткенде тиштин өзөгүнө доо кетирбеш үчүн төшөлчү катары колдонулат, төшөлчүнүн үстүнө пластмасса, амальгама, силикат цемент материалдарынан кыт коюуга болот. АКШда чыгарылат.

КАЛЬМЕЦІ́Н — кальмецин. 50–60% кальций кычкылынын гидратынан, 15–20% цинк кычкылынан, бир аз кан плазмасы менен альбуциддин күкүмүнөн жана карбоксилметилцеллюлоза суюктугунан турган дары. Бул тиш терең оюлуп, чирип кеткенде тиштин пульпасын сактап калуу максатында ж. б. чараларда колдонулат.

КАЛЬЦІ́Н ПА́СТА — кальцин паста. Негизи вазелин-глицерин болгон цинк кычкылы, кальций кычкылынын гидратынан турган жумшак масса. Тиштин өзөгү сезгенип баштаганда дентин клеткаларын калыбына келтирип, айыктырууда колдонулат.

КА́МЕНЬ ЗУБНО́Й — тиштин ташы. Тиштин айланасына, бүйлөсүнүн астына жана үстүнө чогулган, курамында кальций элементи бар тиштин таштары, ал шилекейдин туздары жана тамактын калдыгынан турат.

КАМПЕРОВСКА́Я ПЛО́СКОСТЬ, ЛІ́НИЯ — Кампер мейкиндиги, сызыгы. Бул мейкиндик кулактын упчусунун ортосу менен таноону бириктирип турган сызык. Бардык тиштер түшүп калганда жасалма тиштердин катарын туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

КАНАЛ КОРНЯ ЗУБА — тиш тамырынын каналы. Тиштин тамырынын ортосундагы тиштин өзөгү жайгаша турган жер. Тиште канча тамыр болсо, ошончо канал болот, кай бир тиштерде бир тамырда эки канал болот.

КАНДИДОЗ — кандидоз. Организмде сырткы жана ички факторлордун таасири менен жана антибиотик дарысын ченемсиз көп ичкен адамдардын денесинде Candida микробунун көбөйүп кетиши менен мүнөздөлгөн оору. Өтүшүнө карата курч жана өнөкөт түрдө болот. Оорунун белгиси жаргактанган, сүзмөдөй ак чекиттер болот да, убакыт өтүшү менен алар биригип, былжыр кабыкчага жайылып, ички органдарга да өтүп кетиши мүмкүн. Эгерде кандидоз ооз ичиндеги былжыр кабыкчада болсо аны кандидоздуу стоматит, тилде — кандидоздуу глоссит, эринде — кандидоздуу хейлит деп аталат.

КАНАЛОНАПОЛНИТЕЛЬ LENTULO — Lentulo канал толтургучу. Иштөөчү бөлүгү 17, 21 мм келген спираль сыяктуу, каналга кыттоочу материалды толтуруу үчүн колдонулуучу аспап.

КАНДИДОМИКОЗ — кандидомикоз. Уурттун кычыгынын сезгениши Candida себебинен (ангулярный хейлит).

КАНИНОН — канинон. Үстүнкү жана астыңкы кылкыйма тиштердин кырчуучу кырына дал келүүчү антропометриялык чекит.

КАНЦЕРОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА — канцерогендик заттар. Рак оорусун пайда кылуучу заттар. Алар айлана-чөйрөнүн таасиринен жана ички себептерден пайда болот.

КАОЛИН — ак топурак. Фарфор массасынын негизин түзүп, бириктирүүчү, байланыштыруучу катары кызмат кылат.

КАПШЫ ЛЕЧЕБНЫЕ — дарылоочу каппалар. Кыйшык чыккан тиштерди түздөөдө, жаак сөөк сынганда, пластмассадан тиштердин коронкасына убактылуу коюлуучу, шакшак катары колдонулуучу аспап.

КАРАТ — карат. 1. Жасалма тиштерди жасоодо колдонулуучу фарфор массасы. АКШда чыгарылат. 2. Алтын-

дын куймасынын тазалыгынын бирдиги да карат деп аталат. Таза алтын 24 каратка барабар.

КАРБОКО — карбоко. Өзүн жакшы көргөзө алган поликарбоксилаттуу цемент. Германияда чыгарылат.

КАРБОПЛАСТ, КАРБОПЛАСТ-М — карбопласт, карбопласт-М. Тишсиз жаактарга өздүк ченкеп жасаш үчүн чыгарылган пластмасса, өңү сары. Харьковдо чыгарылат.

КАРБУНКУЛ ЛИЦА — беттеги чыйкан. Май бездеринин түбүнүн сезгениши. Сезгенүүнүн себеби стафилакокк жана стрептококктордун көбөйүшүнөн болот. Тезирээк дарыланбаса, оору көбөйүп канга өтүп, сепсисти пайда кылат.

КАРИЕС ЗУБА — тиштин чирishi. Тишти өз убактысы менен тазалап жүрбөсө, тамактар тыгылып кала берсе, кайсы бир витаминдер, микроэлементтер жетишсиз болсо, тиште чирүү башталат (элде тишти «курт жеди» деп коюшат). Кариеc башталгандан чункур болгончо кариеc тактары, баштапкы кариеc, орто жана терең кариеc деп аталат.

КАРИЕС РЕТРОГРАДНЫЙ — ретрограддык кариеc. Кариеcтин тиштин өзөгү жагынан пайда болушу.

КАРИЕС ФИССУРНЫЙ — фиссурадагы кариеc. Тиштин фиссурасында пайда болгон патологиялык процесс.

КАРИЕС ЦИРКУЛЯРНЫЙ — моюнчанын тегерегиндеги кариеc. Тиштин моюнчасын айландыра пайда болгон патологиялык процесс.

КАРИЕСРЕЗИСТЕНТНОСТЬ — кариеcке резистенттүүлүк. Кариеc оорусуна каршы туруктуулук.

КАРИОСАН — кариеcан. Күкүм жана суюктуктан турган цемент, тиштин каналын кыттоодо жана төшөлчү катары колдонулуучу материал. Чехияда чыгарылат.

КАРКАС БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА — доголуу протездин сынчы (каркасы). Жалаң металлдан турган дого, таянып-кармоочу илмектер же ашык-машыкка окшош жана жасалма тиштерди, негизди кармап туруучу тордон турат, жалаң металлдын кошулмасынан жасалат. Сынч дат баспоочу болоттон, кобальт-хром куймасынан жана алтындын

платина кошулган 7500 белгисинен жасалат. Сынчты ийип, ширетип жана куюп жасоого болот, акыркы убакта жалаң куюу жолу менен жасайт жана ал сапаттуу болот.

КАРКАС МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА — көпүрөчө протездин сынчы, негизи. Ал металлдын куймасынан жасалат. Металл коронканын, көпүрөчө протездин негизин түзөт.

КАРМАН ПАРОДОНТАЛЬНЫЙ — пародонт чөнтөгү. Ар кандай себептерден пародонт бузулуп, ооруганда ар кандай терендиктеги чөнтөкчөлөр пайда болот. Сызгенүүнүн натыйжасында тиштин этин жаак сөөк менен тишке жабыштырып турган байламталары чирип, ажырайт, тиш бошоп, кыймылдап калат.

КАТАРАЛЬНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ — сууланып сызгенүү. Ооздун былжыр кабыкчасынын сызгенүүсү, түлөгөн эпителий клеткаларынын өтө көп бөлүнүүсү менен билинет.

КВАРЦ — кварц. Кремний диоксиди, дүйнөдө эң көп тараган материал. Ал стоматологиялык фарфордун курамын түзөт.

КВИНКЕ ОТЁК — Квинке шишимеги. Тил, жумшак таңдай, тамак, эрин, мурун ткандарында кайсы бир аллергиялык себеп же тукум куучулук менен пайда боло турган оору.

КЕЛЛОИД — берч. Коллаген жипчелеринен, фибробласттардан турган бириктирүүчү ткандардан түзүлгөн териде жана ооз ичиндеги былжыр кабыкчада дөмпөйүп, күйүктөн, көпкө созулган оорулардан, хирургиялык операциядан кийин пайда болуучу өзгөрүү. Өңү боюнча ал кызгылт, көгүш же ачык күрөң түстүү болот.

КЕРАМИКА — карапа. Чеберчиликте ар кандай минералдык кошулмаларды, оксиддерди жана органикалык эмес курамаларды кошуп күйгүзүү жолу менен ар кандай буюмдарды жасоочу материал. Стоматологиялык карапага фарфор жана ситаллдар кирет.

КЕРАМИКА ГИДРОКСИАПАТИТНАЯ — гидроксиапатиттүү карапа. Кальций жана фосфаттын композициясынын физиологиялык катышы, катуулугу, эрибестиги сөөккө жакын. Тиштин имплантатында жаңы тиштерди, жаактын тиши жок кырын өстүрүүдө колдонулат.

КЕРАМИКОР — керамикор. Ар кандай металл куймасын куюу үчүн колдонулуучу күкүм жана суюктуктан турган, фосфаттын негизинде жасалган масса. Швейцарияда чыгарылат.

КЕРАМИКСЕПАРАТОР — керамиксепаратор. Карапа массаларынын катмарын бөлүү үчүн атайын суюктук. Лихтенштейнде чыгарылат.

КЕРАТОЗЫ — кератоздор. Ооз ичиндеги былжыр кабыкчанын чордонуп, калыңдап кеткен патологиялык өзгөрүүсү. Мындай өзгөрүүлөр сырткы чөйрөнүн таасиринен жана ичеги-карын, инфекциялык жана шишик ооруларынан кийин болот.

КЕРОМЕРЫ — керомерлер. Карапа менен оптималдаштырылган полимер.

КЕТАК-СЕМ — кетак-сем. Керамика жана металл-керамика тиш протездерин бекитүүдө колдонулат. Мунун түрлөрү бар: **КЕТАК-СИЛЬВЕР**, **КЕТАК-ФИЛ**. Германияда чыгарылат.

КИСТА — шишик. Органдардын ичинде жайгашкан ичинде суюк заты бар шишик. Тиштин тамырынын учундагы канал аркылуу инфекция өтүүнүн натыйжасында пайда болот.

КИСТОГРАНУЛЁМА — кистогранулёма. Ичи эпителий менен капталган көңдөй, шишик, көлөмү 0,5–1,0 см ге жетет. Ал өнөкөт периодонтит оорусунда көпкө дарыланбай жүргөндө пайда болот. Дарылоо үчүн тиштин тамырынын учун кертип, кистаны кошо алып салуу операциясын жасоо керек.

КЛАММЕР — илмек. Илмек, оозго кийме тиш протездерин жасаганда, протезди ооздо жакшы карматуу үчүн атайын илмек жасалат. Алар кармоочу жана таянып кармоочу болуп аткарган кызматы боюнча бөлүнүшөт. Илмектер металлдын кошулмаларынан (алтын, болот) жана пластмассадан жасалып, тиштерге коюлат.

КЛАММЕР АДАМСА — Адамс илмеги. Тиш коронкасынын мойнуна гана тийип туруучу илмек. Ал ортодонтиялык аппаратты жасаганда колдонулат.

КЛАММЕР А́ККЕРА — Аккер илмеги. Өз тишке таянып кармап туруучу илмек. Ней адистер тобу доголуу жасалма тиштер үчүн таянып кармап туруучу 5 түрдүү илмектерди сунуш кылышкан, Аккер илмеги ошолордун биринчиси.

КЛАММЕР А́ККЕР-РО́УЧА — Аккер-Роуч илмеги. Доголуу тиш протези үчүн сунуш кылган Ней системасынын үчүнчү илмеги.

КЛАММЕР БО́НВИЛЯ — Бонвиль илмеги. Доголуу жасалма тиш жасаганда колдонулуучу илмек. Ал эки эселенген Аккер илмегине окшош.

КЛАММЕР ДЖЕ́КСОНА — Джексон илмеги. Доголуу тиш протезинде колдонулуучу илмектин бир түрү.

КЛАММЕР КЕ́МЕНИ — Кемени илмеги. Азуу тиштери жок болгон учурда оозго кийме тиш протезин жакшы карматыш үчүн маңдайкы тиштерге металлдан илмек коюуга туура келет. Бул илмектер косметикалык жактан жаман көрүнөт, ошондуктан металл илмектин ордуна тиштин түсүнө окшош акрил пластмассасынан тишти жаап турган илмек коюлат. Ал илмек протездин негизинин уландысы болот.

КЛАММЕР НЕПРЕРЫ́ВНЫЙ — үзгүлтүксүз илмек. Доголуу жасалма тишти жана бошоп, кыймылдап, шалкылдап калган тиштерди шакшактоодо колдонулуучу үзгүлтүксүз илмек, ал тиштердин тил же таңдай жагынан өтөт. Үзгүлтүксүз илмектин жардамы менен басымды бар тиштерге жүктөп, былжырлуу кабыкчага басымды азыраак түшүрсө болот.

КЛАММЕР РЕЙХЕ́ЛЬМА́НА — Рейхельман илмеги. Тиштерге таянып, жасалма тишти кармоочу илмектерге жатат, доголуу тиш протезин жасаганда кичи азууга, кылкыйма тиштерге коюлат.

КЛАММЕР РО́УЧА — Роуч илмеги. Доголуу тиш протездери үчүн сунуш кылган Ней системасынын экинчи илмеги. Бул илмектер негизинен кыйшайып турган тиштерге коюлат.

КЛАММЕ́РЫ ОПИРА́ЮЩИЕ — таянуучу илмектер. Доголуу жасалма тиш жасаганда колдонулуучу таянып туруучу илмектер. Таянып турганда чайноо басымы тиш аркылуу кабыл алынат.

КЛАММЕРЫ СИСТЕМЫ НЕЙ — Ней системасынын илмектери. 1948-жылы Ней башында турган жамаат: врачтар, металлистер жана инженерлер чогулуп, таянып кармап туруучу 5 түрдүү илмектерди доголуу тиш протезине колдонуу үчүн иштеп чыгышкан. Алардын биринчиси Аккер, экинчиси Роуч, үчүнчүсү Аккер-Роуч, төртүнчүсү бир таянычтуу айланма, бешинчиси эки таянычтуу айланма илмектер деп аталган.

КЛАПАН ЗАМЫКАЮЩИЙ — туюктоочу капкак. Кийме тиш протезинин капкагын, кырын чектөө. Туура чектелген протездин астына аба же суюктук кирбей, протездин астында вакуум пайда болуп, ал түшпөй тамакты жакшы чайнайт. Бул терминди В. Ю. Курляндский сунуш кылган.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗЗУБОЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ А. И. ДОЙНИКОВА — тиштери жок жогорку жаактын А. И. Дойников классификациясы. Дойников Шредердин үч классына дагы эки класс кошкон: 4-класс тиши жок үстүнкү жаактын маңдайкы бөлүгүндө сөөк бар, азуу тиштер турган жерде сөөк жок, 5-класс азуу тиштер турган жерде сөөк бар, маңдайкы жакта сөөк жок.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗЗУБОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КЕЛЛЕРА — тиштери жок астыңкы жаактын Келлер классификациясы. Классификация төрт класстан турат. 1-тиштери толук жулунган жаак сөөгүнүн альвеола кырынын жоюлуусу болор болбос, жаак сөөгүнүн кыры бийик, кийме тиш жасаганда жакшы кармалат, 2-жоюлуу өтө көп болуп, жаак сөөгүнүн кыры жокко эсе, 3-жаак сөөгүнүн кыры маңдай жакта бар, азуу жакта жокко эсе, 4-азуу тиштер туруучу жакта жаак сөөгүнүн кыры бар, маңдайкы жакта жокко эсе. Мында экинчи жана төртүнчү класстарда протез жакшы кармалбайт.

КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ В. Ю. КУРЛЯНДСКОГО — тиштери жок жаактардын В. Ю. Курляндский классификациялары. В.Ю. Курляндский тиштери жок үстүнкү жаакка өзүнчө, астыңкы жаакка өзүнчө классификация сунуш кылган. Тиши жок үстүнкү жаак үч класстан

турат: 1-класс – жаак сөөгүнүн кыры өсүк, жоюлуусу жоктой, акыл азуу жайгашкандан ары турган жаак сөөгүнүн дөмпөгү бийик, таңдайдын ортосундагы сөөктүн дөмпөгү жокко эсе, таңдай терең; 2-класс – жоюлуу орто, жаак сөөгүнүн кыры былжыр кабыкчадан жогору көтөрүлүп турат, таңдайдын терендиги орточо, ортосундагы дөмпөгү билинип калган; 3-класс – жаак сөөгүнүн кыры жокко эсе, таңдай тегиз жана акыл азуунун ары жагындагы дөмпөгү жокко эсе. Таңдайдын ортосундагы дөмпөк өсүп, оркоюп көтөрүлүп турат. Ал эми тиши жок астыңкы жаак 5-класстан турат: 1-класс – тиши жок жаак сөөктүн кыры өсүк, бийик, жаактын ички жана сырткы бетине бекилүүчү булчуңдар жаак сөөгүнүн кырынан алыс жайгашкан; 2-класс – жаак сөөгүнүн кыры орто өсүктүктө, ичинен жана сыртынан бекилүүчү булчуңдардын денгээлинде; 3-класс – жаак сөөгүнүн кыры ичинен жана сыртынан бекитилген булчуңдардын денгээлинен төмөн жайланышат; 4-класс – жаак сөөгүнүн кыры каптал жагынан көп жоюлуп кеткен, маңдай жакта өсүгүрөөк; 5-класс – жаак сөөгүнүн кыры маңдай жакта жок, каптал жагында өсүгүрөөк. Кийме тиш биринчи класста жакшы кармалат, начар кармалганы үчүнчү – бешинчи класстарда.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗЗУ́БЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ И. М. ОКСМАНА — тиштери жок жаактардын И. М. Оксман классификациясы. Жаактарда тиштер жок болгондо жаак сөөгүнүн кырынын бийиктиги ар кандай болот. Автордун классификациясы боюнча мындай абал 4-класстан турат. Классификациянын өзгөчөлүгү эки (жогорку жана ылдыйкы) жаак тең каралат. 1-класс – жаак сөөктөрү тегиз жакшы өсүк; 2-класс – жаак сөөктөрү тегиз орто өсүк; 3-класс – жаак сөөктөрү тегиз жокко эсе; 4-класс – жаак сөөктөрүнүн өсүктүгү ар кандай. Мында бир эле жаактан 1–2–3-класстарды көрүүгө болот. Автор муну тиштердин ар кандай убакытта жулунушу менен түшүндүрөт.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗЗУ́БОЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ШРЁДЕРА — тиштери жок жогорку жаактын Шрёдер классификациясы. Тиштери жок жогорку жаактын Шрёдер

классификациясы үч класстан турат: 1-класс – жаак сөөгүнүн кырынын жоюлушу болор-болбос, демек кийме тиш жакшы кармалат; 2-класста – жаак сөөгү орто жоюлган; 3-класста – жаак сөөгү тегиз, көп жоюлуп, жокко эсе болуп калган, мында кийме тиш өтө начар кармалат.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА
У. А. АМИРАЕВА — тиштердин катарынын кемтигинин
У. А. Амираев классификациясы. Бул классификация 5-класстан турат, ар бир класста экиден кошумча (же камтылган) класстары бар.

1-класс — тиштердин катарынын чектелген кемтиги:

- а) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлбөгөн;
- б) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлгөн.

2-класс — тиштердин катарынын чектелбеген кемтиги:

- а) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлбөгөн;
- б) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлгөн.

3-класс — тиштердин катарынын аралаш кемтиги:

- а) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлбөгөн;
- б) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлгөн.

4-класс — тиштердин пародонтунун оорусунда тиштердин катарынын ар кандай кемтиги:

- а) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлбөгөн;
- б) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлгөн.

5-класс — тиштердин катуу тканынын оорусунда тиштердин катарынын ар кандай кемтиги:

- а) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлбөгөн;
- б) тиштердин катарынын катышы өзгөрүлгөн.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА
А. И. БЕТЕЛЬМАНА — тиштердин катарынын кемтигинин
А. И. Бетельман классификациясы. Автор тиштердин катарынын бардык кемтиктерин эки класска бөлгөн. Биринчи класс боюнча тиштердин катарында бир же бир нече кемтик болот жана алар эки топко бөлүнөт. Биринчи топко тиштердин катарынын бир тараптуу кемтиги кирет, ал акыркы тиш менен чектелип турат. Экинчи топко жаактын эки жагын-

дагы кемтиктер кирет, анын бир жагы өз тиш менен чектелип турат. Экинчи класска бир же бир нече кемтиктери бар жаактар кирет. Бул класс деле эки топтон турат: биринчи топко тиштердин катарында бир же бир нече кемтиктери бар тиштердин катары кирет, бул жердеги кемтиктерде үчтөн ашык эмес тиштер жулунган болушу керек. Экинчи топко тиштердин катарында бир же бир нече кемтиктер болуп, аларда жулунган тиштер үчтөн ашык болот.

КЛАССИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА
Е. И. ГАВРИЛОВА — тиштердин катарынын кемтигинин **Е. И. Гаврилов** классификациясы. Ал төмөнкүлөрдөн турат: 1) бир жактуу каптал жактагы чектелбеген кемтик; 2) эки жактуу каптал жактагы чектелбеген кемтик; 3) бир жактуу каптал жактагы чектелген кемтик; 4) эки жактуу каптал жактагы чектелген кемтик, 5) маңдайдагы чектелген кемтик; 6) аралаш (бир жагы чектелген, бир жагы чектелбеген) кемтик; 7) жаакта бир гана тиш калган кемтик. Бул классификацияны оңойлотуу үчүн; 4 класс кылып айтса да болот: 1) бир же эки жактуу чектелбеген кемтик; 2) чектелген кемтиктер; 3) аралаш кемтиктер; 4) жаакта бир гана тиш калган кемтик.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА
А. Л. ГРОЗОВСКОГО — тиштердин катарынын кемтигинин **А. Л. Грозовский** классификациясы. Ал үч негизги класстан турат, жасалма тишти ошолорго ылайыктап жасашат. 1-класска – маңдай тиштердеги кемтиктер кирет. Автор аларды эки топко бөлгөн: биринчи топко маңдай тиштердин аймагында жок дегенде бир тиш болуу керек; экинчи топко маңдай тиштердин аймагында бир дагы тиш жок болот. 2-класска – азуу тиштердин аймагындагы кемтиктер (бир жактуу, эки жактуу). Автор бул классты үч топко бөлгөн. Биринчи топто кемтикте чектеп турган акыркы тиштери бар; экинчи топто кемтикте чектеп турган акыркы тиштери жок; үчүнчү топто бир жагы өзүнүн акыркы тиши менен чектелет, экинчи жагында чектеген тиш болбойт. 3-класста – кемтик маңдай жана азуу тиштердин аймагында жайгашат.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА КЕННЕДИ — тиштердин катарынын кемтигинин Кеннеди классификациясы. Төрт класстан турат. 1-класс – эки жактагы азуу тиштердин жоктугу; 2-класс – бир жактагы азуу тиштердин жоктугу; 3-класс – азуу тиштердин чектелген кемтиги; 4-класс – маңдай тиштердин жоктугу. Бул классификациянын башкалардан өзгөчөлүгү 1-, 2-, 3-класстарда кошумча дагы камтылган төрттөн класстары бар.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА Л. М. ПЕРЗАШКЕВИЧА — тиштердин катарынын кемтигинин Л. М. Перзашкевич классификациясы. Классификация эки класстан турат, ар бир класстын үчтөн камтылган класстары бар. Биринчи классты тиштердин катарында бир же эки жактуу чектелбеген, аяккы кемтиктер түзөт. Экинчи класс аралык кемтиктер, б. а. кемтиктерди аяк жагында өз тиштер чектеп турат.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА В. А. ПОНОМАРЕВОЙ — тиштердин катарынын кемтигинин В. А. Пономарева классификациясы. Автордун көз карашы боюнча бул классификация тиштердин катарында кемтик пайда болгондо тиштенүүнүн (прикустун) функциялык абалын чагылдырып, 4 класстан турат. 1-класста тиштердин катарынын кемтигинде функциялык болжолдонгон карама-каршы үч топ тиштер сакталат; 2-класста функциялык болжолдонгон карама-каршы эки топ тиштер болот; 3-класста функционалдык болжолдонгон бир топ карама-каршы тиштер сакталат; 4-класста бир жаакта тиштердин катары кемтиктери менен, ал эми карама-каршы жаакта тиштери жок. Бул классификациянын айырмасы бир жаактын тиштери жок экендигинде.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ЗУБОВ ПО БЛЕКУ — тиш бетиндеги кариес көндөйчөсүнүн жайгашуусунун Блек классификациясы. Блек классификациясы 5 класстан турат: 1-класста – тиштин кариеси бардык тиштердин табигый чункурчаларында болот; 2-класста – кариес чоң жана кичи азуулардын тийишип турган бетинде болот;

3-класста – кариес мандайкы (кашка тиштер менен кылкыйма) тиштердин тийишип турган бетинде; 4-класста – кариес мандайкы тиштердин тийишип турган бетинин бузулушу тиштин бурчуна жана кесүү кырына өтүп кеткен учуру; 5-класста – кариес бардык тиштердин моюнчасында кезигет.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛÓМОВ ВÉРХНЕЙ ЧÉЛЮСТИ ПО ЛЕ ФОРУ — Ле Фордун жогорку жаактын сыныктарын классификациялоосу. Үстүнкү жаактын ок тийбеген сыныгын Ле Фор үч класска бөлгөн: 1-класс – сыныктын жаракасы үстүнкү жаактын тиш тамырынын учу менен таңдай сөөктөрүн баш сөөктөн ажыратышы менен мүнөздөлөт; 2-класс – сыныктын жаракасы мурундун таноосу, көздүн чарасынын ички жана ылдыйкы бети боюнча бет-жаак жиги канат сымал урчукка жетет; 3-класс – сыныктын жаракасы бет сөөгүн (үстүнкү жаакты, бет жана мурун сөөктөрү) баш сөөгүнөн ажыратып коёт.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛÓМОВ ВÉРХНЕЙ ЧÉЛЮСТИ ПО В. Ю. КУРЛЯ́НДСКОМУ — В. Ю. Курляндскийдин жогорку жаактын сыныктарын классификациялоосу. Автордун жогорку жаактын ок тийбеген сыныктарын классификациялоосунун 1-, 2-, 3-класстары Ле Фордун классификациясына окшош, болгону Курляндский 4-класска бет сөөгүнүн өзүнчө (мурун, бет) сөөктөрүнүн сыныктарын бир топко (группага) киргизген.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛÓМОВ НИ́ЖНЕЙ ЧÉЛЮСТИ ПО В. Ю. КУРЛЯ́НДСКОМУ — В. Ю. Курляндскийдин ылдыйкы жаактын сыныктарын классификациялоосу. Ылдыйкы жаактын ок тийбеген сыныктарын Курляндский үч класска бөлгөн; 1-класс – сынык, тиштердин катарынын чегинде, сыныктарда тиштер бар; 2-класс – сынык тиштердин катарынын чегинде, бирок кайсы бир сыныкта тиштер жок, 3-класс – сынык тиштердин катарынын чегинин ары жагында.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛÓМОВ ВÉРХНЕЙ ЧÉЛЮСТИ ПО И. Г. ЛУКО́МСКОМУ — И. Г. Лукомскийдин үстүнкү жаактын сыныктыктарын классификациялоосу. Ле Фордун классификациясына окшош.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПО Д. А. ЭНТИНУ — Д. А. Энтиндин астыңкы жаактын сыны-
ныктарын классификациялоосу. астыңкы жаактын ок тийбе-
ген сыныгы: жаактын ортосунан, кичи азуунун тушунан, бур-
чунан жана муундун моюнчасынан болорун айткан. Бул жер-
лер астыңкы жаактын бош, морт жери болуп эсептелет.

КЛИНИЧЕСКАЯ ШЕЙКА — клиникалык моюнча. Тиш-
тин ооздо көрүнүп, тиштин этине тийишип турган бөлүгү.

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ — канды клиника-
лык текшерүүдөн өткөрүү. Кийме тиш пациентти тынсыздан-
дырганда канын алып текшерүү жүргүзүү. Уулануу-химия-
лык реакция болгондо лейкоциттер көбөйөт, эритроциттер
азайат, СОЭ көтөрүлөт, ал эми аллергиялык таасир болгондо
лимфоциттер, моноциттер көбөйөт, лейкоциттер, сегмент
ядролуу нейтрофилдер азаят.

КЛИНОВИДНЫЙ ДЕФЕКТ — шынаа сымал кемтик.
Тиштердин моюнчасында, көбүнчө сырткы бетинде, эмал-
дын жана дентиндин жешилип кетиши. Формасы боюнча
үч бурчтукка, шынаага окшош болот. Пайда болуу себепте-
ри көп, ошонун ичинен негизгилеринин бири – тишти щёт-
ка менен түз багытта сүрүп жуугандан болот.

КЛЫКІ — кылкыймалар. Ар бир жаакта экиден бо-
лот. Сырткы түзүлүшү найза сыяктуу, катуу тамакты, жипти
кырчып салат.

КОБАЛЬТОХРОМОВЫЕ СПЛАВЫ — кобальтхром куй-
масы. Жасалма коронкаларды, металлкерамика жана ме-
таллакрил коронкаларды жасаганда колдонулуучу калпак-
чаларды, тиштерди, көпүрөчө сымал жасалма тишти жана
доголуу протездерди ар кандай тиштерге таянып, жасалма
тишти кармап туруучу илмектери менен жасаганда жак-
шы куюла турган эритинди. Жыйрылуу касиети жокко эсе.
Ооз ичиндеги ткандарга зыяны жок. Курамында 0,3–0,5%
кремний, 0,5–0,7%, марганец 2,7–3,5% темир, 25–28%
хром, 62,8–64% кобальт жана 3,1–9,7% башка майда ко-
шулмалары бар.

КОГЕЗИЯ — когезия. Шилекейдин молекулаларынын ортосундагы жабышуу күчү.

КОЖНЫЙ РОГ — калындаган тери. Кератоз оорусунун бир түрү. Мында теринин эпидермис катмары өсүп кетет, сырткы көрүнүшү: таманы 1 см болуп ортосунан узарып конус формасында өсөт, ирени киргилт-сур келет, кармап көрсө катуу. Көбүнчө жашы 60тан ашкан адамдарда кездешет. Кесип, алып таштаса айыгат.

КОЛПАЧКИ ЗАЩИТНЫЕ — коргоочу калпакчалар. Жасалма тиш салуу убагында өгөлгөн тиштердин дентин түтүкчөлөрүнө ар кандай дүүлүктүргүч заттар кирбеш үчүн убактылуу коюлуучу каптама. Алар пластмассадан, целлюлойдден, жука калайдан жасалат. Ал ошол тиштин көлөмүндөй, формасындай болот. Калпакчалар заводдон даярдалып келет, аны тиш врач тиштин көлөмүнө жана кайсы тиш экенине карап, кайчы менен кесип ыкташтырып, тишке кийгизип коёт.

КОЛЛАПС — коллапс. Борбордук нерв системасынын жана башка органдардын иши токтоп, кан жана вена басымдары төмөн түшүп, кандын көлөмү азайып, адам эсучунан танган абал.

КОМА — эс-учунан тануу. Борбордук нерв системасынын кызматы бузулуп, сырткы дүүлүктүргүчтөргө жооп бере албай, кан айлануусу бузулуп, эс-учун жоготуу.

КОМОК ПИЩЕВОЙ — майдаланган тоголок тамак. Тамактын чайнап бүткөндөн кийин майдаланып жутууга даяр болгон абалы.

КОМПАКТООСТЕОТОМИЯ — компактоостеотомия. Аномалиянын өтө оор түрүндө ортодонтиялык дарылоонун алдында тиштерди бат жылдыруу үчүн хирургиялык жол менен оңдоолуучу тиштердин аймагындагы жаак сөөгүн жыш кылып көзөп чыгуу. Ошондон кийин ортодонтиялык аспап менен дарылайт.

КОМПЕНСАЦИЯ — компенсация. Оорунун натыйжасында структуралык жана функциялык бузулууларды оңдоо аракетин. Компенсациялык процесстерге регенерация, гипертрофия жана гиперплазия кирет.

КОМПОЗИТНЫЕ ПЛОМБИРОВАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — кыттоочу композит материалдар. Алар күкүм-суюктук, паста-паста, паста түрүндө болот. Алардын катып калышы үчүн көзгө көрүнгөн көк жарыкты колдонуу керек. Мисалы, эвикрол күкүм-суюктуктан, консайз паста-пастадан, ал эми силюкс болсо пастадан турат жана берүүчү Визилюкс аппаратынын жардамы менен катат.

КОМПОМЕРЫ — компомерлер. Композициялык полимерлер.

КОМПОСАЙТ — компосайт. Тиштерди кыттоодо колдонула турган химиялык жол менен катуучу паста. АКШда чыгарылат.

КОНАЛОР — коналор. Универсалдуу opak жана боёочу система. Күкүмдөн (полиметилметакрилат, пигменттер) жана суюктуктан (триэтиленгликольдиметакрилат) турат. Көпүрөчө протездин фасеткасынын металл каркасын, доголуу протездин торун өңү пластмассадан көрүнүп калбасын үчүн боёп коюуда колдонулат. Чехияда чыгарылат.

КОНВЕРГЕНЦИЯ — конвергенция. Тиштердин катарында пайда болгон, кемтикти чектеп турган тиштердин кемтикке карай кыйшайып калуусу.

КОНДЕНСОР — конденсор. Тиштин каналындагы гуттаперчаны конденсациялоочу аспап.

КОНДИЛИОН — кондилион. Астыңкы жаактын бурчунун эң арткы антропометриялык чекити.

КОНКРЕМЕНТ — конкремент. Дененин туура иштешинин бузулушун (патологиялык абалын) билдирүүчү ташка окшош катуу зат. Шилекей бөлүнүүчү жолдорго туруп калып, шилекейди тосуп, адамды көп ыңгайсыздыкка дуушар кылат.

КОНСИСТЕНЦИЯ — коюулук, тыгыздык. Изилденип жаткан органды кармап көргөндө анын катуулугун, жумшактыгын сезүү.

КОНСОЛЬНЫЙ ПРОТЁЗ — жасалма асма тиш. Тиштердин катарынын кемтигин толуктоодо, бир жагында гана таянычы бар жасалган, ооздон алынбоочу жасалма асма тиш.

КОНТАКТ МЕЖЗУБНО́Й — эки тиштин тийишкен жери. Кырка турган тиштердин бири-бири менен тийишүүсү. Жаш кезде тиштердин тийишкен бети чекиттей болот. Адам картайганда тиштердин физиологиялык жешилүүсүнүн натыйжасында, ал жерлер аянтчага айланып, тиштердин катары 1 см ге кыскарат.

КОНТАКТ ОККЛЮЗИО́ННЫЙ — тиштердин катарынын тийишүүсү. Үстүнкү жана астыңкы тиштеринин катарынын чайноо бетинин тийишүүсү, тиштешиши.

КОНТАКТ ОККЛЮЗИО́ННЫЙ ПРЕЖДЕВРЕ́МЕННЫЙ — үстүнкү жана астыңкы жаактардын кээ бир тиштеринин мурда тийишип калышы. Алар өз мөөнөтүндө физиологиялык жешилүүгө дуушар болбой калган тиштер. Мындай тиштерди бор машина менен өгөп койбосо, ал пародонттун оорусуна, тиштин бошошуна алып келет.

КОНТАМИНА́ЦИЯ — контаминация. Эки металлдын тийишүүсүндө катуу металлдын бетинде жумшак металлдын микробөлүкчөлөрүнүн калып калышы.

КОНТРАКТУРА ЧЕЛЮ́СТЕЙ — жаактардын карышуусу (контрактурасы). Ооздун аз же таптакыр ачылбай калышы. Мында чайноо булчуңдарынын кайсы бир себептер менен катып калышы. Себептери: бет-жаактагы сезгенүүлөр, былжыр кабыкча менен теринин берчтенип калышы ж.б.у.с.

КОПЛИКА-ФИЛА́ТОВА ПЯТНА — Коплик-Филатов тактары. Кызамык оорусунда пайда болуучу тактар. Көбүнчө чоң азуу тиштердин тушундагы былжырлуу кабыкчада жайланышат, өңү агыш-жашыл түстө.

КОРЕНЬ ЗУБА — тиштин тамыры. Тиштин жаак сөөгүнүн ичинде жайланышкан бөлүгү, тамырды сыртынан цемент катмары бекемдеп турат.

КОРКА — карт. Жара болгон жердин бетиндеги айыга баштагандагы катыган катмары.

КОРНЕВЫ́Е ШТИФТЫ́ — тамыр шиштери. Ал үчүн күмүш, пластмасса, гуттаперча шиштери колдонулат.

КОРО́НКА ЗУБА — тиштин коронкасы. Тиштин эмаль катмары менен капталып, көрүнүп турган калың бөлүгү. Тиштин коронкасы анатомиялык жана клиникалык деп айырмаланат. Анатомиялык коронка тиштин жешилүүсү

менен кичирейет, ал эми клиникалык коронка жаак сөөгүнүн кыры жоюлуп, тиштин этинин качышы менен чоңоёт. Демек клиникалык коронка дегенде анатомиялык коронканы жана тамырдын көрүнүп турган бөлүгүн түшүнүү керек. Тиштин коронкасынын формасы адамдын бет түзүлүшүнө карата төрт бурчтуу, үч бурчтуу жана тоголок түрүндө болот.

КОРОНКА ИСКУССТВЕННАЯ — жасалма каптама (коронка). Адамдын өзүнүн тишинин үстүнөн каптап туруучу протез. Жасалма каптама бузулган тиштин сырткы түзүлүшүн оңдоп, анын аткаруучу кызматын калыптандырат. Ал ар кандай материалдардан: металлдардын куймаларынан (алтындын, күмүш-палладийдин, дат баспоочу болоттун), платинадан, фарфордон, пластмассадан, ситаллдан, металл-фарфордон, металл-пластмассадан, компомер жана керомерден жасалат.

КОРОНКΟΣНИМАТЕЛЬ — коронка чечкич. Копп сунуш кылган аспап. Ал каптаманы, көпүрөчө сымал жасалма тишти табигый тиштен алыш, чыгаруу үчүн колдонулат.

КОРОНКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ — телескоптук коронкалар. Эки кабат коронкадан турат — ички жана тышкы. Биринчиси жаактагы таянып тура турган тишти жаап турат да, формасы цилиндрдей, конустай болот, цементке бекилет; экинчиси тиштин кейпиндей (формасындай) болуп кийме тишке жабыштырылат. Кийме (пластиналуу, доголуу) жасалма тишке телескоптук каптамаларды жасаганда алар жакшы кармалат, эстетикалык жактан утат.

КОРРЕКЦИЯ ОККЛЮЗИИ — окклюзияны жөнгө салуу. Тиштердин катарын бири-бирине тийгизип жылдырганда тиштер токтоосуз кыймылга келбей кээ бир тиштер эрте тийип, урунуп калганда көчүрмөлөгүч кара кагаз менен изин алып, ошол жерлерди өгөп коюу керек. Антпесе алар тамакты сапаттуу чайноого жолтоо болот, ал тургай мурун тийген тиш же анын каршысындагысы (антагонисти) бошоп түшүп калат.

КОРРЕКЦИЯ ПРОТЕЗА — протезди жөнгө салуу, жонуу. Жаңы жасалганда кийме тиш протезинин негизи кээ

бир жерде ашыкча болуп, былжыр кабыкчаны оорутат, ал жер кызарып, шишип, канталап, кээде жара болуп кетиши мүмкүн. Ошол жерин өгөп, оңдоп, түзөп жөнгө салуу керек. Көп ооруп кетпесин үчүн протезди кийгизген күндүн эртесине пациент жасалма тишти кийип келиши керек, өтө оорутса чечип коюп, бирок врачка келерден 2 саат мурда кийип алса, ооруган жери кызарып, билинип, врачтын жардам берүүсүнө шарт түзүлөт.

КОРРЕНТИЛ — **коррентил**. Төмөнкү жылуулукта өзү катуучу жумшак пластмасса.

КОРРОЗИЯ — **дат басуу**. Химиялык жана электр-химиялык процесстердин таасирлеринин натыйжасында металлдын бетинин чириши.

КРАМПОН — **крампон**. Фарфордон жасалган жасалма тиштерди пластмасса менен бириктирүү үчүн фарфор тиштерге платина, алтын же дат баспаган болоттон атайын урчуктуу зымдарды коюу.

КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА — **кызыл чакалай**. Бул оору менен 20–40 жаштагы аялдар көбүрөөк ооруйт. Ал ооздун ичиндеги былжыр кабыкчага да тарап кетет. Ал тургай ал бетте, мурунда, мандайда, кулактын калканында, баш терисинин чач чыккан жеринде да кездешет. Өзүнчө көпөлөк сыяктуу формада болот.

КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ — **кызыл жалпак темирөткү**. Өнөкөт сезгенүүчү-дистрофиялык оору. Пайда болуу себеби так аныкталган эмес. Көбүнчө уулануу жана аллергия оорулары себепчи болушу мүмкүн. Алгачкы белгилеринин бири кызыл көк исиркек (папула), быдыракай майда шишик. Ооздун былжыр кабыкчасында кездешип, тил менен азуу тиштердин тушунда жайгашкан. Көбүнчө 40–45 жаштагы аялдар оорушат.

КРАУДИНГ — **краудинг**. Тиштердин катары менен жайгашпай, бири-бирине учкашып, жыш болуп калышы.

КРЕМНИЙ — **кремний**. Химиялык элемент. Көптөгөн куймалардын жана болоттун курамындагы бөлүк. Дат баспоочу болоттун жабышкак жана ийкемдүү касиетин жо-

горулатып, болоттун түзүмгө бирдей түзүмгө (структурага) айландырат.

КРЕПИТА́ЦИЯ — шыкырлоо. Сөөк сынганда, теринин астында эмфизема болгондо, муундун ички кабаты сезгенгенде кармап көрүп же тыншап көргөндө угулган добуш.

КРЕПЛЁНИЕ ЗАМКОВЫЕ — кулпуга окшош бекитүү. Кийме тиш протездерин карматуу үчүн каражат.

КРИВЫЕ ОККЛЮЗИОННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШПЕЙ, УИЛСОНА — тиштешүүнүн компенсациялык Шпей, Уилсон кыйшыктары. Үстүнкү жаактагы тиш катарынын чайноо бети боюнча өткөн кыйшыктар. Алдыдан артка карай кеткени Шпей кыйшыгы, ондон солго кеткен кыйшык Уилсон кыйшыгы деп аталат.

КРИОТЕРАПИЯ — криотерапия. Суук менен дарылоо жолдору: муздак суу, кар, музду ооруган жерге коюу менен дененин кандайдыр бир бөлүгүндөгү ооруну басандатуу, кан агууну токтотуу, дарылоо.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ЛУ́НКИ — тиштин уясынан кан агуу. Көбүнчө астыңкы жаактын азуу тиштерин жулгандан кийин, гранулема, кисталарды тазалаганда альвеолалык артерияны жарып алуунун натыйжасында болот. Тиш уясынан аккан канды токтотуу үчүн аны тигет же тыгын (тампон) коюп токтотот.

КСЕРОСТОМИ́Я — ксеростомия. Ооздун ичинин кургашы. Шилекей бездеринин ооруга учурап, шилекейдин аз бөлүнүшүнөн, коюу болушунан же таптакыр шилекей чыкпай калышынан улам пайда болот. Мында ооздун былжырлуу кабыгы кызарып, жукаланууга, жоюлууга (атрофияга) учурайт.

КУЛЬТЯ́ — молток. Хирургиялык операция болгон мүчөлөрдүн калдыктарынын (молтогунун) учу. Стоматологияда тиштин коронкасынын чирип, сынып калгандан кийинки калдыгы же тишти көп өгөгөндөн кийин калган калдыгы.

КУЛЬТЯ́ ИСКУССТВЕ́ННАЯ — жасалма молток. Тиштин тамыры жакшы болуп, бирок коронка бөлүгү жок бол-

со, тиштин тамырына шиш коюп, анын үстүнө ар кандай материал (металл, пластмасса) менен тиштин коронкасындай мулук жасайт. Ал мулуктун сыртынан ар кандай жасалма каптама жасап, тишти оңдоп коёт. Мында тиштин тамыры жулунбайт жана молток тишти чектеп турган соо тиштер өгөлбөй таза калат.

КУ-ПЛЦ — ку-плц. Акрил пластмассасын кыска мөөнөттө полимерлештирүү үчүн колдонулуучу жеңил аппарат. Германияда чыгарылат.

КУПРОВЕНТ — купровент. Тиштери жок жаактардан калып алуу үчүн колдонулуучу зат. Аны жеке ченкептин кырына коюп, ар кандай кыймыл-аракет аркылуу тактоодо керектелинет, ысык сууда жумшарат Хорватияда чыгарылат.

КУТИКУЛА — кутикула. Эпителий клеткаларынан бөлүнүп туруучу кабыкча, тиштер жаңы чыкканда эмаль катмарынын эң үстүнкү катмары, бөлүгү.

КЮВЕТА — кювета. Кийме тиш протездерин жасаганда мом негизин пластмассага алмаштырганда колдонулуучу эки бөлүктөн турган металл аспап. Протез бул аспапка түз, тескери жана түз менен тескери айкалыштырылган түрдө гипстелет.

КЮРЕТА — кюрета. Тиштин этинин астындагы ташты алып, тазалоочу аспап, анын жумушчу учу томпок болот.

КЮРЕТАЖ — кырып тазалоо. Инфекциялык өнөкөт жараларды, пародонттун чөнтөкчөсүн, тиштин этинин өсүп кетишин жана анын ташын тазалоодо колдонулуучу ыкма.

Л

ЛАБОРАТОРИЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ — тиш-техникалык лаборатория. Ар кандай конструкциядагы жасалма тиштерди жасоочу өндүрүштүк комплекс. Ал жерде төмөнкүдөй бөлмөлөр болуусу керек: 1) ооздон алынуучу, бекилүүчү жасалма тиштерди жана ортодонттиялык аппараттарды жасоо бөлмөсү; 2) доголуу протездерди жасоо; 3) алтындын куймаларынан; 4) куюу үчүн; 5) гипстөө үчүн; 6) пластмас-

садан жасалуучу жасалма тиштерди бышыруу (полимер-лештирүү) үчүн; 7) жылмалап жалтыратуу үчүн.

ЛАЗЕР — лазер. Лазер нурун, шооласын иштеп чыгара турган аппарат. Түрлөрү боюнча: газ, жарым өткөргүч, катуу дене жана суюк зат лазерлери болуп бөлүнөт. Пародонт ооруларында, иммунитетти көтөрүүдө ж. б. дарылоочу себептерде натыйжасы жакшы болуп келе жатат. Стоматологияда стоматит, глоссит ооруларын дарылайт. Ошондой эле жаактын сөөгү сынганда, бет-жаак системасына операция жасаганда лазер нуру колдонулат.

ЛАЙФ — лайф. Стоматологиялык дарылоодо тиштин көңдөйүнө төшөлчү катары колдонулуучу паста. Швейцарияда чыгарылат.

ЛАК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКРЫВНОЙ — стоматологиялык шыбоо үчүн лак. Коюу, түсү ак-саргыч келген суюктук. Пластмассадан металл көрүнүп калбасын үчүн металлдын бетине шыбалат.

ЛАКТОДОНТ — лактодонт. Силикат-фосфат цементи, жаш балдардын тишине кыт коюу үчүн колдонулат. Сүт тиштерге кыт койгондо көңдөйдүн таманына төшөлчү коюлбайт. Ошондой эле балдарга жасалган ортодонтиялык аппараттарды жана тиштерге бекилүүчү жасалма тишти жабыштырганга колдонулат.

ЛЕГИРОВАНИЕ — легирлөө. Негизги куйманын өзгөчө касиетке ээ болушу үчүн бир аз санда башка металлдарды кошуу.

ЛЕГКОПЛАВКИЕ СПЛАВЫ — бат эрүүчү куймалар. Калай, коргошун, висмут, кадмийден турат. Алардан штамп, контрштамп, кураштырылган моделдер, жаактын сөөгү сынганда колдонула турган каппалар (шакшактын бир түрү) жасалат.

ЛЕЙКОЗ — лейкоз. Рак оорусу өңдөнгөн, кандын системалык оорусу: канда пайда болуучу ткандардын башаламан өсүп-өрчүшү, толук жетиле элек жаш лейкоциттер канга өтө көп кошулуп кетет, эритроциттер азайып калат. Ал турсун боордо, бөйрөктө, теринин астындагы майда жана

ичегиде, кан клеткаларында өтө көп пайда болот, оору курч жана өнөкөт түрдө өтөт. Тиштин эти кызарып, шишип, ооздун ичинин ар жеринде жаралар пайда болот.

ЛЕЙКОПЛАКІЯ — лейкоплакия. Ооз ичиндеги былжырлуу кабыкчанын эпителийлеринин өтө көп өсүп кабырчыктанып, чордонуп жана терең катмарларынын сезгениши. Алды менен майда-майда ак сепкилдер пайда болот, оору күчөгөн сайын алар чоңоюп, бири-бири менен кошулуп, чоң тактарга айланат. Ички жана тышкы дүүлүктүргүчтөрдүн таасиринен пайда болот. Лейкоплакиянын жапалак, сөөлдөй (бодур-бүдүр), жалаңкат жана чылым тартуучуларда гана болуучу Таппейнер түрү болот. Рак оорусуна жакын болгондуктан, муну онколог врачтар диспансерлик кароого алып мезгил-мезгили менен текшерип, дарылап турат.

ЛЕЧЕБНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ — дарылоонун натыйжалуулугу. Дарылоодон кийин оору кайталанбай, оорулуунун тез арада сакайып кетүүсү.

ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ — ортопедиялык стоматологиядагы дарылоочу каражаттар. Медицинанын башка тармактарында дары-дармек менен дарылоо бат-бат жүргүзүлүп турат, ал эми ортопедиялык стоматологияда дарылоо касиетке ээ болгон тиш протези бир жолу коюлса, көп убакытка чейин кызмат кылат. Ортопедиялык дарылоочу нерселер негизинен төмөнкүлөр: 1) тиштердеги жана тиштердин катарындагы жасалма тиштери; 2) тиштерди шакшактоочу аппараттар жана жасалма тиштер; 3) ортодонтиялык максат үчүн колдонуучу аппараттар; 4) бетин жаракатында (травма) колдонулуучу аппараттар; 5) жасалма жаактар жана беттер.

ЛИГАТУРА — лигатура. Тиштер бошогондо, жаак сөөгү сынганда, аларды кыймылдатпай байлаш үчүн, шакшакты карматыш үчүн колдонуучу ичке зым же жип. Зымды болоттон, алтындан, күмүштөн, жезден, калай менен алюминийдин куймасынан даярдашат. Синтетикалык жана жибек жиптер дагы лигатурага кирет.

ЛИДА́ЗА — **лидаза**. Ири кара малдын урук безинен даярдалган дары-фермент. Бет-жаактагы операциядан, күйүктөн кийин пайда болгон тыртыкты, берчтерди жок кылуу үчүн дары колдонулат. Тиштин эти ашынып же ашыкча (гипертрофия) өсүп кеткенде да лидаза колдонулат.

ЛИЗИС — **лизис**. Клеткалардын жана ткандардын ар кандай бактериялык ферменттердин таасири менен ыдырап кетиши, эзилип кетиши.

ЛИЗОЦИ́М — **лизоцим**. Организмди коргоо кызматын аткаруучу фермент, шилекейде, көз жашта, канда, без бөлүп чыгаруучу маңызда болот, стрептококк, стафилококк, гонококк микробдорун жок кылат.

ЛИКВА́ЦИЯ — **ликвация**. металлдын эритиндиси каткандан кийин структурасынын ар кандай себептерден улам бирдей болбой калышы.

ЛИМФАДЕНИ́Т — **лимфаденит**. Лимфа түйүнүн сезгениши. Айлана-чөйрөдөн ар кандай инфекциялар лимфа жана кан тамырлар аркылуу лимфа түйүнүнө жетип анын сезгенүүсүнө алып келет. Бет-жаак органдарынын ар кандай оорулары: флегмона, абсцесс, сөөктүн кулгунасы, периостит, периодонтит, фурункул, стоматит, травма ж. б. таасиринде лимфа түйүнү сезгенип, шишип, ооруйт.

ЛИМФАНГОИ́Т — **лимфангоит**. Лимфа тамырларынын сезгенүүсү, мында тамырдын ички бети шишип, тамырдан лимфанын агып өтүүсү кыйындап, бара-бара өтпөй калышы мүмкүн.

ЛИ́НИЯ «А» — **«А» сызыгы**. «А» деген тамганы айтканда катуу таңдай менен жумшак таңдайдын чеги кыймылдап турат, жумшак таңдайга бир аз калганда борбор сызыктын эки жагында билинер-билинбес эки чункурча бар, кийме тиш протезин жасаганда анын негизинин арткы кыры «А» сызыгынан өтпөстөн, ошол чункурларды жаап турушу керек.

ЛИ́НИЯ РЕЗЦО́ВАЯ — **кесүү сызыгы**. Үстүнкү жана астыңкы борбордук кашка тиштердин ортосунан өткөрүлгөн тик сызык. Беттин кыйшыктыгын, астыңкы жаактын оңго же солго кыйшайганын аныктоодо колдонулат.

ЛИНИ́Я ЧЕ́ЛЮСТНО-ПОДЪЯЗЫ́ЧНАЯ — жаак-тил асты сызыгы. Астыңкы жаактын тил жагында узунунан жайгашкан дөңчө бар, бул жерге жаак-тил асты булчуңу бекилген. Жаак сөөктүн альвеолалык өсүгү көп жоюлуп кеткенде дөңчө оркоюп көтөрүлүп, кырдуу болуп, кийме тиш менен жүргөндө ооруй турган болот. Кээ бир адистер аны ички кыйшык сызык деп айтышат.

ЛИПО́МА — липома. Теринин алдындагы май тканынын зыянсыз шишиги, дененин бардык жеринде кездешет, айрыкча эринде, маңдайда, жаактын астында, бетте, кулактын айланасында көбүрөөк болот.

ЛИТЕ́ЙНАЯ КО́МНАТА — куюу бөлмөсү. Бул бөлмөдө жасалма тиштин (протездин) бөлүктөрүн куюшат.

ЛИТЕ́ЙНЫЙ АППАРА́Т — куюучу аппарат. Тиштин ар кандай бөлүктөрүн куюуга керек аспап. Алды менен металлдын кошулмасын эритип калыпка куюшат. Куюу аспабы негизинен электр мешинен жана вакуум насосунан турат.

ЛИТЬЁ — куюу. Эритилген металлды даярдалган формага толтуруп, анын так өзүндөй кылып металлды катыруу.

ЛИ́ЦО — бет. Баштын алдыңкы жагы. Стоматологиялык ортопедиянын максаты – адамдын сырткы көрүнүшүн оңдоо, калыбына келтирүү. Мында беттин төмөнкү бөлүгү менен иштөөгө туура келет, ал – мурундун таноосунан ээктин астына чейинки аралык. Себеби тиштер түшкөндө ушул аралыктын бийиктигин өзгөртөт, ал тиш протездерин жасоо менен оңдолот. Беттин ортоңку бөлүгүндө болсо кулак, мурун, көз, бет сөөк кемтиктерин оңдойт. Беттин формасы ар кандай: чарчы, үч бурчтук жана тогологураак. Маңдай тиштер беттин түзүлүшүнө окшош болот.

ЛО́ЖЕ ИМПЛАНТАЦИО́ННОЕ — имплантациялык орун. Жаак сөөккө имплантатты коюу үчүн жасалган орун. Былжыр кабыкча менен сөөктүн чел кабыгын кесип, ачып, бор машинанын акырын айлануусунда (мүнөтүнө бир нече жүз) цилиндр же пластина формасындагы фрезалар менен жаак сөөктүн альвеола кырын оюп, бурамалуу же пластиналуу имлантатка орун жасалат.

ЛОЖКИ СЛЕПОЧНЫЕ (ОТТИСКИЕ) — калып ченке-би. Жасалма тиштерди жасоо үчүн ошол тиштердин же протезди коюучу жердин калыбын алуу үчүн ченкептер. Ал ченкептерди металлдан, пластмассадан жана момдон жасашат, алар стандартуу (көп кишиге туура келет) жана жекече (бир эле адамга туура келет) болот. Стандарттуулар металлдан, пластмассадан, ал эми жекече пластмассадан, момдон жасалат. Стандарттууну заводдон, жекечени врач же тиш-техник лаборант жасайт.

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ — нур оорусу. Келип чыгышына көбүнчө рентген нуру себеп болот. Оору төрт даражага бөлүнөт: биринчи даражада адам 200 Р өлчөмдөгү рентген нурун алганда, экинчи даража 300–400 Р, үчүнчү даража 500–600 Р, төртүнчү, эң оор даража 600 Р өлчөмүнөн ашык алганда болот. Нурдун саны өтө көп болсо, адам сокку (шок) болуп, эс учун жоготуп, ошол бойдон эсине келбей өлүп калышы мүмкүн. Нур оорусу адамда төрт мезгил менен өтөт. Биринчи мезгилде алынган нурдун көлөмүнө жараша жүрөк-кан тамыр системасынын иштеши өзгөрүп, канда ак кан денечелеринин саны көбөйүп кетет. Экинчи мезгилинде адам өзүн дурусураак сезип калат, муну эки жума байкоо керек. Үчүнчү мезгилинде адам алсырап, сөөк кемигинен иштелип чыгуучу кан элементтери азаят, ооз ичинде былжыр кабыкча канталап, шишип, жара пайда болот. Ички бездердин кызматы төмөндөп, организм тышкы дүлүктүргүч таасирлерге туруштук бере албайт. Төртүнчү мезгилинде алынган нур өтө көп болбосо, адам акырындап айыга баштайт же оору өнөкөт түрүнө өтөт.

ЛЮГОЛЯ РАСТВОР — Люголдун эритиндиси. Иод жана иоддуу калийдин глицериндеги эритиндиси. Тиштин эти, тиштин тамырынын айланасы сезгенгенде (периодонтит) электрофорез ыкмасы менен дарылоодо колдонулат. Шиллер-Писарев сыноосунда аныктагыч катары керектелинет.

ЛЮМИНЕСЭНС — люминесэнс. Фарфордон, айнекиономерлеринен, асыл металлдын куймаларынан жасалган тиш протездерин жана тиштин эмалын жалтыратууда жакшы

натыйжа бере турган аспаптар. Ал аспаптар алмаздын майда күүмү менен толукталган. АКШда чыгарылат.

ЛЮМИНОФОРЫ — люминофорлор. Жасалма фарфор жана пластмасса тиштерге кошулганда жаркылдап тура турган синтетикалык зат. Алынбай турган протездерди полимер, компомер, керамика менен каптаганда да кошот.

ЛЯБИОН — лябион. Беттин ортонку сызыгы боюнча үстүнкү жана астыңкы эриндин көбүрөөк чыгып турган антропометриялык чекити.

М

МАЗОК — мазок. Микроскоп менен текшерүү үчүн айнектин бетине сыйпалган суюктук. Суюктуктар кан, шилекей, ирин ж. б. болушу мүмкүн.

МАКРОГЛОССИЯ — чоң тил. Тилдин өтө чоң болуп оозго батпай турганы. Мындай тилди карап көргөндө анын учунда, каптал бетинде тиштердин баткан издери болот. Тилдин чоңоюшу киста, флегмона, лимфангиома ж. б. ооруларда байкалат.

МАКРОДОНТИЯ — чоң тиш. Тиштердин көлөмүнүн нормадагыдан чоң болушу. Тиштин көлөмү менен беттин катышынын бузулганы көзгө урунуп турат. Көбүнчө борбордук кашка тиш чоң тиш болуп чыгат, аны «гигант» тиш деп коёт.

МАМЕЛОН — дөмпөкчө. Жаңы чыккан маңдайкы (кашка) тиштердин кырындагы дөмпөкчөлөрдүн чоңураагы.

МАНДИБУЛЯРНЫЙ — астыңкы жаакка тиешелүүлүктү билдирүүчү түшүнүк. Мисалы, мандибулярная анестезия — астыңкы жаактагы нервдерди жансыздандыруу.

МАРГАНЕЦ — марганец. Химиялык элемент. Дат баспоочу болоттун туруктуулугун жана катуулугун жогорулатат, ийкемдүүлүгүн азайтат.

МАСКА ЛИЦА — беттин кеби. Беттин гипстен жасалган оң көрүнүшү.

МАССАЖ — укалоо, ушалоо, сылоо. Көбүнчө зат алмашуу процессин жакшыртуу үчүн жасалат. Кан, лимфанын айланышын жакшыртып, ооруган жер бат айыгат. Стоматологияда гидромассаж (суу менен), вибромассаж (дирилдөө менен), вакууммассаж (абасыз массаж), ошондой эле бармактар менен да тиштин бүйлөсүн, бет-жаакты сылап массаж жасалат.

МАСТИКАЦИОГРАФИЯ — мастикациография. Тамакты оозго салып, чайнап толук жутканга чейинки процессти жазып алуучу функционалдык ыкма. Беш фазаны график түрүндө чиймелеп көргөзөт: 1) астыңкы жаактын физиологиялык тынч туруусу; 2) оозду ачып тамакты оозго салуу; 3) тамакты чайнап баштоо; 4) тамакты чайноонун негизги фазасы; 5) тамакты тоголоктоо жана жутуу. И. С. Рубинов сунуш кылган.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ — материал таануу. Материалдын түзүлүшүн, курамын, касиетин жана аны колдонууну изилдөөчү илим.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ — стоматологиялык материал таануу. Илимдин стоматологиялык практикага тиешеси бар материалдардын жаңы түрүн табуу же көптөгөн бар материалдардын технологиялык жана клиникалык касиетин, колдонушун өркүндөтүүнү иликтеп-изилдөөчү колдонмо, б. а. практикалык бөлүмү.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ — жаактардын гипс моделин кайталоочу материалдар. Доголуу жасалма тиштердин каркасын так куюу үчүн отко чыдамдуу массалардан модель жасоо талап кылынат. Алынган отко чыдамдуу моделге доголуу тиш протезинин каркасын мом менен калыптап, металл каркасты моделдин үстүнө куйса, каркас сапаттуу болот. Моделди кайталоочу материалдарга көп жолу колдонулуучу гидроколлоиддүү термопластикалык массалар жана силикон материалдар кирет.

МАТЕРИАЛЫ МОДЕЛИРОВОЧНЫЕ — калыптоочу материалдар. Момдун ар кандай түрлөрү, гипс, оной эрүүчү металл кирет.

МАТЕРИАЛЫ СЛЕПОЧНЫЕ (ОТТИСКНЫЕ) — калып ала турган материалдар. Гипсти сууга аралаштырып калыпка куюп, үлгү алышат. Үлгүнүн жардамы менен тиш, жаак, бет жана ар кандай ортодонтиялык аппараттарды жасашат. Булардын эң байыркысы — гипс. Үлгү ала турган массалардын азыр катуу, ийкемдүү жана ысыкта жумшара турган ж. б. ар кандай түрлөрү көп.

МАТЕРИАЛЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ — стоматологиялык материалдар. Стоматологиялык практикада колдонулуучу материалдар негизинен негизги, жардамчы жана клиникалык болуп бөлүнөт. Негизгилерге протездерди, аппараттарды, кыттарды жасоочу материалдар кирет. Аларга металл жана алардын куймалары, керамика (стоматологиялык фарфор жана ситаллдар), полимерлер (базистер үчүн, каптоочу, жумшак-ийкемдүү, тез катуучу), композиттик, кыттоочу материалдар кирет. Жардамчыларга гипс, момдун түрлөрү, формалоочу материалдар, кислоталар кирет. Клиникалык материалдар — цементтер.

МАТЕРИАЛЫ ФОРМОВОЧНЫЕ — формалоочу материалдар. Металлды, полимерди куйганга форма жасоочу массалар. Негизги компоненти майда дисперстүү күкүм жана байланыштыруучу, бириктирүүчү суюктуктан турат. Бул материалдар төмөнкүлөргө бөлүнөт. Гипстүү (сульфаттуу) материалдар 25–45% гипстен, 55–75% кремний окисинен турат. Кремний окисинде кварц, тридимит жана кристобалит болот. Гипстүү формалоочу материалдарга Силаур, Силаур-3Б, Силаур-9; СМ-10 Кристобалит, Глория специаль, Экспадента ж. б. кирет. Фосфаттуу формалоочу материалдарга Силикан, Силикан-Г, Уолдвест, Пауэр Кэст, Пауэр Кэст Ринглесс Систем, Сегакест, Вест Джи, Фудживест и Фудживест Супер, Альфакост 2, Керамикор ж. б. кирет. Силикаттуу формалоочу материалдарга Формалит, Аурит, Вироплюс, Бегостал, Дегувест-НFG, Ауровест Софт и Дегувест Софт, формалоочу Цитрин, Лютова, Манукян массалары ж. б. кирет. Ошондой эле белгилүү формалоочу материалдарга кошумча Силамин, Кристосил, Формолит, Мольдин Сиолит, Стомаформа ж. б. чыгарылат.

МАЦЕРА́ЦИЯ — жумшаруу. Тиштин жасалма коронкасы кенен жасалып калганда, адегенде коронканы кармап турган цемент эзилип чыгып жок болуп кетет, коронканын ичине тамак кирип, чирип, тиштин эмаль, дентин катмарларын жумшартат. Ушул убакта коронканын ичиндеги тиш ооруп баштайт, ооздон сасык жыт чыгат, соргондо чирик даамданат. Коронканы чыгарганда тиштин коронка бөлүгүнүн көлөмү сакталган болот, бирок туздардын бардыгы жуулуп чыгып кеткендиктен зонд менен сайганда зонд кирип кетет.

МЕДИА́ЛЬНЫЙ — медиальный. Тиштин, жаак сөөгүнүн, дененин башка бир жерлеринин ортого караган жагы. Мисалы, эки чоң кашка тиштин бири-бирине тийип турган жери **МЕДИАННЫЙ**, ал эми чоң кашка тиштин кичи кашка тишке тийип турган жагы **ДИСТАЛЬНЫЙ** деп аталат. Ал эми кичи кашка тиштин чоң кашка тишке тийишип турган кыры **МЕДИАЛЬНЫЙ** деп аталат.

МЕЖЗУБНО́Й — тиштердин ортосу.

МЕЛАНО́МА — кара шишик. Денедеги менден, калдан пайда болгон шишик.

МЕНТО́Н — ментон. Астыңкы жаактын ортодогу бириккен жеринин эң төмөнкү чекити.

МЕТО́Д ГЕ́РБСТА — Гербст ыкмасы. Тиштери жок, кызыл ээк кезде кийме тиш протезин сапаттуу жасоо үчүн функционалдык калып алууда колдонулуучу ыкма. Мында калып алып жатканда протез кийүүчү киши оозун чоң ачат, шилекейин жутат, тилинин учу менен үстүнкү жана астыңкы эриндерин жалайт, тилдин учун мурундун учуна жеткирет, тилди ууртка, оңго-солго такайт, эки эринди түтүктү үйлөгөндөй кылып созот ж. б. Бул сыноолорду бир нече жолу кайталоо керек.

МЕТО́Д МАКА́РИ — Макари ыкмасы. Тиштердин, жаактын сөөгүнүн туура эмес өскөндүгүн аныктоочу ыкма. Ал көбүнчө астыңкы жаак өспөй, артта (дистальный прикус) калганда колдонулат.

МЕТО́ДИКА ХОРОШÍЛКИНОЙ-МАЛЫ́ГИНА — Хорошилкина-Малыгин ыкмасы. Тиш-жаак системасынын

өзгөрүлүшүн аныктоо ыкмасы. Баш сөөктүн чайноо, бет, мээ бөлүктөрүнүн катышы жана жумшак ткандардын жайгашуусу баштын каптал бет жагынан жасалуучу телерентгенограмманын жардамы менен аныкталат.

МЕТОДЫ ШТАМПОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИСКУССТВЕННЫХ КОРОНОК — жасалма металл коронкаларды штамптоо жолдору. Штампоонун 3 жолу бар: 1) ички штамптоо, Шарп ыкмасы, жасалма коронканын формасын алып, ичине гильзаны коюп, гильзанын ичине майда бытыра салып, бытыраны түйүү, соккулоо жолу; 2) сырткы штамптоо, Паркер ыкмасы, металл штампикке форма берилип, күйгүзүлгөн коронканы каолинде пресстөө жолу; 3) кураштырылган штамптоо, ММСИнин (Москва медициналык стоматологиялык институту) ыкмасы, бромштром, пестик аспабы жана оной эрүүчү металлдын жардамы менен жүргүзүлөт.

МИАЛГИЯ — миалгия. Чайноо булчунунун көп иштегенден кийин оорушу.

МИАСТЕНИЯ — миастения. Булчундун алсыздыгы.

МИКОЗЫ — микоздор. Адамды жана жаныбарларды чач, тырмак ооруларына дуушар кылуучу микобактериялар.

МИКРОГЕНИЯ — төмөнкү жаактын толук өспөй калуусу. Мындай кишилерди элде «куш мурун» деп да аташат.

МИКРОГЛОССИЯ — тилдин кичинелиги. Тилдин көлөмүнүн кичине болушу, көбүнчө тубаса болот. Ар кандай оорулар: тилге жара чыгуу, операциядан кийинки берчтенүүдөн өспөй калуусу да себеп болот.

МИКРОГНАТИЯ — жогорку жаактын кичинелиги. Үстүнкү жаактын өспөй калышы.

МИКРОДЕНТИЯ — тиштин кичинелиги. Тиштин катарында кайсы бир тиштердин көлөмүнүн кичине болуп калуусу, бул өзгөрүү тубаса болот.

МИКРОМЕТР — микрометр. Ортопедиялык аспап, калыңдыкты жукартуу тактыгын (1/10 мм ге чейин) аныктоодо колдонулат.

МИКРОСТОМИЯ — кичинекей ооз. Күйгөн, үшүк алгандан же жарадар болгондон кийин айыккан ооздун кичире-

йип калышы. Уурт, эрин берчтенип, ооз чоң ачылбайт. Бул көрүнүш тубаса болушу да мүмкүн.

МИКСОМА ЧЕЛЮСТИ — жаак сөөгүнүн шишиги. Шишик көбүнчө астыңкы жаак сөөгүндө жайгашат, кээде жогорку жаакта да болот (30 жашка чейин). Шишик бат өсүп тарайт, хирургиялык ыкма менен кесип алып таштабаса, кайталана берет.

МИОЗИТ — булчундун сезгенүүсү. Жанчылуудан, суук тийгенден, грипп оорусунан кийин болот. Чыккый жана жаак булчуңдары бат эле сезгенет, мында ооз ачылбай, тамак чайноо кыйын болуп калат.

МИОРЕЛАКСАЦИЯ — бошондоо, шалдыроо. Дарылардын жардамы менен булчуңдардын чымыркануусун басаңдатуу.

МИОТЕРАПИЯ — миотерапия. Тиш-жаактын туура эместигинде (аномалия) дарылоодо жана алдын алуу иштеринде булчуңдарды дарылоо ыкмасы.

МОДЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ — жардамчы үлгүлөр. Протез жасалуучу жаактын карама-каршы жагынын үлгүлөрү.

МОДЕЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ — диагностикалык үлгүлөр. Ортопедиялык жана ортодонтиялык стоматологияда диагнозду туура коюу үчүн алынган модель. Мисалы, ортодонтиялык (тиш-жаактын кыйшыктарын) дарылоодо дарылап баштай электе, дарылап жатканда дарылоо кандай жүрүп жаткандыгын тактап турууда колдонулат.

МОДЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ — көзөмөл үлгүлөр. Бул моделдер дарылоо башталганга чейин жана дарылоо бүткөндөн кийин жасалып, дарылоонун натыйжасын көргөзөт.

МОДЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ — отко чыдамдуу үлгүлөр. Акыркы мезгилде металлдын куймаларын моделде куюу кенири таралууда. Отко чыдамдуу Бюгелит, Силамин, Кростосил-1, Кростосил-2 (Россия), Кростобалит (США), Вироплюс, Вировест, Виропайнт, Белловест Т, Бегорал, БегоСол, Ауруплюс, Тонковест, Ликвид-контроль, Беллатерм (бардыгы Германияда чыгарылат) массалары 1400–1700°Сге чейин

ысытса да, физикалык жана химиялык касиеттерин өзгөртпөйт. Ошондуктан өтө татаал конструкциядагы доголуу протездердин каркасын отко чыдамдуу моделдерде куйганда протез сапаттуу болот.

МОДЕЛИ РАБО́ЧИЕ ИЛИ ОСНОВНЫ́Е — жумушчу же негизги үлгүлөр. Бул моделдерде жасалма тиш же ар түрдүү бет-жаак жана тандай аппараттары жасалат.

МОДЕЛЬ СЕПАРА́ТОР — үлгү сепаратор. Гипсти керамика массадан бөлүү үчүн жасалган атайын суюктук. Гипстин бетине сыйпагандан кийин 2 мүнөттө кургап, катмар пайда болот. Лихтенштейнде чыгарылат.

МОДИО́ЛЮС — модиолюс. Ооздун бурчунун тегерегинде жайгашкан сегиз ымдоо булчундарынын ооздун кире беришин эрин жана уурт жакка бөлүп турушу.

МОЛО́ЧНИЦА — оозул. Жаш баланын тили, эриндеринин ичи ылжырап сезгенүүсү, ооздун ичи көчүп кеткен оору. Мында бала тамактана албай, дененин температурасы көтөрүлүп кыйналат.

МОЛО́ЧНЫЕ ЗУ́БЫ — сүт тиштер. Сүт тиштерди рим цифрасы менен белгилейт. Алар 5,5–6 айдан 30–36 айга чейин чыгып бүтөт, саны 20 болот.

МОЛО́ЧНЫЙ ПРИ́КУС — сүт тиштердин катышы. Үстүнкү жаакта төрт кашка тиш, эки кылкыйма, төрт азуу тиш болуп, бардыгы 10 болот, ылдыйкы жаактагы 10 тиш дагы ушундай аталат.

МО́НСОНА КРИВА́Я — Монсон ийриси. Автордун далилдөөсү боюнча тиштердин кесүү жана чайноо бети диаметри 20 см болгон сферанын бетине тегиз тийип турса, ал эң жакшы окклюзиялык тегиздик боло алат.

МОЛЬДИ́Н — мольдин. Глицерин менен каолиндин (ак топурак) кошулмасы. Жасалма жана ортодонтиялык коронка жасаганда керектелүүчү материал.

МОЛЯ́РЫ — чоң азуулар. Үстүнкү жаакта үч, астыңкы жаакта эки тамырлуу болот. Чайноо беттери жайык келип, 4–5 дөмпөкчөлөрү менен тамакты майдалап чайнайт.

МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ — көпүрөчө протез. Тиштердин кыркасында эки жагы чектелген кемтик пайда болгондо коюлуучу эки жактан таянычы бар жасалма тиш. Бул тиш ооздо туруктуу жана ооздон алына турган болушу мүмкүн.

МОТИВАЦИИ К ПРОФИЛАКТИКЕ — алдын алууга кызыктыруу. Стоматологиялык оорулардын алдын алууга адамды кызыктыруу аракети. Ал үчүн массалык түрдө туура жашоонун гигиенасын дайыма аткарууну үйрөтүп түшүндүрүү. Жашына, адистигине байланыштуу жекече иш аракет өзүнчө болот.

МУМИФИКАЦИЯ — мумиялаштыруу (кургатып катыруу). Тиштин өзөгүн дарылоодо канал тар болуп, толук ачылбай калганда аны химиялык заттар менен катырып, кургатып зыянсыздандыруу.

МЫШЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЕ — клиникалык ой жүгүртүү. Пациентке тиешелүү диагностикалык жана терапиялык маселеде врачтын аң-сезимдүүлүк менен өзүнүн тажрыйбасын, билимин, илимин, клиникалык мүмкүнчүлүгүн эффективдүү пайдалануу үчүн ойлонуп аракеттенүүсү.

МЫШЦЫ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ — чайноо булчундары. Жаакты кыймылга келтирип, чайноо процессин ишке ашыруучу булчундар. Алар бир учу менен астыңкы жаакка бекилип, аны ар кандай кыймылга келтирет. Астыңкы жаакты көтөрүүчүлөр: чыккый, чайноо, ички канат сыяктуу; төмөн тартуучулар: эки карындуунун алдыңкы булчуңу, жаак-тил асты, ээк-тил асты; алдыга жылдыруучулар: сырткы канат сыяктуу булчундар. Төмөнкү жаакты артка тартууда ээк-тил булчуңу да аракеттенет.

МЫШЦЫ МИМИЧЕСКИЕ — ымдоо булчундары. Бул булчундардын баштары сөөккө бекилбейт, алар теринин астында жайгашышат. Сүйлөгөндө, күлгөндө, оозду ачканда, жапканда, чекени тырыштырганда, кулакты кыймылдатканда ж. б. кызмат аткарат.

МЫШЬЯКОВИСТАЯ ПАСТА — мышьяктуу паста. Тиштин өзөгү сезгенгенде, катуу ооруганда колдонуучу уулуу зат. Кошулмасында мышьяктан башка кокаин, тимол же преднизолон, танинге окшош дарылар болот.

МЫЩЕЛКОВЫЙ ОТРОСТОК — муун жөлөк өсүгү. Чыккый-астыңкы жаак муунунун негизги бөлүгү, астыңкы жаактын өсүгүнүн чыккыйга жетип, жумуруланып бүткөн өсүгү.

Н

НАДДЕСНЕВИК (ЭПУЛИС) — эпулис. Тиштин бүртүгүндө жана тиштин моюнунун айланасында пайда болгон өсүк.

НАДКОСТНИЦА — сөөктүн кабыгы. Тыгыз бирикме ткандан түзүлүп, сөөктү каптап турган жана майда кан тамыр менен нервге бай кабык.

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА — жылмалоочу кагаз. Кагаздын же матанын бетине жабыштырылган корунддун, темирдин күкүмүнөн жана майда кумдан (кремнезём) турган, жасалма тиштерди жылмалоочу кагаз.

НАЗАЛЬНЫЙ — назальный. Мурунга тиешелүү дегенди билдирүүчү түшүнүк. Мисалы: үстүнкү жаактын мурун жөлөк сөөгү (носовой отросток верхней челюсти).

НАЗИОН — назион. Бет сөөгүн капталдан караганда ортоңку сызыгы боюнча мурун сөөк менен мандай сөөк бириккен антропометриялык чекит.

НАКЛЁП — наклёп. Согуунун натыйжасында металлдын катуулугун арттыруу.

НАКОВАЛЬНЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ — тиш техникалык дөшү. Таманы төгөрөк, оор металлдан жасалып, агатик (вертикалдуу) устун коюлат. Таманда, устунда көлөмү, формасы тиштерге окшош өсүктөр (талча) болот, өсүктөрдүн жардамы менен жасалма коронканын зарыл формасын алдын ала келтирип алат.

НАКОНЕЧНИК — учтук. Бор машинанын жеңинин акыркы механизми. Учтукка врач ар кандай кесүүчү (таш, бор, диск) аспаптарды салып, тишти өгөйт, кесет. Учтуктун түз жана бурчтук түрлөрү бар, түз учтук үстүнкү жаактын тиштерин ал эми бурчтугу астыңкы жаактын тиштерин дарылоого ыңгайлуу.

НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ — айдош мейкиндик. Туура эмес өскөн тиштерди, жаак сөөгүн ондоочу ортодонтиялык аппараттын бир бөлүгү — жантык аянтча. Тиштер аппараттын энкейиш бетинде тамак жеген сайын сыйгаланып олтуруп түздөлөт.

НАЛЁТ ЗУБНОЙ — тиштин кебери. Тиштерин дайыма тазалабагандарда, айрыкча тамеки тарткандарда, тиштин эти сезгенгенде, кайсы бир тиш ооруп, ошол жак менен тамак чайнабай калганда тиштердин бетинде жабышкан катмар пайда болот. Ушул бойдон кала берсе ал тиштин ташына айланып кетет.

НАПОЛНИТЕЛИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ — композиттик материалдардын толуктагычтары. Тиштерди кыттоо үчүн колдонулуучу заттардын өңүн тиштерге окшоштуруу жана алардын тишке жабышкактыгын жогорулатуу үчүн кошулган заттар. Толуктагычтардын саны аз эле пайызды түзөт.

НАПЫЛЕНИЕ — чандаштыруу. Жогорку ысыктыкта, абасыз көлөмдө, тиштин бетине күкүм түрүндөгү заттарды чандатып жабыштыруу. Мисалы, дат баспоочу болоттон жасалган жасалма тиштердин бетине титан нитритин жана цирконийдин чанын жабыштырганда алар сары (алтынга окшош) түскө боёлот, алардын катуулугу артып көпкө чыдайт.

НАРКОЗНЫЙ АППАРАТ — уктатуу аспабы. Оорутпоо жолу менен организмдин кээ бир жеринин же бүтүн бардыгынын сезүүсүн жоготуу үчүн колдонуучу аспап. Наркоз менен уктаганда адам кыймылдабайт, кескенди, сойгонду сезбейт, булчун эттери жыйрылбай, операция жасоого тоскоолдук кылбайт.

НЁБНЫЕ СЛЕПЫЕ ЯМКИ — тандайдын сокур чункуру. Катуу тандай менен жумшак тандайдын чек арасында, катуу тандайды тең экиге бөлгөн сызыктын эки жагында бирден эки чункурча жайгашкан. Алар кийме тиш жасаганда, анын акыркы кырын, жумшак тандайды канча жаап турарын көргөзүүчү болжол.

НЕВРАЛГІЯ — невралгия. Анатомиялык бир аз өзгөрүүлөрдүн натыйжасында боло турган четки нерв талчаларынын оорусу. Функционалдык-динамикалык бузулуулардан келип чыккан өзүнөн өзү курч, катуу оору. Нерв талчалары тараган жер ооруйт, ошол жерлерде тери кызарып, бозоруп, тердегенсип же кургап турат. Түнкүсүн оору күчөбөйт, ооруган адам тынч уктайт.

НЕВРИТ — неврит. Четки нерв тамырларынын анатомиялык өзгөрүүлөрдөн улам пайда болуучу оорусу. Мында ооруган жердин кичирейип, азайып жоюлушу (атрофия), булчундун күчүнүн азайышы, сезгичтиктин төмөндөшү байкалат, кыймылдоо, ж. б. иш-аракеттер басандап, толук иштебей шал болуп калат.

НЕЙРОПАТІЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ОДОНТОГЕННАЯ — үч илтик нервдин тиштин себебинен оорушу. Тишти же анын тамырын жулганда, ийне сайганда, тиштин каналы аркылуу аны дарылаганда заттардын көп чыгып, үч илтек нервди басканда, жанчылганда боло турган оору. Оорунун пайда болушуна тиштин оорусу себепчи болот. Мында жулунган тиштин орду же дарыланган тиш жана анын айланасы сыздатып ооруйт, тиштин, тиштин этинин, тилдин жармысынын, ошол жактагы беттин сезгичтиги азаят, кээде эч нерсени сезбей да калат. Айыктыруу үчүн физиотерапиялык дарылоону колдонуу керек.

НЕЙРОФИБРОМАТОЗ (болезнь Реклингхаузена) — нейрофиброматоз. Оорунун негизги белгиси былжырлуу кабыкчада жана териде нейрофиброма (нерв тканынын чарымдуу шишиги) – темгил-тактар көбөйүп кетиши. Оору бир эле үй-бүлөдө болуп, психикалык, гормоналдык, неврологиялык өзгөрүүлөргө дуушар кылат. Балдар өз теңтуштарына караганда акыл-эси начар болот. Өсүшү, чоңоюшу жагынан артта калат.

НЕКРОЗ — өлүмтүккө айлануу. Тиш-жаак системасында үшүктөн, күйүктөн болот. Ошондой эле тиштин өзөгүн жансыздандырууда мышьяк пастасын колдонушат, пастанын былжыр кабыкчага, жаак сөөгүнө тийишинен алар өлүмтүккө айланат.

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ К ПЛАСТМАССОВЫМ ПРОТЕЗАМ — пластмасса жасалма тиштин жакпагандыгы. Пластмассадан жасалган кийме тиш менен жүргөн кээ бир кишилерде ар түрдүү тынчсыздануулар пайда болот. Кийме тишти (протезди) ооздон алып койсо, басылып калат. Мындай учурда пластмассаны бышыруу технологиясы бузулудан деп айтууга болот, бирок кээде технология так аткарылганда да абал өзгөрүлбөйт. Анда кийме тиштин пластмасса негизин металлдан жасоо керек.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ГЛОТАНИЕ — туура эмес жутуу. Тамакты жутуу аракетинде тил, уурт, жумшак таңдай, ооздун астындагы булчундар, тамак, кызыл өңгөчтөр ишке кирет. Нормада тамак жутканда тиштер (үстүнкү жана астыңкы жаактагы) тиштенип, тийишип турат, эриндер дагы. Тил катуу таңдайдын алды жагына жана үстүнкү мандай тиштердин моюнчаларына такалат, тил алдындагы сөөк көтөрүлөт да, ооз көңдөйүндө басым көбөйүп, тамак жутулат. Жаңы төрөлгөн, эмчектеги баланын тиштери жок болгондуктан, жаак жабылбайт, тил таңдайга такалбастан, эринге жана ууртка такалат. Мындай жутуу 8–10 айга, тиштер чыкканга чейин созулат. Бул туура эмес жутуу, эгерде бала эмчек эмбей, бөтөлкөдөн тамактанып чоңойсо, өмүр бою ушинтип калат. Мунун себеби упчу узун жана көзөнөгү чоң болгондуктан, сүт, суюк ботко өзү эле агып келип, баланын астыңкы жаагы соруу кызматын дээрлик аткарганандыгында. Бул акыры бала чоңойгондо ачык тиштенүүчү (прикустуу) болушуна же астыңкы жаактын өспөй калышына алып келиши мүмкүн.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ — дат баспоочу болот. Жасалма коронкаларды, көпүрөчө протездерди, шакшактарды, илмектерди даярдоо үчүн колдонулат. Курамы: 0,1% көмүртек, 18% хром, 9% никель, 0,3% кремний, 0,5% марганец, 2% га жакын титан жана 70% темир. Кайнатып куюу үчүн ЭИ-95 маркасындагы болот чыгарылат, мында кремний, хром, никелдин кошулмасы көбүрөөк. Бул КХК – кобальт, хром эритиндиси.

НЕСТИРАЕМОСТЬ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ — тиштин катуу тканынын (эмаль, дентин) жешилбей калышы. Адам 35 жашка чыккан убакта кылкыйма, кичи жана чоң азуулардын курч дөмпөктөрү жешилип, аянтчага айланышы керек. Жешилбесе тиштер тишке урунуп отуруп бошоп, кыймылдап түшүп калат. Ошондуктан врач стоматолог кара кагаздын (копирка) же момдун жардамы менен аларды таап өгөп, резина менен жылмалап койсо тиштер көпкө турат. Врач өгөгөндөн кийин тиш кариес менен ооруп бузулбайт.

НЕСЪЁМНЫЙ ПРОТЁЗ — алынбоочу же бекилүүчү протез. Жасалма тиштин цементтин же атайын жасалган желимдин жардамы менен табигый таяныч тиштерге бекитилген түрү.

НЁБО — таңдай. Ал катуу жана жумшак бөлүктөрдөн турат. Ооз көндөйү менен мурун көндөйүн бөлүп, калпактай болуп ооз ичин түзөт.

НИКЕЛЬ — никель. Химиялык элемент. Дат баспоочу болотко жогорку катуулукту берүү менен бирге, аны ийкемдүү, жабышкак кылып, дат баспоочулук касиетин күчөтөт.

НОБУС ТМ — нобус ТМ. Жогорку ысыктыкта полимерленүүчү жумшак пластмасса. Ал полифосфазендүү флюорэластомерден турат.

НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЛИ ФОРМЫ — нозологиялык бирдиктер же формалар. Морфологиялык жана функционалдык өзгөрүүлөрдүн негизинде өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери бар, пайда болуу себеби жана механизми билинген оорулардын түрлөрүнө же формаларына кирет.

НОМА — нома. Ооз, мурун, беттин жумшак ткандарын жабыркатуучу нымдуу, ириндүү жара. Териден сөөккө чейинки ткандарды жаралантып, ириндетип, сөөктөн ажыратып коёт. Бул оору менен 2 жаштан 15 жашка чейин балдар көп оорушат. Ооздогу жара-чирик оозулдай болот. Оору жыныс органдарында жана арткы тешикте да болот.

НОРАКРИЛ-100 — норакрил-100. Тиштерге кыт коюу үчүн чыгарылган акрил пластмассасынан жасалган зат. Ал ар кандай өңдөгү күкүмдөн жана суюктуктан турат. Күкүмдүн 80% толуктоочу катары кварцтан, өң берүүчү

боёктон турат, толуктоочу тишке жабышкактыгын жогорулатып, көлөмүнүн кичирейишине, жыйрылышына жол бербейт, күкүм менен суюктук аралашканда полимерлешүү процесси жүрүп, пластмасса катат.

О

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ — оорутпоо. Сезгичтикти атайын жоготуу, стоматологияда кеңири колдонулат. Дарылай турган жер ооруй турган болсо, ал жердин сезгичтигин убактылуу жок кылып, адамды кыйнабай, чочутпай, оорутпай жумуш бүтөт. Мисалы: пульпит, периодонтитти дарылаганда ийне сайып койсо адам эч нерсе сезбейт. Тиш же тиштин тамыры жарабай калса аны жулуу үчүн да ийне сайылат. Ийне саюу үчүн новакоин, тримекаин, лидокаин, рихлокаин, убистезин, септанест ж. б. дарылардын эритиндилери колдонулат.

ОБЖИГ — күйгүзүү. Ар кандай материалдарды ысытып, күйгүзүп жана жогорку ысыктыкта бир нече убактыка кармап, ысыткан материалды каалаган касиетке ээ кылып, керексиз аралашмалары болсо аларды жок кылуу. Алтынды тазалоодо, фарфор тиштерин жасоодо, дат баспоочу гильзаны жумшартууда күйгүзүү иштери жүргүзүлөт.

ОБЛИТЕРАЦИЯ — тарылуу. Адам улгайган сайын тиштин ичиндеги көңдөйү жана каналы тарый берет, каналдары тарып, бүтөлүп калган тиштерди дарылоо кыйыныраак. Ар кандай дарылар, аспаптар менен кеңейтип дарылоого аракеттенүү жакшы натыйжа берет.

ОБЛОЙ — облой. Металлды штамптаганда, куйганда кырында пайда болгон кабырчык.

ОБМОРОК — эстен тануу. Стоматологиялык иш аракетте мындай көрүнүштөр боло берет. Кээ бир коркок адамдар тиштин тамырын же тишти жуларда шприцти көргөндө эле же ийне сайгандан кийин эстен танып, кан басымы түшүп, муздак тер басып, жыгылып калат.

ОБОЛОЧКА СЛІЗИСТАЯ ТВЁРДОГО НЁБА — катуу таңдайдын былжыр кабыкчасы. Таңдай сөөктүн чел кабыгы менен тыгыз өскөн былжыр кабыкчасы. Люнндун аныктамасы боюнча төрт зонага бөлүнөт: 1) таңдайдын так ортосунан алдыдан артка карай өткөн — борбордук зона (былжыр кабыкчанын астында катмар жок); 2) таңдайдын жантыгы боюнча азуу тиштерге чейинки четки зона (былжыр кабыкчанын астындагы катмары болор-болбос); 3) таңдайдын алдыңкы жагындагы үчтөн бир бөлүгү — майлуу зона (былжыр катмардын астында май катмары бар); 4) таңдайдын арткы жагындагы үчтөн эки бөлүгү — бездүү зона (былжыр кабыкчанын астында былжыр бездери, майда кан тамырлар, май катмары көп жайгашкан). Төртүнчү зонаны Е. И. Гаврилов менен В. И. Кулаженко буфердик зона деп аташкан.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗУБОВ — тиштерди изилдөө. Тиштерди изилдөөдө стоматологиялык күзгү, зонд, пинцет керек. Сол колго күзгүнү, оң колго зонд же пинцетти кармап оң жактагы астыңкы азуу тиштерден баштайт, карап олтуруп сол жактагы азуу тиштерге жетет, анан сол жактагы үстүңкү азуу тиштерден баштап, оң жактагы азуу тиштерге чейин карайт. Күзгү тиштерди бардык жагынан (ичи, сырты) кароого мүмкүнчүлүк берет, зонд кариестин тереңдигин, тиштин этинин чөнтөкчөсү болсо анын тереңдигин, пинцет менен тиштин кыймылдаганын аныктайт.

ОБТУРАТОРЫ — **обтураторлор**. Катуу жана жумшак таңдайлардын жырыгын жабуу үчүн жасалуучу атайын протез. Алар каучуктан, металлдан, пластмассадан жасалат. Ооз көндөйү менен мурун көндөйүн айтылган протез менен чектегенден кийин соруу, жулуу, чайноо жана тагыраак сүйлөө калыбына келет. Катуу таңдай жырыгын оңдоо оңой, жумшак таңдай кыймылдап тургандыктан, оңдоо бир топ кыйын. Жаакта кармалып турушуна байланыштуу кыймылдабай турган (Сюерсендики), кыймылдап турган (Шильдскийдики) жана калкылдап турган (Кезаныкы) болуп бөлүнөт. Ошондой эле обтуратордун ар кандай түрлөрүн Л. В. Ильина-Маркосян, З. Н. Померанцева-Урбанская, В. Ю. Курляндский, А. А. Аксенов, З. И. Часовская ж. б. жасашкан.

ОДОНТОБЛАСТ — одонтобласт. Тиштин өзөгүнүн ичинде болуп, тиш сырткы дүүлүктүргүчтөрдү сезген сайын, тиштин көңдөйүнүн ички катмарын дентин катмары менен калыңдатып туруучу өзгөчө клетка.

ОДОНТОМА — одонтома. Тиштин айланасындагы кошулма ткандарда болуучу шишик, клиникалык өзгөчөлүгүнө жараша жөнөкөй жана кисталуу болуп бөлүнөт.

ОДОНТОПАРОДОНОТОГРАММА — одонтопародонтограмма. Тиш менен тиштин этинин ортосундагы чөнтөкчөнүн тереңдигинин деңгээлин сыпаттап жазуу үчүн В. Ю. Курляндский атайын таблица сунуш кылган. Таблицаны жасаш үчүн ал Габердин айткандарына кайрылган. Габер ар бир тиштин көтөрүү чыдамдуулугун аныктаган. Мисалы, эркектерге тиешелүү үстүнкү жаактын каптал кескич тиштеринин жана астыңкы жаактын төрт кескич тиштеринин эң аз физиологиялык чыдамдуулугу 23 кг болгон. Аларга 1 деген бирдик берилген, калган тиштердин чыдамдуулугун 23кө бөлгөн. Ошондо ар бир тиш өзүнүн бирдигине ээ болгон. Таблицада тиштердин формуласы жана тиштин этинин качышына (атрофия) байланыштуу төрт даражасы бар. Тамырдын узундугун көз менен көрүнбөгөндүктөн, тиштин коронкасы эсепке алынат. Болжол менен тиштин тамыры тиштин коронкасына караганда эки эсе узун, ошондо коронканын жарымы тамырдын $1/4$ бөлүгү болуп эсептелет. Күзгү жана зонд менен ар бир тиштин айланасын төрт жагынан чукуп, зонд менен тереңдигине жараша таблицага белгилейбиз. 1-даража – тиштин тамырынын айланасындагы бүйлөнүн $1/4$ бийиктиги качып калды дегенди түшүндүрөт. Демек зонд чөнтөкчөгө коронканын узундугунун жарымына чейин кирди. Эгерде зонд коронканын бийиктигин бүт ээлесе, тиштин тамырынын айланасындагы тишти кармап турган ткандардын атрофиясы тамырдын жарымына чейин деп билүү керек. Бул – 2-даражадагы атрофия процесси. Атрофия тиштин коронкасынан көп болсо, анда тиштин тамырынын айланасындагы бузулуу болот. Эгерде зонд $3/4$ төн көп болсо, анда бул тиш жокко эсе. Тиштер жулунуп жок болгон учур үчүн нөл (0) деген графа бар.

ОЖОГИ — күйүктөр. Себебине жараша электр тогунан, ысык металлдан, кайнак суудан, химиялык заттардан күйүү деп бөлүнөт. Катуулугуна жараша күйүктүн төрт даражасы бар: 1-даражада тери кызарып калат; 2-даражада тери кызарып, шишип, ыйлаакчалар пайда болот; 3-А даражада теринин анча-мынча жери өлүү тканга айланат; 3-Б даражада теринин бети сыйрылып, тегиз өлүү тканга айланат; 4-даражада күйүк териде гана эмес, терең катмарга чейин жетип, бүт бойдон өлүү тканга (некрот) айланат.

ОЗОКЕРИТОЛЧЕНИЕ — озокерит менен дарылоо. Церезин, парафин, чайырдан (смола) турган, дарылык касиетке ээ кошулма. Бул зат тиштин бүйлөсү ооруганда колдонулат.

ОКАЛИНА — ширенди. Дат баспоочу болоттон жасалма коронка жасоо ишинде, аны отко ысытып, ийкемдүү кылып иштешет. Ошондо металлдын бетинде пайда болгон күйүндү катмар.

ОКИСЬ ЦИНКА — цинк кычкылы. Тиштин тамырынын каналын дарылоодо колдонулуучу зат. Сезгенүүнү жеңилдетет, жаралардын бетине сепкенде аны кургатат. Дары паста түрүндө, сымка идиште чыгарылат,

ОККЛЮДАТОРЫ — окклюдаторлор. Үстүнкү жана астыңкы жаактарды ачып жаап туруучу эң жөнөкөй аппараттар. Үстүнкү жана астыңкы алкактан жана аларды бириктирип турган ашык-машыктан, бийиктикти кармап туруучу шиш (штифт) же бурамадан турат. Бул аспап тиштердин кемтигин толуктоодо жана тиштер жок болгондо пайдаланылат. Жаак-тиш системасынан айырмаланып, окклюдатордо жогорку алкак кыймылга келип турат.

ОККЛЮЗИОГРАММА — окклюзиограмма. Тиштердин чайноо бетиндеги кээ бир дөмпөкчөлөр канадайдыр бир себептер менен физиологиялык жешилүүгө учурабай калат да, тамак чайнаганда ошол дөмпөкчөлөр бири-бирине урунуп, тиштер бошоп, кыймылдап кетет. Ошол дөмпөкчөлөрдү таап өгөп салуу керек, аны үчүн көчүрмөлөгүч кагазды (копировальная бумага) же калыңдыгы 0,2 мм болгон мом пластин-

касын тиштердин чайноо бетине коюп, тиштетет, ошондо кайсы дөмпөкчөдө так калса же момду жарыкка караганда тешилген жери болсо, ошол дөмпөкчөлөрдү бор машина менен өгөп, резина менен жылмакайлап коюу керек.

ОККЛЮЗИОННАЯ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА — беттин ылдыйкы үчүнчү бөлүгүнүн окклюзиялык бийиктиги. Тиштери бүтүн жаштардын бети үчкө бөлүнөт: мандайдын чач чыккан жеринен каш сөөгүнө чейин, каш сөөгүнөн таноого чейин, таноодон ээктин астына чейин, ушул үч аралык (бийиктик) өз ара тең болуу керек. Тиштери бар кишилерде астыңкы бийиктик аралыгы сакталат, тиштер толук түшкөндө же үстүнкү жаакта сол жакта, астыңкы жаакта оң жакта тиштери болуп, бири-бирине тийбей турса, анда бул бийиктик бузулат да, беттин төмөнкү үчүнчү тиштенүү бийиктиги кичирейет же тиштенүү (прикус) жок болот.

ОККЛЮЗИЯ — окклюзия. Тиштердин тийишип, тиштешип турушу. Тиштешүү бардык тиштерде жана кайсы бир гана тиштерде болот. Ошондуктан бардык тиштер тийишип турса, борбордук тийишүү, мандайкы тиштер тийишип турса, алдыңкы тийишүү жана каптал тийишүү деп аталат. Каптал тийишүү он жана сол болуп экиге бөлүнөт.

ОКОНТОВКА — оконтовка. Тишсиз жаактарга кийме тиш жасаш үчүн гипстен калып алгандан кийин, өздүк калыптын кырларын кайнак мом менен жука кылып куюп чыгуу же жумшак момду калыптын кырына жабыштырып коюу. Бул калыпты үлгүдөн оңой ажыратат жана жасалган протез жаакта жакшы кармалат.

ОМНИФЛЕКС — омнифлекс. Полисульфиддүү (тиоколдуу) калып алуу үчүн сапаттуу масса. АКШда чыгарылат.

ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ — опалесценция. Жарыкты күнүрт чөйрөдө чачыратуу. Мисалы, коллоиддүү чөйрөгө жарык берүү.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ — кариес көндөйүн оперативдик иштетүү. Тишке кыт (пломба) коёрдун алдында тиштин чиригин (кариес) ар түрдүү формадагы бор менен өгөп даярдоо төрт этаптан турат: алды

менен тиштин чириген көндөйүн кенейтүү, бузулуп калган тиштин эмаль, дентин катмарын өгөп алып таштоо (некротомия), көндөйгө форма берүү жана кутуга, үкөккө окшош форманын четин кыруу.

ОПЕРАЦИЯ ЦЕЩИНСКОГО-ВИДМАНА-НЕЙМАНА — Цешинский-Видман-Нейман операциясы. Тиштин этинде пайда болгон чөнтөкчөлөрдү жана жаак сөөгүнүн доо кеткен кырын кесип алып таштап, жараланган жерди тазалап, тиштерди шакшактап кыймылдатпай коюу. Пародонт ткандарынын оорусун дарылоодо колдонулат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПРИКУСА В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ — жаактардын борбордук абалында тиштердин катышынын бийиктигин аныктоо. Ортопедиялык стоматологияда кийме тиш жасоодо колдонулуучу ыкма. Үстүнкү жана астыңкы жаактардын борбордук катышын аныктоо. Мында анатомиялык, антропометриялык, анатомия-физиологиялык жана функциялык-физиологиялык ыкмалар бар. Бул ыкмаларды атайын адабияттарда окуса болот.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ pH СЛЮНЫ — шилекейдин кычкылдуулугун аныктоо. Нормада шилекейдин кычкылдуулугу 6,9–7,0ге барабар. Ооз ичинде сезгенүү жана электр-химиялык процесстер, ичеги-карын оорулары пайда болсо, ооздун гигиенасы начар болсо, кычкылдуулук 5,5–6,0га төмөндөйт. Тиштерге таштар чогулганда кычкылдуулук төмөндөп, 4,5–5,0 болуп калат.

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЭЗА - көпүрөчө сымал жасалма тиштин таяныч бөлүктөрү. Көпүрөчө сымал жасалма тиштин таянычы табигый тиш. Таяныч болуп жасалма каптамалар, кыпчыктар, шиштүү тиштер, өз тишке таянып, жасалма тишти кармоочу илмектер жана алардын айкалышуулары (комбинациясы) кызмат кылат.

ОПРОС — сурамжылоо. Пациенттин оорусунун тарыхын тактоо.

ОПУХОЛЬ — шишик. Ар кайсы ткандардын көлөмүнүн өзгөрүшүнө, кайсы жерде жайланышканына жараша: был-

жыр кабыкчанын шишиги, байланыштыргыч ткандын шишиги, кан тамыр, сөөк жана башка органдарда болсо ошонун атынан шишикти атап айтышат.

ОРАЛЬНЫЙ — ооз жак. Тиштерди тиштегенде пайда болгон тил-тандай жактагы көндөйдү оральный деп айтат. Тиштердин тил-тандай бети оральный жагы, эми тиштер менен уурт-эрин жагы вестибулярный деп аталат.

ОРБИТАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ — көздөрдүн эң ылдыйкы кыры менен өткөн түз сызык.

ОРМОКЕРЫ — ормокеры. Тиштерди кыттоо үчүн жаңы чыгарылган полимерлүү материал. Курамында органикалык полисилоксан бар.

ОРОГОВЕНИЕ — чордонуу. Ооз ичиндеги былжыр кабыкчанын эпителий катмары кератиндин таасиринен катуулап чордонот. Айрыкча чайнаганда басым көп түшкөн, көп сүрүлгөн жерлерде, тандай менен кызыл ээкте кездешет.

ОРТОГНАТИЯ — ортогнатия. Тиштердин катышынын физиологиялык түрү, мында үстүңкү жаактын маңдайкы тиштери астыңкы жаактын тиштерин $1/4$ бийиктикке чейин жаап турат.

ОРТОДОНТИЯ — ортодонтия. Ортопедиялык стоматологиянын бир тармагы. Тиш-жаак системасындагы туура эместиктерди: тиштердин катарынын, өсүшүнүн, жайгашуусунун, формасынын ар кандай өзгөрүүлөрүн изилдейт, ар кандай ортодонтиялык аспаптар менен дарылайт, ооруну болтурбоо үчүн алдын алууну жүргүзөт.

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ — ортодонтиялык аппараттар. Туура эмес өскөн тиштерди, тиштердин катарын жана тиштердин катышын, жаак сөөгүн оңдоодо колдонуучу ар кандай аспаптар. Алар жумшаган күчүнө карата механикалык (ортодонтиялык таасир этүүчү күч аппаратта болот, ал күчтүн жардамы менен врач бураманы бурап, жипти кайра тартып байлап, серпилме оромду чоюп киргизет), функциялык (ортодонтиялык күч чайноо булчуңунда болот) жана кураштырылган (бир аппаратта механикалык да, функциялык да аракет болот) болуп бөлүнөт. Бул аппарат-

тар тишке, үстүнкү жаакка, таңдайга, астынкы жаакка коюлат. Ортодонтиялык дарылоо бүткөндөн кийин алынган натыйжаны кармап калуу үчүн ретенциялык аппарат болот. Акыркы убакта Брекет системасын колдонуу жакшы натыйжа берүүдө, алар тиштин сырткы жана ички бетине жабыштырып бекитилет.

ОРТОКОР — ортопедиялык корректор. Эки жагы целлофан кагаз менен чапталган (кургап калбасын үчүн) пластинка. Тиштер таптакыр жок болгондо кийме тиш жасалат. Кайсы бир убакта ал протездерди көп өгөгөндөн же калыпты туура эмес алып протез жасагандан алар жаакта кармалбай калат. Ошондой учурда ортокор пластинкасын жылуу сууга салып жумшартып протездин бетине жабыштырып оозго кийгизет. Пациент 24–48 саат кийип жүрүп келет, ошондо ашыкчасы ысык тамак жегенде, чайнаганда чыгып жутулуп кетет (адамга зыяны жок), тийиштүү чек боюнча керегинче калат, анан протезди ооздон абайлап алып, кюветага гипстейт. Протездин чегине жетпей калган жерлерди ортокор толуктап калат. Гипстелген кюветаны ачып, протездин бетиндеги болгон ортокорду кырып алып салып, ордуна пластмассаны салып, кюветаны кайра жаап, пресстеп, полимерлейт. Ортокордун курамы: табигый канифоль чайырынан, этилцеллюлозадан, толуктагыч жана жумшарткыч заттардан турат.

ОРТОПЕДИЯ — ортопедия. Медицинанын дене жана колу-буттун кыйшайып калышын дарылоо ишин жүргүзүүчү эң ири бөлүмү. Ал эми стоматологияда ортопедия тиш кемтиктерин, тиштердин катарынын кемтигин же тиштер такыр жок болгондо жасалма тиштер (протез) жасап оңдоочу илим.

ОРТОПЕДИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ — жаак-бет ортопедиясы. Ортопедиялык стоматологиянын бир бөлүгү: тиш-жаак травматология жана тиш-жаак тиш салуу болуп бөлүнөт.

ОРТОСИЛ-М — ортосил-М. Ийкемдүү пластмасса тобундагы материал, толукталган силикон каучугунан турат. Бул материалга атайылап вулканизация жасап убаралануунун

зарылдыгы жок, суюктугу менен аралаштырганда өзү эле ооздун ичинде катууланат. Акрил пластмасса менен ортосилдин жакшы жабышышы үчүн комплектте атайын өзгөчө суюктук — поливинилметилоксиметиленсилоксан диизопротлан эфири болот. Кийме тиш протездерин жасаганда жаак сөөгүн каптап турган былжыр кабыкча өтө жука болгондо ортосилден төшөнчү катмар жасаса, көп оорубайт, протезге батыраак көнөт.

ОСМОТР СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА — ооз ичиндеги былжыр кабыкчаны кароо. Ооз ичиндеги жарааттардын себеби эмнеде экенин жөнөкөй көз менен карап билүү. Эгерде ал механикалык травма болсо, кичине жерде жанчылып кызарганы көрүнөт, токсиндик-химиялык болсо, анда былжыр кабыкча жалпы кызарууга, ооруга учурайт. Былжыр кабыкча өтө жука болсо, пациент ооруду дейт, бирок жакшы көрүнбөйт.

ОССИФИКАЦИЯ — сөөккө айлануу. Кемирчек жана бириктирүүчү ткандардын жана клетка аралык заттардын ар кандай минерал туздары менен толукталышы (айрыкча кальций тузу менен). Бул сынган сөөк бүтө баштаганда болуучу физиологиялык процесс.

ОСТЕОАРТРИТ — остеоартрит. Муунду түзүп турган сөөктөрдүн сезгиниши. Ооруган адам түндө уктай албай, тамак жей албай, денеси ысып бир топ азап чегет.

ОСТЕОАРТРОЗ — остеоартроз. Билинбей, узакка созулган, сезгенүү процессинин натыйжасында ткандардын акырындап азайышы, кемирчек, сөөк, бириктирүүчү ткандардагы өзгөрүүлөр.

ОСТЕОБЛАСТЫ — остеобласттар. Сөөк пайда кылуучу клеткалар. Тиш-жаак системасынын патологиясында (сынганда) айыгуу ушул клеткалардын катышуусу менен жүрөт.

ОСТЕОДИСПЛАЗИЯ — остеодисплазия. Жалпы сөөктөрдүн өсүшүнүн бузулушу. Көбүнчө балдар оорушат. Бул көрүнүш «херувизм» оорусуна окшош болот, төмөнкү жаактын бурчтары симметриялык түрдө өзгөчө чоңоюп кетип, адамдын бет түзүлүшү бузулат, бет топтоголок болуп калат.

ОСТЕОДИСТРОФИЯ — **остеодистрофия**. Зат алмашуу процессинин бузулушунан жана калкан безинин ооруга чалдыгуусунан келип чыгат. Организмде туздардын азайышына алып келип, сөөктүн катуулугун начарлатат.

ОСТЕОКЛАСТ — **остеокласт**. Сөөк тканынын көп ядролуу клеткасы. Сөөк кайсы бир себептер менен патологияга (бузулууга) кабылса, остеокласттар резорбция (сорулуу, жоюлуу) процессине катышышат. Пародонтит процессинде, тиштердин кыймылдап, шалкылдап, бошоп түшүп калуусуна остеокласттар себепкер болушат.

ОСТЕОМИЕЛИТ — **кулгуна**. Сөөктүн ириндеп сезгениши.

ОСТЕОМИЕЛИТ ЧЕЛЮСТЕЙ — **жаак сөөгүнүн кулгунасы**. Кулгунанын себептери: кан аркылуу (гематогенный), ок жегенден же урунуудан (травматический) жана тишке байланыштуу (одонтогенный) деп бөлүнөт.

ОСТЕОПОРОЗ — **остеопороз**. Организмдеги фосфор-кальций алмашуусунун бузулуусунун натыйжасында пародонттун жана жаак сөөгүнүн борпоңдошуусу, көндөйлөнүшү.

ОСТЕОСКЛОРОЗ — **остеосклероз**. Сөөктүн катууланышы, жаак сөөгүндө да кездешет.

ОСТЕОТОМИЯ — **остеотомия**. Бет сөөгүнүн деформациясын оңдоодо сөөктү кесүү, кертүү, жонуу.

ОСТЕОЭКТОМИЯ — **остеозктомия**. Кийме тиш жасоодо жолтоо болушу мүмкүн болгон сөөктүн демпекчөлөрүн операция жолу менен керттип алып салуу.

ОСТИТ — **остит**. Сөөктүн өзүнүн, чучугунун жана кабыгынын сезгениши.

ОСТРОН — **острон**. Тиши жок жаактардан калып алуу үчүн жеке ченкеп жасай турган акрил пластмассасы. Японияда чыгарылат.

ОСТЬ ПОДБОРОДОЧНАЯ — **ээктин ички бетиндеги демпекчө**. Астыңкы жаактын борборунун тил жак бетиндеги демпекчө сөөк, ага астыңкы жаактагы ылдый жылдыруучу булчундар жабышат.

ОТБЕЛ — **агартуучу зат**. Туз, азот, күкүрт кычкылдарынын суудагы эритиндисинен турган суюктук; дат баспоочу

металлдан жасалган жасалма коронканын ширендисин (бетиндеги күйүндү) эритет. Алтынга жана платинага 40-50% дуу туз кислотасын, күмүш-палладий кошулмасына 96° спирти колдонот.

ОТБЕЛИВАНИЕ — агартуу. Туз, күкүрт, азот кычкылынын суудагы эритиндисине болоттон жасалган жасалма тиштерди салып, 45 секундга чейин кайнатып, дат баспоочу болоттон жасалган тиштердин сыртындагы окистик күйүндү катмарын эритүү.

ОТЁК — шишимек. Организмде туз жана суу алмашуу процессинин бузулушунан, суюктуктун чыкпай, тканда токтоп калышынан же жанчылуудан, сезгенүүдөн дененин формасы менен көлөмүнүн чоңоюп кетиши. Стоматологияда кан тамыр-нерв (ангионевротический) шишиктери эринде, мурунда, ооз ичиндеги былжыр кабыкчада кездешет. Өнөкөт инфекциялык оорулар, шамалдап калуу, дары-дармек, тамакка жана ар кандай заттарга аллергиялык реакциялар да шишимек болууга себепкер болот. Ошолордун бири Квинке шишимегинде эриндер шишисе, Мелькерссон-Розенталь синдромунда эрин менен бирге бет нервинин сезгениши жана тилдин бетинде кабырчыктардын пайда болуусу менен коштолот.

ОТЕК КВИНКЕ — Квинке шишимеги. Тил, жумшак таңдай, кулкун, эрин, мурун ткандарында кайсы бир аллергиялык себептен же тукум куучулуктан пайда боло турган оору.

ОТЖИГ — күйдүрүү. Metallдын ички чыналуусун жоготуу үчүн аны керектүү ысыктыкка чейин кызартып туруп, акырындап муздатуу.

ОТМОРОЖЕНИЕ ЛИЦА — бетти үшүк алуу. Турмушта катуу суукта бет, мурун, кулактын үшүгү кездешет.

ОТТИСК — калып. Слепок деген макаланы кара.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПРАВИЛЬНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ — тиш протездеринин сапатын жана конструкциясынын тууралыгын баалоо. Мында ооз ичиндеги былжыр кабыкчанын сезгенүүсүнүн себебин аныктоого болот. Механикалык сезгенүү протезге байланыштуу болуп, кичинекей эле жерде болот, аллергиялык сезгенүүдө кийме тишке тийип турган былжыр кабыкчанын бардыгы сезгенет.

ОЧАГІ ИНФЕКЦІОННЫЕ, СТОМАТОГЕННЫЕ — стоматологиялык инфекциянын очоктору. Аларга ооз ичинде ириндеп, сезгенген процесстер кирет: тиштин этинин сезгениши, пульпит, периодонтит, пародонтит, тиштин этинин чөнтөкчөлөрүнүн сезгенип татаалданышы, тиштин тамырынын учундагы гранулема жана кистанын чириши, перикоронорит (акыл азуу чыгарда бетиндеги эттин жанчылып, сезгенүүсү), тиштин таштары, туура жасалбаган жасалма тиштер, ооздогу ар кандай жаракаттар. Бул өнөкөт очоктордун зыяны бүт денеге таралышы мүмкүн.

II

ПАКОВКА — толтуруу. Кайсы бир көлөмдү толтуруу. Мисалы кийме тиштин негизин пластмассага алмаштырганда кюветага камырдай болуп жетилген пластмассаны салып толтурат.

ПАЛАДОН-65, ПАЛАДУР, ПАЛАПРЕСС — палодон-65, паладур, палапресс. Кийме тиштин негизине колдонулуучу пластмассалар. Алар полимер жана мономерден турушат, мала кызыл, мала кызыл талчалары жана мала кызыл «кан тамырлары» менен жана түссүз болот. Германияда чыгарылат.

ПАЛАДУР — паладур. Кийме тишке жумшак төшөнчү катары колдонулуучу полихлорвинил пластмассасы. Германияда чыгарылат.

ПАЛЛИАТИВНЫЙ — паллиативный. Дарылоодо убактылуу жардам берүүчү ыкма.

ПАЛЬПАЦИЯ — кармалоо. Ооз ичиндеги былжыр кабыкчанын, тилдин, сөөктүн ооруган — оорубаганын, шишиги бар-жогун, жумшак-катуулугун, кыймылдар-кыймылдабастыгын сыйпалап, кармап көрүү ыкмасы. Ал тургай бар тиштин кыймылдаганын же кыймылдабаганын, лимфа безинин «чочуганын», тиштин тамырынын уясынын курч кырларын, кийме тиштин ооруган жерин бармак менен сыйпалап, кармап табуу.

ПАПИЛЛИТ — папиллит. Эки тиштин моюнчасынын денгээлинде үч бурчтук болуп көтөрүлүп турган тиштин этинин кырынын сезгенүүсү. Сезгенүү себеби: тиштин ташынын эттин астына жыйналып калып басышынан, тиштердин катары менен туура турбай чогулуп калуусунан, каптама кенен болуп этти басып калышынан, сабиз, алма тиштегенде көчүп кетишинен.

ПАПИЛЛОМА — папилома. Ооз ичиндеги былжыр кабыкчада боло турган эпителий катмарынын шишиги. Көлөмү ар кандай болуп шишик карттанып, бети агарып турат. Травма өнөкөт боло берсе, ракка айланып кетиши мүмкүн.

ПАПИЛЛОМАТОЗ — папиломатоз. Ооздун былжыр кабыкчасынын же теринин кайсы бир жеринде бир нече папилломанын чогуу болушу. Өнөкөт травма же сезгенүүдөн пайда болот.

ПАПУЛА — исиркек. Териде пайда болгон өтө майда ыйлаакчалар. Экзема оорусунда кездешет, кызыл жалпак темирөткү же түрдүү эксудативтик эритема ооруларынын морфологиялык белгиси болуп саналат.

ПАРАИМПЛАНТИТ — параимплантит. Имплантаттын моюнчасынын айланасындагы жумшак ткандын сезгенүүсү.

ПАРАКЕРАТОЗ — паракератоз. Теринин мүйүздөй катууланышы менен катар анын түлөшү.

ПАРАЛИЧ — шал. Нервге суук тийүүдөн же анын жанчылып калышынан ошол нерв таралган жерлердин иштебей калышы.

ПАРАЛЛЕЛОМЕТР — параллелометр (грекче *parallelos* — жарыш болуучу, метрон — ченөө). Көбүнчө доголдуу жасалма тиш жасоодо өз тишке таянып протезди кармап турган илмектерди туура коюу үчүн, таянып, турган тиштердин тиктигин аныктоодо колдонулуучу аспап. Үлгүнүн кайсы абалында илмектер жакшы кызмат кыларын тактайт. Адистер арасында кеңири таралган параллелометрди В. Ю. Курляндский жана дагы башка авторлор сунуш кылган. Кийинчерээк ЦНИИСтин конструкциясы да чыгарылды.

ПАРАФУНКЦИЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ — чайноо булчуңдарынын парафункциясы. Чайноо булчуңдарынын

чайноо жана сүйлөө менен байланышы жок эле өзүнчө иштеши. Бул түндө тиштерин кычыратуу (бруксизм), күндүз тамаксыз чайноо кыймылын жасоо (бруксомания) түрүндө байкалат. Пайда болуу себеби белгисиз, көбүнчө жаш балдарда жана тиштери жакшы кармабаган кишилерде кездешет.

ПАРЕЗ — парез. Булчуңдардын нервденишүүсүнүн (иннервация) начарлашынын себебинен булчуңдардын алсыздануусу. Бул көрүнүш бет-жаак булчуңдарында кездешет.

ПАРЕСТЕЗИЯ — парестезия. Эрин, таңдай, тил былжыр кабыкчаларында өзүнөн өзү пайда боло турган сайгылашуу, ысуу жана чымырап кетүү сезимдери.

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ — парник эффекти. Кийме тиштердин негизи көбүнчө пластмассадан жасалат. Былжыр кабыкча менен пластмассанын аралыгындагы жылуулук ооздун ичине караганда жогорураак келет, себеби акрил пластмассасы жылуулукту жакшы өткөрбөйт. Натыйжада ар кандай бактериялар жана козу карындардын (грибоктордун) көбөйүшүнө шарт түзүлүп, былжыр кабыкчанын сезгенүүсүнө алып келет.

ПАРОДОНТ — пародонт. Тиштин тамыры, анын айланасындагы байламталар, жаак сөөгүнүн кыры жана тиштин этинен турган ткандардын жыйындысы.

ПАРОДОНТИТ — пародонтит. Пародонттун сезгениши. Бир же бир нече тиштин (тиштердин бардыгы эмес) нерв, кан тамыр оорулары, иммун системасынын өз ара карымкатышынын бузулушунан микробдор көбөйүп, тиштин эти шишип, ириндеп, тиштин тамыры бошоп, ачылып кетиши.

ПАРОДОНТОЗ — пародонтоз. Тиштердин бардыгы бошоп, кыймылдап, шалкылдап, тиштин эти качып, тамыры ачылып, тиштин тамыры менен этинин ортосундагы чөнтөкчөлөр терендеп, сезгенип, ириндеп кетиши. Эгерде бир же бир жуп тиштер бошондобосо, анда пародонтоз жок. Бир эле тиш кыймылдап, бошоп калса, бул пародонтоз эмес, пародонтозго окшош оору, мунун пайда болуу себеби таптакыр башка (В. Ю. Курляндский так жана анык далилдеген).

ПАРОДОНТОЛИЗ — пародонтолиз. Тиш тамырынын айланасындагы ткандарда өтө сейрек кездеше турган өзгөчө

оору. Тиштин тамырынын айланасындагы (жаак сөөгүнүн кыры, тиштин мүлкү) ткандардын кескин азайышынын, тиштин тамырынын ачылышынын натыйжасында тиш бошоп, анын тез арада түшүп калышы менен мүнөздөлөт.

ПАРОРЕКСИЯ — парорексия. Тамакка болгон табиттин бузулушу, даамдын бузулушу.

ПАРОТИТ — басма. Жугуштуу инфекциялык оору. Кулак алдындагы бездин сезгенүүсү. Дененин температурасы 40°Сга чейин көтөрүлүп, кулак алдындагы без шишип, шилекей азайып, ооз кургап, кулак түп кол тийгизбей ооруйт.

ПАССИВАЦИЯ — пассивация. Металл импланттардын коррозиялык туруктуулугун арттыруу.

ПАСТА — паста. Курамында ар түрдүү дары-дармеги бар, негизин күкүм, майлар түзгөн сыкма. Мисалы, сыйпагандан кийин оорутпай кала турган Кабилов пастасы, алтын жана дат баспай турган болоттон жасалган тишти жалтырата турган пасталар бар.

ПАЦИЕНТ — ооруп келген киши. Ооруп врачка келген киши, стоматологго тиш маселеси боюнча кайрылган адам дагы пациент делинет.

ПАЯНИЕ — ширетүү. Бул көпүрөчө жасалма тиш жасаганда каптама менен жасалма тишти жана каптама менен каптаманы бириктирүүдө колдонулат.

ПЕЛЛИКУЛА ЗУБОВ — тиштин кабыгы. Тиштер чыккандан кийин эмалдан сыртында пайда болуучу негизинен белоктон жана углеводдон турган жука катмар. Ал эмалдын эришине, чирешине жол бербей коргоо кызматын аткарат.

ПЕМФИГУС — ыйлаакча. Ооз ичиндеги былжыр кабыкчага жана териге чыга турган ыйлаакча (пузырчатка).

ПЕРЕБАЗИРОВКА ПРОТЕЗА — кийме тиш протезинин негизин калыптандыруу. Кийме тиш протезин 3–4 жылдан ашык кийилгенден кийин, шалкылдап, жакшы кармабай калат. Жаңы кийме тиш жасоо керек. Бирок, кээде ушул эле кийме тишти дагы бир аз убакытка кийип жүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн анын ички бетинен бир катмарын өгөп таштап, бат катуучу пластмассадан (Протакрил, Редонт) ичине бир катар салып, жаакка кийгизип, 2–3 мүнөт кармап туруп, анан алып, жылуу сууга салып коюу керек.

Ооздун былжыр кабыкчасы күйүп калбасын үчүн, соданын эритиндиси менен чайкоо зарыл. Пластмасса каткандан кийин четиндеги ашыкча пластмассаны өгөп алып таштап, кийме тишти оозго кийгизип койсо, жакшы кармалып калат.

ПЕРЕДНЯЯ ОККЛЮЗИЯ (САГИТТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ) — алдыңкы окклюзия (астыңкы жаактын сагитталдык кыймылы). Эки жактагы сырткы канат сыяктуу булчуңдардын жыйрылуусунун натыйжасында астыңкы жаактын алдыга жылуусу. Бул окклюзия көбүнчө астыңкы жаактын азуу тиштери жок болуп, маңдайкы тиштери гана калганда пайда болот. Л. В. Ильина-Маркосян мындай клиникалык абалды көнүмүш окклюзия деп атаган.

ПЕРЕЛОМ — сынык. Үстүнкү жана астыңкы жаактын, бет скелетинин сөөгүнүн ар кандай себептер менен сынышы. Денедеги жалпы сөөк сыныктарынын 3,8% бет сөөктөрүнө тиешелүү. Бет сөөктөрү сынганда адам көп азап чегет: ооз толук ачылбайт, чайноо менен жутуу кыйынчылыкка турат, оозунан шилекей агат, сынган жер шишийт, ооруйт сынган жердин тушу канталап көгөрөт.

ПЕРЕЛОМЫ ЗУБОВ — тиштердин сынуусу. Урулуу, согулуу, жыгылуунун натыйжасында тиштердин сынышы. Сынык тиштин көрүнүп турган бөлүгү – коронкада жана тамырында болот. Эгерде сынык тамыр деңгээлинде болсо айыгуу төрт түрдүүчө өтөт: А, В, С, Д. А — тиштердин бөлүктөрү тыкыс тургандыктан, биригип өсүп кетет; В — тамырдын сыныктарынын ортосу алысыраак болгондуктан, бириктирүүчү тканы өсүп калат, ал рентген жасаганда гана көрүнөт; С — тамырдын сыныктарынын ортосунда бириктирүүчү жана сөөк ткандары өсүп калат; Д — мында сыныктардын ортосунда жетилбеген (грануляцияционная) ткань толуп калат.

ПЕРИАПЕКАЛЬНЫЙ — периапикальный. Тиштин учунун айланасында жайгашкан ткандар: периодонт байламталары жана жаак сөөгү.

ПЕРИИМПЛАНТИТ — периимплантит. Имплаттатын сөөктүн ичиндеги бөлүгүн курчап турган жумшак ткандын сезгенүүсү.

ПЕРИКОРОНИТ — перикоронит. Акыл азуу тишинин толук чыкпай, былжыр кабыкчанын жанчылып, эзилип, шишип, инфекциянын кошулуусу менен ириндеп сезгениши. Азуу тиштин бетиндеги былжыр кабыкча сезгенгенде ал шишип, ооз ачырбай, лимфа бездерин чочутуп, оорусу ууртка, моюнга таркалат, ооздон сасык жыт келет. Медиастинит оорусунун башталышына себеп болушу мүмкүн.

ПЕРИОДОНТ — периодонт. Тиштин тамырынын айланасындагы тамыр менен сөөктүн ортосундагы тишти кармап турган байламта. Алар бириктирүүчү ткандардын булаларынан, кан жана лимфа тамырларынан, нерв булаларынан, фибробласттардан, цементокласттардан, остеобласттардан, Маляссанын эпителий клеткаларынан, коргоочу клеткалардан турат. Анын көп функцияларынын ичинен негизгиси тишти кармап-таяп туруусу.

ПЕРИОДОНТИТ — периодонтит. Тиштин тамыры менен жаак сөөгүнүн ортосундагы тишти кармап турган байламталардын сезгениши. Көбүнчө инфекциянын таасиринен болот. Инфекция тиштин өзөгү сезгенгенде тиштин тамырынын учундагы көзөнөкчө аркылуу байламталарга өтөт, тиш менен тиштин этинин чөнтөкчөсү тереңдеп кетип, байламтаны сезгендирет же ар түрдүү дары-дармектин таасири тийгенде ооруйт. Бул оору курч жана өнөкөт түрүндө болот, өнөкөт түрү кээде ашынып оорусу мүмкүн. Өнөкөт периодонтит 3 түрдүү болот: фиброздуу, гранулалуу, грануломатоздуу. Ооруган тиш башка тиштерге караганда бийик болуп, тамак чайнатпайт, күндүз-түнү тынбай ооруйт, бир нерсе тийип кетсе өтө катуу ооруп кетет. Мында адамдын денеси ысып, башы ооруп, жергиликтүү лимфа бездери шишип, адам алсызданып шалдырайт.

ПЕРИОСТИТ — периостит. Сөөктүн кабыгынын сезгениши, бул оорунун курч жана өнөкөт түрлөрү болот. Оорунун себептери: тиштен болгон инфекция, кургак учуктун, жана ар кандай травмалардын салдары.

ПЕРКУ́ССИЯ — уруу. Тиштин ооруган, оорубаганын аныкташ үчүн тыкылдатып уруп көрүү. Зонд же күзгүнүн арты менен жүргүзүлөт. Тишти текшерүүдө клиникалык негизги ыкмалардын бири.

ПЕРОРА́ЛЬНО — ооз аркылуу. Пациенттин ар түрдүү дары-дармектерди оозу менен ичүүсү.

ПЕРФОРА́ЦИЯ — тешүү. Тиштин тамырынын каналын ачууда учуна жетпей, кыйшык кетип, бор менен тамырдын боорун тешип алуу.

ПЕТЕ́ХИИ — кан тактар. Былжыр кабыкчадагы жана теридеги майда кан куюлуулар, канталаган жерлер, кандын майда уюшу.

ПЕТРИФИКА́ЦИЯ — петрификация. Тканга кальций туздарынын бир калыпта жыйналып, алардын таштай катууланышы. Стоматологияда петрификация тиштин өзөгүндө (пульпада) болот.

ПИГМЕНТА́ЦИЯ — теридеги так. Былжыр кабыкчага жана териге меланин, гемосидерин пигменттеринин чогулуусунан түсүнүн өзгөрүүсү (Аддисон оорусу).

ПИНЦЕТ — кыпчуур. Операция жасаганда, тиштерди дарылаганда ар кандай майда аспаптарды алуу үчүн колдонулуучу аспап.

ПЛА́ГГЕР — плаггер. Тиштин тамырындагы каналга гуттаперчаны тыгыздоо үчүн колдонулуучу аспап.

ПЛА́СТИКА УЗДЕ́ЧКИ ЯЗЫКА́ — тилдин астындагы чектегичке операция жасоо. Тилдин алдында анын кыймылын чектеп турган анатомиялык чектегич бар. Эгерде ошол чектегич кыска болбой тилдин учуна чейин өсүп калса, аны кесип коюу керек. Себеби ал тилдин туура кыймылдашына, так сүйлөөгө жолтоо болот. Ошондой эле кийме тиштин жакшы орун алышына жол бербей, жасалма тиштин кыры аны басып, оорутат.

ПЛАСТИ́НКА НАКУ́СОЧНАЯ — тиштөөчү пластинка. Таңдайга жабыштырылып жасалган пластинка. Анын айдөш мейкиндиги болот да, ылдыйкы жаактын маңдай тиш-

теринин тийишип, сыйгаланып туруусун өзгөртөт, азуу тиштерин тийишпейт.

ПЛАСТИ́НКА С ВЕСТИБУЛЯ́РНОЙ ДУГО́Й — вестибулярдык догосу бар пластинка. Өтө алдыга чыгып, ортолору ачылып калган маңдайкы тиштерди ондоочу ортодонтиялык аппарат. Диаметри 0,8–1,0 мм ортодонтиялык болот зымдан маңдайкы тиштердин сыртынан дого катары өткөрүп жасалат. Мезгил-мезгили менен зымды кысып турса, тиштер артка чогулат, тиштердин туура турушун ылдыйкы тиштердин катары аныктайт.

ПЛАСТИ́НКИ НЕ́БНЫЕ ЛИТЬЕ́ — тандайдын куюлган пластинкасы. Көбүнчө доголуу жана пластиналуу кийме протезде тандайга коюлуучу металл куймадан куюп жасалган пластинка. Ал жука болот, орунду аз ээлейт, жылуулукту жакшы өткөрөт. Тиштин катарынын кемтигине жараша таянып-кармоочу илмектерди каалаган жерге коюуга мүмкүндүк берет.

ПЛАСТИ́НОЧНЫЕ АППАРА́ТЫ СЪЁМНЫЕ — пластиналуу кийме аппарат. Кыйшык чыккан тиштерди ортодонтиялык жол менен ондоодо колдонулуучу кийме аппараттар.

ПЛАСТИ́НОЧНЫЙ СЪЁМНЫЙ ПРОТЕ́З — кийме пластиналуу протез. Ооздо тиштер такыр жок болгондо же анчамынча эле калганда жасала турган кийме протез.

ПЛАСТИ́ЧЕСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ — пластикалык операция. Бет-жаактын түзүлүшүн жана аткаруучу кызматын калыбына келтирүү, кемчиликтерин ондоо үчүн жасалуучу пластикалык операция.

ПЛАСТИ́ЧНОСТЬ — эпке келгичтик. Таасир эткен сырткы күчтөн кийин пайда болгон форманы сактап калуу.

ПЛАСТИФИКА́ТОРЫ — пластификаторлор. Жасалган нерсеге ийкемдүүлүк, серпилгичтик касиет берүүчү заттар.

ПЛАСТМА́ССОВЫЕ ЗУ́БЫ — пластмасса тиштер. Акрил пластмассасынан адамдын тишине окшотуп жасалган тиштер. Мында пациентке карата көлөмү, формасы, өңү эске алынат.

ПЛАСТМАССЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ — стоматологиялык пластмассалар. Стоматологияда колдонулуучу пластмассалар. Алар аткарган милдетине карай ар түрдүү болот. Мисалы, кийме протездин негизи үчүн тиштин бүйлөсүнүн түсүндөй (Фторакс, Этакрил); адамдын тишинин түсүндөй жасалма тиштер, каптамалар жана көпүрө сымал жасалма тиш үчүн пластмасса (Синма М, Синма 74); өзү катуучу пластмассалар (Протакрил, Редонт, Карбопласт, Норакрил-65, Акродент, Карбодент, Акрилоксид ж. б.); ийкемдүү, жумшак пластмасса (АКР-9, Эладент-100, ПМ-01, Боксил, ГосСил, Эгмасс-12 ж. б.).

ПЛАСТМАССЫ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ — термоийкемдүү пластмассалар. Алар катканда химиялык реакция жүрбөйт, кайрадан жылытканда жумшаруу касиетин жоготпойт, б. а. аларды кайра колдонсо болот.

ПЛАСТМАССЫ ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ — терморективдүү пластмассалар. Алар химиялык реакция жүрүү менен катат, ошондуктан ал кайра иштетүүгө жарабайт, б. а. аларды кайра колдонууга болбойт.

ПЛАТОНОВА ЖИДКОСТЬ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ — Платоновдун ооруну токтотуучу суюктугу. Ооруну басуучу, курамында дикаин, фенол, хлороформ дарылары бар № 1 жана дикаин, этил спирти бар № 2 суюк дарылар. Платонов сунуш кылган.

ПЛОМБА — кыт. Тиштерде пайда болгон көндөйлөрдү бүтөш үчүн коюлат. Кыт коюунун максаты-тиштердин мурунку калыбындагы жумушун аткарууга мүмкүчүлүк берүү. Кытты цементтен, пластмассадан, амальгамалардан, ошондой эле ар кандай композиттерден коюшат. Азыр алар химиялык жана жарык кыт болуп да бөлүнөт.

ПЛОСКОСТИ НАКЛОННЫЕ — жантык тегиздик. Туура эмес өскөн тиштерди, жаак сөөгүн ондоочу ортодонтиялык аппараттын кыйшык, жантык турган бир бөлүгү. Тиштер тамак жеген сайын жантык бетте сыйгаланып олтуруп түздөлөт.

ПЛОСКОСТЬ ОККЛЮЗИОННАЯ — окклюзиялык мейкиндик. Астыңкы жаактын борбордук кескич тиштеринин кесүү кыры менен азуу (жетинчи, сегизинчи) тиштердин чайноо бетине карай уурт жактагы дөмпөкчөгө жүргүзүлгөн тегиздик. Азуу тиштер жок болсо, азуу тиштерден ары турган бурчтагы дөмпөкчөнүн (ретромолярный бугорок) ортосуна чейин жүргүзүлөт.

ПЛОСКОСТЬ ОРБИТАЛЬНАЯ — көз тегиздиги. Көздөрдүн эң ылдыйкы кыры менен өткөн сызык.

ПЛОСКОКЛЕТЧНЫЙ РАК — жалпак клеткалуу рак. Шилекей бездеринде кездешүүчү рак.

ПМ-01 — **пм-01**. Жаак сөөктүн былжыр кабыкчасы жука болуп, кийме тишти кийгенде чыдатпай катуу ооруган учурда жасалма тишке төшөнчү катары коюлуучу жумшак пластмасса.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТЭЗА — жасалма тиштин терс таасири. Протез ар кандай терс таасир тийгизиши мүмкүн. Кийме протездер көбүнчө былжыр кабыкчага таасир тийгизгендиги менен өзгөчөлөнөт. Буга чейин басым түшпөгөн ткандар эми басымдын астында кысылып, кан тамырларда кандын айланышы начарлайт. Пластмассанын курамындагы мономердин бөлүнүп чыгып ууландырышы же аллергиялык таасир кылуусу, жасалма тиштин пластмасса негизи жылуулукту жакшы өткөрбөгөндүктөн жана даам билүүчү рецепторлорду жаап калгандыктан, бир аз убакытка бир топ кыйынчылык туудурат. Ал эми тиштерге бекилген туруктуу жасалма тиштер көп учурларда таянып турган тиштерге салмакты көбүрөөк салып тургандыктан, алардын бошондоп кетишине алып келет. Ошондой эле көпүрө сымал жасалма тишти ширеткенде жез, цинк, темир элементтери кошулат, алардын кычкылы уулуу болот, адам туздуу, кычкыл даамды сезет.

ПОВРЕЖДЕНИЕ — бузулуу. Ар кандай сырткы таасирден бет-жаак ткандарынын анатомиялык жана физиологиялык бүтүндүгүнүн, кызматынын бузулушу. Тиш-жаак сис-

темасынын бузулуусу механикалык, температурадан, электр тогунан, радиациядан жана башка себептерден болот.

ПОВТО́РНОЕ ПРОТЕЗІ́РОВАНИЕ — кайрадан жасалма тиш салуу. Көп убакыт колдонгондон кийин кийме жана жасалма туруктуу тиштерди кайра жасоо керек болот. Жаңы жасалган жасалма тиш жакшы болсун үчүн эски жасалма тиштин кандай мүчүлүштөрү бар экенин изилдөө керек.

ПОВЫ́ШЕННАЯ СТИРАЕМОСТЬ ЗУБÓВ — тиштердин жогорку сүрүлүүсү. Тиштердин эмалы өмүр бою сүрүлүп, жешилип турат. Эгерде сүрүлүү дентин катмарына өтүп кетсе, ал чектен тышкары, өтө көп сүрүлүү же патологиялык сүрүлүү деп аталат. Кээде бул процесс ушунчалык тез жүргөндүктөн, тиштин коронка бөлүгү жешилип, жокко эсе болуп калат.

ПОВЯ́ЗКА — тануу. Негизинен жараатты дарылоо максатында, ар түрдүү дарыларды сыйпап, анын үстүнөн даки менен тануу. Бет-жаак сөөктөрү сынганда тануу аркылуу сынган жерди кыймылдатпай коёт. Таңгыч катары бинт, жоолук, лигатура, желим колдонулат.

ПОГО́НИОН — погонион. Ээктин алдыга карай чыгып турган антропометриялык эң четки чекити.

ПОДА́ТЛИВОСТЬ СЛІ́ЗИСТОЙ ОБОЛÓЧКИ ПРОТЕЗ-НО́ГО ЛÓЖА — протездин ордунун былжыр кабыкчасынын эпке келгичтиги. Кийме тишти былжыр кабыкчанын үстүнө коёбуз, ошондо былжыр кабыкча жумшак болсо, кийме тиш жакшы турат, бирок өтө жумшак болсо да жасалма тиш үчүн жакшы эмес, серпилгич оромдой болуп тээп калат. Бул маселени Люнд, Суппле, Ирошникова, Калинина менен Загорский, Амираев менен Султанбаева изилдеген.

ПОДА́ТЛИВОСТЬ СЛІ́ЗИСТОЙ ОБОЛÓЧКИ ПРОТЕ́ЗНОГО ЛÓЖА ПО ЛЮ́НДУ — Люнд боюнча протездин ордунун былжыр кабыкчасынын жумшактыгы. Люнд боюнча үстүнкү жаактын кийме тиш туруучу орду 4 бөлүккө (зонага) бөлүнөт: 1) таңдайды так экиге бөлгөн сагитталдык тигиш аймагы; 2) альвеолалык жөлөк сөөгүнүн аймагы; 3) катуу таңдайдын алдыңкы бөлүгүндөгү туурасынан кеткен

катмарлар аймагы; 4) катуу тандайдын арткы үчтөн бир бөлүгүнүн аймагы.

ПОДАТЛИВОСТЬ СЛІЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПО СУППЛЕ — Суппле боюнча протездин ордунун былжыр кабыкчасынын жумшактыгы. Суппле боюнча үстүнкү жана астыңкы жаактардын кийме тиш туруучу орду 4 класска бөлүнөт: 1) былжыр кабыкча кийме тиш орнотулуучу жерде бирдей жумшактыкта, тегиз жакшы билинип турат, табигый катмарлар (эриндердин, тилдин жана уурттун чектөөчүлөрү) альвеоланын чокусунан алыс турушат; 2) былжыр кабыкчалар тандайга, альвеола сөөктөрүнө тартылып, жукалыгы менен мүнөздөлөт; 3) тандайдын арткы үчтөн бир бөлүгү өтө жумшак болот; 4) бул класстын өзгөчөлүгү жаактарда альвеола сөөгүнүн бетинде саландаган, сөөккө жабышпай турган былжыр кабыкчанын болгондугу. Мындай клиникалык абалда протез жасоо үчүн калып алганда саландап турган былжыр кабыкча кабатталып калып, кийме тиш койгондо оорутат.

ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ — тиштердин патологиялык кыймылдашы. Травмадан же тиштердин пародонтунун оорусунун натыйжасында тиштер бошоп кыймылдап калат. Д. А. Энтин тиштердин кыймылдашын 4 даражага бөлгөн: 1) бир тарапты карай кыймылдоо; 2) эки тарапты көздөй кыймылдоо; 3) тиш өз ордунда туруп тегерете айланат; 4) тегерете айланат жана өйдө-ылдый (вертикалдуу) кыймылдайт.

ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ — тиштердин физиологиялык кыймылдашы. Тиштин көзгө көрүнбөгөн микроэкскурсиясы. Муну эртең менен турганда тишти кыймылдатып көрүп, сезсе болот, ал 0,1–0,2 мм ге барабар.

ПОДВИЖНОСТЬ СЛІЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ — былжыр кабыкчанын кыймылдашы. Былжыр кабыкча жакын жайгашкан булчундун таасири менен кыймылдаса, ал активдүү кыймылдоо деп аталат. Былжыр кабыкчанын бармак жана жасалма тиштин таасири менен кыймылдашы пассивдүү кыймылдоо болот.

ПОДВЫВИХ — муундун жарым чыгуусу. Астыңкы жаактын муун урчугунун жарымы чыгып, жарымы муундун ичинде калышы. Бул чыккый-астыңкы жаак муунунда кездешет. Буга ревматизм, артрит, подагра, талма оорулары себеп болушу мүмкүн. Тез эле өнөкөт болуп калат.

ПОДНУТРЕНИЕ — оюк. Тиштин экваторунун (тишти жанынан караганда эң чыгып турган дөңү) тиштин бүйлөсүнө карай ичкерген жери, тиш кыйшайып калганда, вертикалдык чийим менен тиштин моюнчасына чейинки боштук.

ПОДЪЯЗЫЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО — тилдин астындагы мейкиндик. Астыңкы жаактын тиштеринин бүйлөсүнүн тил жагы жана тилдин асты жагы чектеп турган жер, бул жерди алдыңкы, каптал жана арткы бөлүккө бөлүшөт. Тиши жокто кийме тишти жасаганда жасалма тиштин кыры ошол жерге жетет.

ПОЗИЦИОНЕР — позиционер. Дрошель менен Бонтмон сунуштаган аспап, муну менен кургак эмалдын кайсы жерине Брекет системасынын кулпусун орнотуу керектигин белгилейт.

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ — бузулуунун ургаалдуулугунун көрсөткүчү. Кариес менен ооругандагы орто сан. Кариес болгон (К), кытталган (К), жулунган (Ж) тиштердин ККЖ оорусунун жалпы суммасынын индекси. Мисалы, 100 текшерүүдө ККЖ 1270ке барабар болсо, өркүндөө $1270:100=12,7$ ге барабар. Бул жогорку көрсөткүч болуп эсептелет.

ПОКАЗАТЕЛЬ ТОНУСА СОСУДОВ (ПТС) — тамырдын толуктугунун көрсөткүчү. Кан тамырынын толуктугунун көрсөткүчү, ошондой эле реографиялык коэффициент деп да аталат. Мында кан тамырдагы басымдын көтөрүлүшү же төмөн түшүшү боюнча тамырдын оору же соо экендиги аныкталат.

ПОКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ — чайноо булчундарынын функциялык тынчтануусу. Астыңкы жаакты көтөрүүчү булчундардын жана ымдоо булчундарынын иштебей тургандагы абалы. Астыңкы жаак

кыймылдабай салаңдап турат. Үстүнкү жаак менен астыңкы жаактын тиштеринин ортосунда 1ден 13 мм ге чейинки аралык пайда болот. Орто эсеп менен 2–3 мм деп эсептейбиз. Каралган абал булчундардын гана кыймылсыздыгын билдирбестен, ал пародонттун жана чыккый-астыңкы жаак муунунун да кыймылсыздыкта экенин түшүндүрөт.

ПОЛЕ ОККЛЮЗИОННОЕ — тиштердин тийишүү аймагы. Жаактардын ар кандай кыймыл-аракетинде жогорку жана ылдыйкы тиштеринин чайноо беттеринин тийишүүсү.

ПОЛЕ ПРОТЕЗНОЕ — жасалма тиштин (протездин) жайгашуу аймагы. Чайноо аппаратына кирүүчү ткандарды билгизүүчү түшүнүк. Аларга жасалма тиштин орду, пародонт, чайноо булчундары, шилекей бездери, чыккый-жаак мууну кирет. Проекциясы боюнча жасалма тиштин аймагы ашказан-ичегилерге жана аң-сезимге чейин жетет.

ПОЛИВИК — поливик. Шакшак жасоо үчүн колдонулуучу материал. Жалпы травматология жана ортопедияда кол, бут сынганда шакшактоо үчүн колдонулат, мушкерлер үчүн тиштерди коргоочу шакшак жасалат, ал эми ортопедиялык стоматологияда тишсиз жаактарга кийме протез жасаганда өздүк ченкеп жасоого болот.

ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ — поликонденсация. Полимерлешүүнүн бир түрү. Поликонденсация процессинде пластмассанын катуу учурунда башка (суу, аммиак, спирт) заттар бөлүнүп чыгат.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ — полимерлешүү. Бир нече молекулаларды бириктирүүчү химиялык реакция, башкача айтканда, мономердин полимерге айлануусу.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПЛАСТМАССЫ — пластмассаны полимерлөө. Пластмассаны кюветага салып, пресске басып, бюгелге бекиткенден кийин, аны муздак сууга салат. Сууну ысытып кайнаганга чейин жеткирип, 45 мүнөт кайнатат. Андан кийин газды, электр тогун өчүрөт же кюветаны салып кайнаткан идишти мештен алып коюп, муздатат. Кюветаны кайнап турган сууга жана полимерлешүү мөөнөтү

бүткөндөн кийин кюветаны кайнак суудан алып, муздак сууга салуу туура эмес.

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ КОМНАТА — полимерлөө бөлмөсү. Бул бөлмөдө пластмассаны полимерлегенге даярдайт: даярдалган пластмассанын камырын кюветага салат, пресстейт, бюгелге бекитип муздак сууга салып, 45 мүнөт кайнатат.

ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕКОМПОЗИТНЫЕ — композит эмес кыттоочу полимер материалдар. Пластмассадан турган кыттоочу полимер материалдардын негизин полимерлешүү процесси түзөт. Буга акрилоксид, карбодент кирет. Акрилоксид үч түстө болот: № 10, 12, 20. Мономери эки флакондо 15 граммдан. Карбодент 6 түстө болуп: (№ 0, 6, 10, 12, 16, 19). 2 флакон суюктук 15 граммдан, 50 калакча (шпатель), аралаштыруу үчүн чөйчөкчө, 10 целлофан кагазы бар.

ПОЛИМЕРЫ — полимерлер (poly- көп + meros – бөлүк) молекулалары кайталанып туруучу көп сандаган бөлүктөрдөн турган синтетикалык заттар.

ПОЛИМОРФИЗМ — полиморфизм. Табияты бирдей, бирок ар түрдүү түзүлүштөгү клеткалар, ткандар же органдар. Ооздо, эринде жана былжыр кабыкчада пайда болгон ыйлаакча, жара, чордонуу ж. б. морфологиялык элементтерди көрсөтүүчү түшүнүк.

ПОЛИП — полип. Тиштин этинин былжырлуу катмарынан өсүп чыккан, түбү жанындагы ткандар менен биригип турган бүдүрчө, шишик.

ПОЛИПЛАСТ — полипласт. Кытты жалтыратып физика-механикалык жана физика-химиялык касиетин жогорулатуу үчүн колдонулуучу паста. Германияда чыгарылат.

ПОЛИПРИСОЕДИНЕНИЕ — полибиригүү. Полимерлешүүнүн бир түрү. Полибиригүү процессинде башка заттар бөлүнүп чыкпайт, мономер менен полимердин курамы бирдей болот.

ПОЛИСУЛЬФИДНЫЕ СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ — калып алуучу полисульфиддүү массалар. Калып алынуучу жердин

көчүрмөсүн толук, так алуучу жана көпкө чейин жыйрылбоочу, көлөмүн өзгөртпөөчү массалар. Бул топко тиодент, тиодент М (Россия), КОЕ-флекс (АКШ), пермопластик (Германия) кирет. Алар эки сыкмадан турат: бири толуктоочу, экинчиси тездетүүчү.

ПОЛИЭФИРНЫЕ СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ — калып алуучу полиэфир массалар. Бул топко Полижет, Импрегум, Импрегум-ф, Пермадин, Пермадин-Гарант аттуу массалар кирет.

ПОЛИРОВОЧНАЯ КОМНАТА — жылмалап жалтыратуу бөлмөсү. Бул бөлмөдө даяр жасалма тиштерди жылмалап жалтыратуу иштери жүргүзүлөт.

ПОЛОСКАНИЕ РАСТВОРАМИ ФТОРИДОВ — фторлуу суюктуктар менен чайкоо. Фторлуу дары-дармектерди колдонуп кариес оорусунун алдын алуу чараларынын бири. 0,05–0,2% фторлуу натрийдин эритмесин уурттап, 3 мүнөткө чейин тиштерди чайкоо керек, анан түкүрүп салып, оозду таза суу менен чайкап коёт. Муну бир жылда 2 жолу, ар бир 6 айда 10–15 күндөн чайкаса жакшы натыйжа берет. Эч убакта фторлуу натрийди жутпоо керек, кокустан бала жутуп алса 100–150 мл туздуу суу ичирүү керек.

ПОЛУКОРОНКА — жарым коронка. Көпүрөчө тиш протезин жасаганда таяныч иретинде колдонулуучу жасалма коронка. Ал тиштердин эрин жак бетинен башка үч бетин жаап турат, бул косметикалык жактан жакшы, металлды көргөзбөө үчүн болгон аракет.

ПОНИЖЕННАЯ СТИРАЕМОСТЬ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ — сүт тиштердин аз жешилүүсү. Сүт тиштердин дөмпөкчөлөрү алардын түшүү мөөнөтү жакындаганда жешилип бүтүү керек. Кээде тиштердин катуу болуп калышынан кайсы бир тиштердин дөмпөкчөлөрү жешилбей калып, тиш-жаак системасынын туура эмес өсүшүнө алып келет. Көбүнчө кылкыйма сүт тиштер физиологиялык жешилүүгө дуушар болбой калышат.

ПОРОШКИ ЗУБНЫЕ — тиш тазалоочу күкүм. Тиштерди тазалоодо бирден бир колдонуучу зат. Курамына бор, дикальций-фосфат, трикальций-фосфат ж. б. жакшы сүрүүчү

заттар кирет. Жыты жагымдуу болсун үчүн эвкалипт, мен-тол майлары кошулат.

ПОРОШОК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПРОТЕЗОВ — жасалма тиштерди жалтыраткыч күкүм. Анын курамына талаа шпаты, кварц, каолин, кремний кирет. Ал сууга же майга ара-лаштырылып колдонулат.

ПОСКАЛ — поскал. Цинк-фосфат цементи, төшөнчү үчүн колдонулат жана бекилме жасалма тиштерди туруктуу бекитет.

ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ — туруктуу тиштер. Сүт тиштер түшкөндөн кийин чыккан туруктуу тиштер. Араб сандары менен белгиленет, саны 32.

ПОЧИНКА СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА — пластиналуу кийме жасалма тишти жамоо, оңдоо. Кайсы бир себептер менен сынып калган пластмассадан жасалган пластиналуу жасалма тиштин сыныгын бириктирүү. Аны тез катуучу пластмассалар (протакрил, редонт) менен бириктирип, мурункудай эле кийип жүрсө болот.

ПРАЩА ПОДБОРОДОЧНАЯ — салмоор. Жаак сөөгү сынганда, сөөк сыныктарын ордуна салгандан кийин аларды кыймылдатпай шакшак менен бекем байлоо керек. Тиштерге тиштерди туура келтирип, ээктин формасындай табакчаны ээкке коюп, аны баш сөөгүнө тартып бинт, жоолук же жалпак резина менен таңып коёт.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ — жасалма тиш жасар алдында ооз көндөйүн, тиштерди, жаак сөөгүн дарылоо. Ал жалпы даярдоо жана атайын даярдоо болуп бөлүнөт. Жалпы даярдоого бузулган тиштерди мүмкүн болсо дарылоо, мүмкүн болбосо жулуу, тиштердин ташын тазалоо, стоматит, гингивит болсо, ооруларын дарылоо керек ж. б. Атайын даярдоодо жасалма тиштерди жасоодо жолтоо болуучу тиштердин нервин алып, аларды өгөп, кесип кыскартуу же болбосо жулуп салуу, жаак сөөктө өсүп калган дөңчөлөрдү, урчуктарды (экзостоз, нёбный торус) алып таштоо, ооз өтө кичине (микростомия) болсо операция жасап кенеитүү, тиш катарынын кыйшыктыктарын (аномалия) оңдоп, ооз ичиндеги

былжыр кабыкчада муздактан, ысыктан пайда болгон берчтерди хирургиялык жол менен алып таштоо ж. б. иштер жүргүзүлөт.

ПРЕДРАК КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ, БОРОДАВЧАТЫЙ — эриндин кыюусунун сөөл түспөлдөнүп ракка окшоштугу. Диаметри 0,4–1 см келген көлөмү чектелген түйүн, түбү катуурак келип, бети кабырчыктап турат, өңү кызгылтыраак, мындай түйүнчөк эриндин өнөкөт сезгенүүсүнөн болот. Көрүнүшү сөөлгө окшош болгондуктан, кээде жаңылып калышат. Гистологиялык изилдөөдө эриндин терисинин катуулашы жана түлөшү көрүнөт.

ПРЕМЕДИКАЦИЯ — премедикация. Кээ бир оорулууларга дарылоо жүргүзөр алдында нерв системасын тынчутуу үчүн өзүнчө дары (триоксазин, седуксен, амидопирин ж. б.) берүү. Бул коркууну, тынчсызданууну жоготот.

ПРЕМОЛЯРЫ — кичи азуулар. Жогорку жаакта 4, ылдыйкы жаакта 4 кичи азуулар бар, булар да тамак чайноого катышат. Жогорку жаактын биринчи кичи азуусу эки тамырлуу, калгандары бир тамырлуу, экиден дөмпөчөлөрү бар.

ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЗУБОВ — тиштерди өгөө. Кыт коюш үчүн тиштин кариес болгон көңдөйүн өгөө же оозго бекилме жасалма тиш жасоодо жасалма каптама жасаш үчүн тиштердин сыртын өгөп, формасын цилиндрге окшоштуруу.

ПРЕТЫЛ — претыл. Этилацетаттын негизинде жасалган суюктук, доголуу тиш протезинин сынчын (каркасын) химиялык жол менен тазалоодо колдонулат. Суюктукка малып алып, абада кургатат. Германияда чыгарылат.

ПРИВЫКАНИЕ К ПРОТЕЗАМ — жасалма тиштерге көнүү. Кийме тиштерге көнүү бул татаал психологиялык процесс. Бул көнүү процесси 3 фазадан турат деп В. Ю. Курляндский далилдеген: 1) дүүлүктүрүү фазасы, мында жасалма тиш адамдын тынчын алат, кыжырын келтирет, тамак жей албайт, так сүйлөй албайт, шилекейи токтобой көп агат, жүрөгү айланып, кускусу келет, уурт-эриндери тартылгансып, чыңалгансып сезилет. Кээ бир кишилерде жасалма

тиштен жийиркенүү сезими пайда болот. Бул сезимдер тишти оозго койгон күнү өтө катуу сезилет; 2) дүүлүктүрүү жарым жартылай азайып, токтоло баштайт. Бул 5 күнгө чейин созулат. Мында шилекейдин акканы азайып, токтолот, сүйлөгөнү так болууга жакындап, жүрөгүнүн айланганы азаят, жумшак тамактарды аз-аздан жей баштайт; 3) бардык дүүлүктүргүчтөр толук жок болуп, тамакты кадимкидей эле чайнап, жеп калат. Адам оозунан жасалма тишти чыгарып койсо, оозунда бир нерсе жетишпей калгансып, аны батыраак кийип алууга шашат. Оозго бекилме жасалма тиштерге адам 1–2 суткада эле көнүп, өз тиштердей сезип, сүйлөөсү, тамак жеши эч кандай тоскоолдукту билдирбейт. Ошентип түрүнө жараша кийме тиштерге көнүү мөөнөтү 3 күндөн 33 күнгө чейин созулат.

ПРИВЫЧКИ ДЕТСКИЕ ВРЕДНЫЕ — балдардын зыяндуу адаттары. Балдардын бет-жаак системасынын туура өсүшүнө тоскоолдук кылуучу зыяндуу адаттары. Зыяндуу адаттарга бармакты, тилди, эринди, калемди ж. б. нерселерди соруу кирет.

ПРИЗНАК КРИВИЗНЫ́ КОРО́НКИ — коронканын кыйшайгандыгынын белгиси. Тиштин маңдай бетин тигинен экиге бөлө турган болсок, анда борборго жакыны дөмпөк, ал эми чет жагы мокок болот.

ПРИЗНАК КРИВИЗНЫ́ КО́РНЯ — тамырдын кыйшайгандыгынын белгиси. Маңдайкы тиштердин тамырынын учу капталга, ал эми азуу тиштердин тамырынын учу артты карай кыйшайып турушу.

ПРИЗНАК ПОЛОЖЕНИЯ КО́РНЯ — тамырдын абалынын белгиси. Ылдыйкы тиштин тамырынын борбордон четти карай кыйшайып турушу, жогорку тиштердин тамырынын борборго карай чогулушу менен мүнөздөлөт. Муну тишти жулуп алгандан кийин тик кармап туруп, аныктаса болот.

ПРИЗНАК УГЛА́ КОРО́НКИ — коронканын бурчунун белгиси. Тиштин коронкасынын оң же сол жаккы экенин көрсөтүүчү белги. Маңдайкы тиштердин борборго караган

жагынын (медиальный) кесүү кырынын бурчу учтуу, ал эми четке караган (дистальный) жагынын кырынын учу том-погураак экендиги менен мүнөздөлөт.

ПРИЗНАКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ — борбордук окклюзиянын белгилери. Негизгилери: тиштерде — үстүнкү жана астыңкы жаактардагы тиштердин толук санда тийишип турушу; муундарда — астыңкы жаактын өсүгүнүн муун башчаларынын бетинин чыккыйлардагы муун бетинин айдөшүнүн таманында жайгашышы; булчуңдарда — астыңкы жаакты көтөрүүчү: чыккый, чайноочу жана медиалдык канат сыяктуу булчуңдардын жыйрылышы. Кошумчалары: беттин ортоңку чийиминин үстүнкү жана астыңкы борбордук кашка тиштердин ортосунан өтүшү; үстүнкү маңдай тиштер алдыңкы маңдай тиштерди төрттөн бирине чейин жаап турат; чайноочу үстүнкү тиштер астыңкы чайноочу тиштерди жаап турат; ар бир үстүнкү тиш астыңкы эки тиш менен (атташ жана арткы), ар бир астыңкы тиш үстүнкү эки тиш менен (атташ жана алдыңкы) тийишип турат. Бирден гана атташ менен 11, 21, 38 жана 48 тиштер тийишет.

ПРИКУС — үстүнкү жана астыңкы тиштердин катарларынын тийишип, ашташып тургандагы катышы. Прикус физиологиялык (ортогнатия, тик, бипрогнатия жана физиологиялык прогения), аномалиялык жана патологиялык болот. Аномалиялык прикустун төмөнкүдөй түрлөрү бар: ачык, терең, айкашкан жана В. Ю. Курляндскийдин далилдөөсү боюнча үстүнкү жаак туура өскөндө астыңкы жаактын чоң болуп калышы, астыңкы жаак туура өскөндө үстүнкү жаактын чоң болуп калышы, үстүнкү жаак туура өскөндө астыңкы жаактын өспөй кичине болуп калышы, астыңкы жаак туура өскөндө үстүнкү жаактын өспөй, кичине болуп калышы. Буга биздин (У. А. Амираев) кошумчабыз — бир жаак (айырмасы жок кайсы жаак экени) өтө чоң болсо, экинчиси өтө кичине болсо, аномалиялык прикуска жатат. Тиштердин катарынын туура же туура эместигин аныктай турган Пон индекси жана Хауляй-Герbst диаграммасы бар.

Аномалиялык прикусту врач ортодонт-стоматолог дарылайт. Акыркы убакта брекет системаны колдонуу жакшы натыйжа берүүдө. Патологиялык прикуста тиштердин жарым жартылайы же бардыгы түшүп калганда врач ортопед-стоматолог дарылайт, б. а. врач жасалма тиштердин ар кандай конструкциясын жасап, бет-жаак системасынын кызматын (функциясын) калыбына келтирет жана адамдын сырткы кебетесин оңдойт, жашартат. 28–32 соо тиштери бар физиологиялык прикусту дарылабайт.

ПРИКУС ГЛУБОКИЙ — тиштердин терең катышы, ашташы. Мандайкы тиштердин терең катышы. Мында астыңкы жаактын мандайкы тиштери, үстүнкү жаактын мандайкы тиштеринин таңдай жагындагы былжыр кабыкчасына барып тийип, оорутат. Үстүнкү жаактын маңдай тиштери астыңкы жаактын маңдай тиштерин толук жаап калат. Тиштердин туура катышында жогорку маңдай тиштер астыңкы маңдай тиштерди $1/4$ ине чейин гана жаап турушу керек.

ПРИКУС МОЛОЧНЫЙ — сүт тиштердин катышы, ашташы. Тиштердин саны 20 болот: үстүнкү жаакта 10, астыңкы жаакта 10. Туруктуу прикустан айырмасы мында кичи азуу тиштери болбойт. Сүт тиштердин көлөмү кичине, тогологураак келип, көгүш-сары түстө болот, Туруктуу тиштерге караганда жумшак келет. Сүт тиштер 6–8 айдан 30–36 айга чейин чыгып бүтөт.

ПРИКУС ОТКРЫТЫЙ — тиштердин ачык катышы, ашташы. Бул аномалиялык прикуска кирет, мында тиштерди тиштенгенде маңдайкы тиштер бири-бирине жетпей ортосу ачык калат. Бул баланын кичинесинде тилин, эринин жана упчуну узакка соруп жүргөндөн болот. Ачык прикус каптал тиштерде да болот.

ПРИКУС ПЕРЕКРЁСТНЫЙ — тиштердин кайчылаш катышы, ашташы. Астыңкы тиштердин катары онго же солго жылып калып, жогорку тиштердин катары менен төп келишпей калат. Бул аномалиялык прикуска жатат.

ПРИКУС ПОСТОЯННЫЙ — туруктуу тиштердин катышы, ашташы. Туруктуу тиштер 5,5–6 жаштан 12–13 жашка чейин, ал эми акыл азуу 18–25 жашта чыгат.

ПРИМА — прима. Стоматологиялык аспаптарды стерилдөөчү электрондук автоклав. Ушуга окшош ПРОКСИМА, ЭКЗАТА деген автоклавдар да бар. Бардыгы Италияда чыгарылат.

ПРИПОЙ ДЛЯ СТАЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ — дат баспоочу болоттун данакери, кандоочусу. Курамына күмүш, жез ж. б. металлдар кирет, эрүү температурасы 800–850°Ска чейин жетет. Ооздон алынбоочу көпүрөчө жасалма тиштерди жасоодо колдонулат. Жасалма каптамалар менен шакшак жасоодо аларды бири-бири менен данакерлейт, ширетет.

ПРИШЛИФОВЫВАНИЕ ЗУБОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ — тиштерди тандап өгөөлөө. Тишин катарында кайсы бир тиштер физиологиялык жешилүүгө дуушар болбосо, аны бор машина менен өгөөлөп коюу.

ПРОБА ВОЛДЫРНАЯ — ыйлаакча шишимектин сыноосу. Ооз ичиндеги былжыр кабыкчанын билинбеген шишин табуу үчүн коюлат.

ПРОБА ГИСТАМИННАЯ — гистамин сыноосу. Пациенттин аллергияга сезгичтигин аныктоо үчүн гистамин белгисин коюп көрөт.

ПРОБА КАВЕЦКОГО — Кавецкий сыноосу. Ткандын айыгуу мүмкүнчүлүгүн жана фагоциттардык активдүүлүгүн аныктоо үчүн коюлат.

ПРОБА ЛЕЙКОПЕНИЧЕСКАЯ — лейкопениялык сыноо. Акрил пластмассасынан жасалган кийме тиш кийип жүргөндө кээ бир кишилерде оозунун былжыр кабыкчасында бөлөк даам, ачышуу, чымчыгандай, күйүп калгандай сезимдер пайда болот. Мунун себеби жасалма тиштеби же башкадабы аныктоо үчүн тишти кийбей турганда манжадан кан алып, лейкоциттерин санайт, андан кийин жасалма тишти 3–4 саат кийгизип туруп, кайра дагы манжадан кан алып, лейкоциттерин санайт. Эгерде лейкоциттин саны 1 мм³де 1000ге азайса, анда себеби пластмассада экени билинет. Бул сыноону адам ооруп же денеси ысытмалап турса жасоого болбойт.

ПРОБА ПРОВОКАЦИОННАЯ — чыккынчы сыноо. Кийме тишти кийбей жүрүп, кайра кийгенде мурунку оорунун, кыйналуунун кайра башталуусу.

ПРОБА РАЗГОВОРНАЯ — сүйлөөнү сыноо. Кийме тишти жасаганда тиштери жок жаактардын аралыгынын туура же туура эмес аныкталгандыгын далилдөөчү ыкма. Аны үчүн жогорку жана астынкы жаактарга негизи жана жаак сөөктөрүнүн мурунку тиштер турган кыры боюнча бийиктиги 12–15 мм, эни 8–10 мм келген момдон жасалган валикти (прикусной валик на восковом базисе) коюп, кайсы бир тамгаларды, муундарды, сөздөрдү айттыруу керек, мисалы, о, и, в, п, с, з, эки, үч, суу, сүт, нан ж. б. Ошондо валиктердин ортосундагы аралык 4–6 мм болушу керек. Эгерде бул аралык көп (8–13 мм же андан көп) болсо, тиштердин катышынын бийиктиги жапыз деп эсептелинет, же бул аралык аз (1–3 мм же андан да аз) болсо, анда боло турган жасалма тиштин тиштер катышынын бийиктиги бийик болуп калат. Бийиктик жапыз болуп калса, тиштери жок кишидей бырыш-тырышы көп болуп, адам картаң көрүнүп калат, ал эми бийик болуп калса сүйлөгөндө, тамак жегенде тиштери бири-бирине шакылдап тийип, жаак булчуң эттери чоюлуп, чарчап оорутат. Адамдын чыккыйы, башы ооруйт.

ПРОБА С ЭКСПОЗИЦИЕЙ — убакытка байланышкан сыноо. Кийме тиш менен жүргөндө ар кандай ыңгайсыздыктар болсо, аны убактынча (1–2 күн) аны алып коюу керек. Себеби акрил пластмассасында болсо, адам өзүн мурдакыдан жакшы сезип калат.

ПРОБА ШИЛЛЕРА-ПИСАРЕВА — Шиллер-Писарев сыноосу. Тиштин этинин сезгенүүсүн жана анын канчалык даражада экенин аныктоочу ыкма. Аны үчүн 1 г йодду, 2 г калий йодидин дистирленген 40 мл сууга эритип, тиштин этине сыйпаш керек. Муну менен сезгенүүдө жайылып кеткен гликогенди аныктоого болот. Эритиндини сыйпаганда тиштин эти сары түстөн кара күрөңгө чейин боёлот. Ошого карап диагнозду тактоо менен катар дарылоонун натыйжасын билүүгө болот.

ПРОБА ЯСИНОВСКОГО — Ясиновский сыноосу. Бул проба аркылуу былжыр кабыкчадан канча лейкоцит өткөнүн жана эпителийдин сыйрылган санын билүүгө болот.

ПРОГЕНІЯ — прогения. Прикустун аномалиясы, астыңкы жаактын алдыга карай чыгып, андагы маңдайкы тиштердин үстүнкү маңдайкы тиштерди жаап турушу. Кээде жаман адаттын натыйжасында жалган прогения болушу мүмкүн. Ошондой эле тиштердин бардыгы түшкөндө карылык прогения болот (Кыргызда кемпир ээк деп коёт).

ПРОГНАТІЯ — прогнатия. Прикустун аномалиясы, үстүнкү жаактын сөөгүнүн чоң болушунан же астыңкы жаактын толук өспөй калышынан болот. Мында үстүнкү жаактын маңдай тиштери өтө алдыга чыгып калгандыктан, астыңкы маңдай тиштерге тийишпей, арасы ачык болуп калат.

ПРОЛЕЖЕНЬ — жоордонуу. Эт оюлуу жарасы көбүнчө кийме тиштин негизинин чек арасы өлчөмдөн ашык болуудан, жасалма каптаманын кенен жасалганынан, көпүрө сымал жасалма тиштин аралыгынын былжыр кабыкчага такалып, тыгыз жасалганынан пайда болот. Бул учурда себепкер жерди оңдоп, кесип, кырып таштоо зарыл. Ансыз протезди кийиш, тамак жеш мүмкүн эмес. Көпүрө сымал жасалма тишти алып, кайра жасоо керек.

ПРОЛИФЕРА́ЦИЯ — ткандын өсүүсү. Сызгенүү мезгилинде (гингивит, пародонтит ж. б.) клеткалардын көбөйүп тиштин бүйлөсүнүн өсүп кетиши.

ПРОМЫВНО́Е ПРОСТРАНСТВО — жуулуучу аралык. Көпүрө сымал жасалма тиштин денеси менен былжыр кабыкчанын ортосундагы жылчык.

ПРОНАЗА́ЛЕ — проназале. Мурундун эң учундагы антропометриялык чекит.

ПРОПЕДЕ́ВТИКА — пропедевтика. Негизги сабактын алгачкы башталышын туюндуруучу бөлүгү.

ПРОТАКРІЛ-М — протакрил-М. Өзү катуучу акрил пластмассасы, кийме тиш протези сынып калганда, илмекти жабыштырганда, 1–2 өз тиши түшүп калганда, кийме протезге жабыштырганда керек болуучу пластмасса. Курамы күкүм жана суюктуктан турат. Күкүмү майда дисперстүү суспензиялык кошмо полимерлүү метилметакрилат жана

пластмассанын бат карып кетишине каршы заттардан, суюктугу турукташтырылган (стабилдештирилген) метакрил кислотасынын метил эфиринен ж. б. заттардан турат.

ПРОТЕ́З — дененин жасалма бөлүгү. Тиш протези тиштер бузулганда, тиш катарында кемтик пайда болгондо же тиштер жок болсо жасалат. Жасалма каптама, көпүрөчө, доголдуу жана пластинкалуу жасалма тиштер деп аталат.

ПРОТЕ́З КОНСОЛЬНЫЙ — асма протез. Тиштердин катарынын кемтигин толуктоодо, таянычы (каптамасын) бир жагына жасап, оозго бекилүүчү жасалма тиш.

ПРОТЕ́З МОСТОВИ́ДНЫЙ — көпүрө сымал жасалма тиш. Тиш катарында кемтик пайда болгондо, жасалуучу таянычы (каптамалары, илмектери) эки жактан болгон жасалма тиш. Алар ооздон алынбоочу жана алынуучу болуп жасалат.

ПРОТЕ́ЗНОЕ ЛО́ЖЕ — кийме тиштин орду. Тиш протездери менен тийишип турган ткандар, алар: жаак сөөктөрүнүн кырынын, таңдайдын, уурттун былжыр кабыкчасы, ооздун түбү.

ПРОТЕ́ЗЫ ДЛ́Я ДЕТЕ́Й — жаш балдарга жасалма тиштерди жасоо. Балдарга жасалма тиштерди жасаганда алардын курагына байланыштуу өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу зарыл. Жасалма тиштер жаак сөөгүнүн жана тиштердин катарынын туура болушуна тоскоолдук кылбашы керек. Жаак сөөгүнүн өсүшүнө жараша балдардын жасалма тиштерин бат-бат алмаштырып туруу зарыл. Көпүрө сымал жасалма тиштер жаак сөөгүнүн өсүшүнө тоскоолдук кылат. Тоскоолдук кылбас үчүн көпүрө сымал жасалма тиштердин ортосу бири-бирине кирип кыймылдап турушу керек.

ПРОТОПЛЕ́Н-М — протоплен-М. Былжыр кабыкчасы жука тишсиз жаакка кийме тиш жасаганда экинчи кабат кылып төшөнчү катары колдонулуучу жумшак пластмасса.

ПРОТРУ́ЗИЯ ЗУБО́В — тиштердин протрузиясы. Үстүнкү жаактын маңдай тиштеринин эрин жакка карай өтө көп кыйшайып кетиши. Мында үстүнкү жана астынкы маңдай тиштер тийишпей калат.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА — ооз ичиндеги былжыр кабыкчанын кесипке байланыштуу бузулушу. Айлана-чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө ооз ичиндеги ткандар, органдар тыгыз байланышта болгонуна жараша ооз көндөйүндө былжыр кабыкчанын ар кандай оорулары пайда болот. Химия өндүрүшүнүн өркүндөшүнө жараша химиялык заттардын түздөн-түз таасири жана алар менен өнөкөт, созулма түрдө уулануу болот. Мында клеткалардын иммундук касиети өзгөрүлө баштайт.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА — стоматологиялык алдын-алуу каражаттары. Алар төмөнкүлөргө бөлүнөт: ооз көндөйүндөгү ткандар жана органдардын гигиенасы үчүн каражаттар (тиш пастасы, күкүмү), чайкоо үчүн каражаттар (фториддер, өсүмдүк маңызы, минералдык туздар, эликсирлер), чаптоо (апликация) үчүн каражаттар (фторлак, кальций глюконаты, фториддер, гелдер), таңуу үчүн каражаттар (биологиялык активдүү заттар, гелдер, минералдык туздар), ичүүчү каражаттар (фторлуу туз, микроэлементтер, фторлуу сүт, фторлуу натрийдин таблеткасы, «Витафтор» витаминдери ж. б.).

ПРОЧНОСТЬ — бышыктык. Стоматологиялык материалдардын тышкы күчтүн таасирине көрсөткөн каршылыгы.

ПТОЗ — жабык көз. Үстүнкү кабакты көтөрүп туруучу булчуң эти шал болгондо, көзгө операция жасоодо кабакты көтөрүүчү булчуңду кесип койгондо кабактын ылдый түшүп, көздү жаап калышы.

ПУЗЫРЧАТКА — ыйлаакча. Былжыр кабыкчадагы диаметри 5 мл ге чейин, ичине суу же кан толгон бүдүр. Көбүнчө эпителий катмарында болгондуктан, ал бат жарылып жарага айланат. Жийиркенүүдө, аллергияда оорунун биринчи белгиси.

ПУЛЬПА ЗУБА — тиштин өзөгү. Тиштин коронка жана тамыр жагында көндөй болот, ал көндөйдүн негизин бириктирүүчү ткандар түзүп, анда ар кандай клеткалар

(одонтобласттар, гистиоциттер, фибробласттар, лимфоциттер ж. б.), талчалар (коллагендер) жана клеткалардын арасында жайгашкан (мукопротеин, гликопротеин, мукополисахарид) болот. Ошондой эле өзөктүн курамынын негизи нервдерден жана кан тамырлардан, көп борпоң ткандардан турат.

ПУЛЬПАЭКСТРАКТОР — тиштин өзөгүн жулуучу аспап. Тиштин тамырынын каналындагы өзөктү жулуу үчүн колдонулуучу курал. Ийкемдүү металлдан жасалат. Капталында өсүктөрү бар. Өзөккө сайгандан кийин аспапты бурап, анан пульпаны жулуп алат. Эң узуну 150 мм, кыскасы 30 мм, жоондугу ар кандай (№ 1, № 2 ичке, № 3 орто, № 4, № 5 жоонураак) болот.

ПУЛЬПИТ ОСТРЫЙ ДИФФУЗНЫЙ — тиштин өзөгүнүн жалпы катуу сезгенүүсү. Мында тиш тынбай ооруп, оору баш, кулак, моюнга тарайт, пациент кайсы тиши ооруганын так көргөзө албайт. Зонд менен чукуганда, электр тогу менен текшерип көргөндө тиштин өзөгүнүн сезгичтигинин жок экенин көрүүгө болот.

ПУЛЬПИТ ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ — тиштин өзөгүнүн ириңдүү сезгениши. Тиш локулдап, токтоосуз ооруйт, чыккый, жаак тушуна тарап, муздак сууну ууртаганда гана бир аз басылгансыйт. Дененин ысыганы 38°C температурага чейин жетет. Ооруган тиш тыкылдатып уруп көргөндө билинет. Тиштин көңдөйүн ачып, ириңин тазалаганда тиштин ооруганы басылат.

ПУЛЬПИТ ОСТРЫЙ ЧАСТИЧНЫЙ — тиштин өзөгүнүн жарым-жартылай курч сезгенүүсү. Кариестин таманына жакын жагында башталат. Мында тиш өзүнөн өзү себепсиз мезгил-мезгили менен ооруйт, зонд менен чукуп көргөндө катуу ооруп кетет.

ПУЛЬПИТ РЕТРОГРАДНЫЙ — өзөктүн тескери сезгенүүсү. Өзөктүн тиштин чайноо бетинен эмес, тамырынын учунан башталган сезгенүүсү. Тиштин тамырынын учунда микроб чогулганда, тиштин этинин чөнтөкчөсү тереңдеп кеткенде өзөктүн сезгенүүсү тиштин тамырынын учунан башталат.

ПУЛЬПИТ ХРОНИЧЕСКИЙ ГАНГРЕНОЗНЫЙ — тиштин өзөгүнүн чирип өнөкөт сезгенүүсү. Тиш ысык тамак ичкенде ооруп кетет, коронка жактагы өзөктү зонд менен сайгылап, анан жыттап көргөндө сасык жыттанат. Зонд менен тамырдын көңдөйүндөгү өзөктү сайганда сезгичтиги билинет.

ПУЛЬПИТ ХРОНИЧЕСКИЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ — тиштин өзөгүнүн өсүп өнөкөт сезгенүүсү. Тиштин өзөгүнүн өсүп тиш көңдөйүнө толуп калышы. Тиштин көңдөйү тамактын калдыктары тыгылып калганда, тиш бат ооруп кетет. Тиштин көңдөйүн изилдеп кароо аркылуу аныкталат. Зонд менен текшерип көргөндө өскөн өзөктүн түбү тиштин көңдөйүнүн таманында болот да, ооруп канап кетет.

ПУЛЬПИТ ХРОНИЧЕСКИЙ ОБОСТРИВЩИЙСЯ — тиштин өзөгүнүн өнөкөт сезгенүүсүнүн күчөшү. Өзөктүн сезгенүүлөрүнүн бардык түрлөрү күчөшү мүмкүн. Тиш зыркырап, токтобой, ооруп, адам кайсы тиши ооруганын так көргөзө албайт. Тиштер, жаак, чыкый кошо зыркырап ооруйт. Тиштин бетинде көңдөй бар болсо дарттын аты (диагноз) бат коюлат.

ПУЛЬПИТ ХРОНИЧЕСКИЙ ФИБРОЗНЫЙ — тиштин өзөгүнүн фиброздуу сезгениши. Тишти текшерип караганда кариестин чункуру экени терең көрүнөт, бети ачылып калган тиштин өзөгүн зонд менен чукуганда ооруганы сезилет. Кээде өзөк жумшарган дентиндин астында болуп көрүнбөйт, зонд менен чукуганда өзөктүн көңдөйүнө түшүп кетет. Өзөк канайт. Фиброздуу сезгенүү кыттын астында да кездешет, муздакка ооруп кетет, ысыкка оорубайт.

ПУЛЬПОТОМИЯ — пульпотомия. Тиштин коронка жагындагы пульпаны хирургиялык жол менен кесип алып салуу.

ПУЛЬПАЭКТОМИЯ — пульпаэктомия. Тиштин пульпасын толук, тиштин тамырынын учуна чейин алып салуу.

ПУНКТАТ — пунктат. Пункция аркылуу алынган ткандар менен суюктук, өлчөм.

ПУНКТЫ МЕЖЗУБНЫЕ КОНТАКТНЫЕ — тиштердин бири-бири менен тийишип турган жерлери. Бир тишке басым түшсө, ал басым тийишүү беттеринин жардамы менен

жанындагы тиштерге таралат. Илгерилеген сайын тиштер бири-бири менен сүрүлүп олтуруп, тийишкен беттери жешил-лип, тиштердин катары 1 см кыскарат. Тиштерде кариес пайда болуп, тийишүү бети жок болуп калса, кыт койгондо тийишүү бетин тыгыз жасоо керек, антпесе ал жерге тамак тыгылып кала берип, тиштин этинин сезгенүүсүнө себепкер болот. Тиштер тыгыз болбосо, кийинчерээк бул жерде папиллит, гингивит, пародонтит оорулары пайда болот.

ПУНКЦИЯ — **пункция**. Органды же денедеги кайсы бир көндөйдү ичинде эмне бар экенин билүү үчүн ийне менен тешүү, диагнозду аныктоо максатында анализге жиберүү же дарылоонун натыйжасын билүү үчүн жасалат.

ПУРПУРА — **пурпура**. Кан тамырлардын көпшөктүгүнөн, борпоңдугунан пайда болгон кызыл ала темгилдер.

ПУСТУЛА — **пустула**. Бет терисине чыга турган ириндүү ыйлаакча.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ — **чайноо басымын өткөрүү жолу**. Чайноо басымы тиштерден пародонтко өтөт, андан ары жаак сөөгүндөгү жоонойгон түркүк (контрфорс) аркылуу баш сөөгүнүн түбүнө чейин жетип, жок болуп кетет. Валькгоф аларды мандай-мурун, бет, канат-тандай жана тандай түркүктөр деп атаган. Катцтын далилдөөсү боюнча ылдыйкы жаакка түшкөн басымды жаак-чыккый мууну азайтып, жок кылат. Айрым изилдөөчүлөр чайноо басымы баш сөөгүнүн бардык сөөктөрүнө бирдей таралат деп эсептешет.

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРОТЕЗА — **жасалма тишти оозго киргизип, ордуна коюу жолу**. Кийме тиштерди ордуна коюунун, кийгизүүнүн өзүнчө ыгы болот. Бул кыймыл-аракет жасалма тиштин илмектери таяныч тиштерге тийгенден башталып, протез жайына толук жеткенде бүтөт. 5 жолу белгилүү: 1) жогорудан ылдый карай тик (вертикалдуу); 2) ондон тик; 3) солдон тик; 4) артынан тик; 5) алдыңкы жактан тик.

ПУТЬ ВЫВЕДЕНИЯ ПРОТЕЗА — **жасалма тишти ооздон чыгаруу жолу**. Жасалма тишти коюудагы кыймыл-ара-

кеттин тескерисинче так жасалышы, илмектердин тиштерден алынышы менен аяктайт.

ПЯТЁРКА ГАНАУ — Ганау бештиги. Тиштердин кыймыл-аракети (артикуляциясы). Ганау 5 түрүн белгилеген: 1) муундун жолунун энкейиши; 2) кашка тиштердин катышуусу; 3) сагитталдык жана трансверзалдык ийриликти; 4) болжол тегиздигинин энкейиши; 5) тиштин чайноо бетиндеги дөмпөктөрүнүн бийиктиги. Кийме тиштерди жасаганда ушул 5 далил бири-бирине байланыштуу болот.

ПЯТНО — так. Былжыр кабыкчанын өңүнүн өзгөрүүсү. Морфологиялык өзгөрүүлөр болгондо эң биринчи көрүнүүчү белги. Пайда болушуна жараша төмөнкүдөй бөлүнөт: кан тамырга байланыштуу (эритема, розеола); кандын тарашына жараша (петехия, пурпура, экхимоздор); адистик факторлордун таасиринен боло турган (коргошун, висмут, сымап ж. б.) тактар.

ПЯТНА КОПЛИКА-ФИЛАТОВА — Коплик-Филатов тактары. Бул кызамык оорусунда пайда болуучу тактар. Көбүнчө чоң азуу тиштердин тушундагы былжырлуу кабыкчада жайланышат, агыш-жашыл түстө болот.

Р

РАБДОМИОМА — рабдомиома. Туурасынан ала-була булчун эттин зыянсыз шишиги, көбүнчө тил булчунунда кездешет. Кокустан пайда боло турган болсо өсүп, чоңоюп кетүүчү дарт.

РАДИОВИЗИОГРАФИЯ — радиовизиография. Рентген нурунун жардамы менен рентгенге тартуу. Мында пациент нурга 10 эсе аз кабылат жана рентген тасмасы, химикаттар колдонулбайт, жумуш бат болот.

РАДИОСИАЛОГРАФИЯ — радиосиалография. Радиоактивдүү иоддун изи аркылуу шилекейдин бөлүнүшүн ченеп, чыккый безинин кызматын аныктоочу клиникалык радиоизотоп ыкмасы.

РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ЧЕЛЮСТЕЙ — ооз ичиндеги былжыр кабыкча менен жаактын рагы. Эпителий катмарында пайда болуучу коркунучтуу шишик, ооз ичиндеги былжыр кабыкча менен жаак сөөктөрүндөгү рак оорусу. Бардык рак ооруларынын 10% ын бет-жаак аралыгындагы шишиктер түзөт. Кан жана лимфа тамырлары аркылуу бүт денеге тарап, башка жерде да оору пайда болушу мүмкүн. Коркунучтуу шишиктер орун алган жерине карай эрин рагы, тил рагы, ооз ичиндеги былжыр кабыкча рагы, жаак сөөгүнүн шишиги деп бөлүнсө, курамына карай — аденокарцинома (былжыр кабыктын эпителийи менен безден турган коркунучтуу шишик), чордонгон жана чордонбогон жалпак клеткалуу рак, одонтогендик (тиш менен чектеш, тектеш) рак деп аталат.

РАНА — жара, жаракат, жараат. Ткандагы белгилүү бир себептер менен пайда болгон бузулуу. Себебине жараша: ок тийген жара (огнестрельная рана), кесилген жара (резанная рана), чабылган жара (рубленая рана), эзилген, жанчылган жара (разможенная рана), сайылган жара (колотая рана), айрылган жара (рваная рана) ж. б. болот.

РАНДОЛЬФ — рандольф. Сары түстөгү кошулма. Курамында 66% жез, 33% цинк, 0,5% темир, 0,5% коргошун бар. Окуу курал катары фантом жумуштарын жасоого жарайт. Жасалма тиш жасап, ооз ичине коюуга болбойт.

РАНУЛА ИЛИ КИСТА ПОДЪЯЗЫЧНАЯ РЕТЕНЦИОННАЯ — тил алдындагы ретенциялык гранула же киста. Тилдин алдындагы бездин шишиги. Шилекей келүүчү түтүктүн жарааттанып жана сезгенип калышынан пайда болгон сары дөмпөкчө бара-бара ретенциялуу кистага айланат.

РАПИД РЕПАЙР — рапид репайр. Мала кызыл акрил пластмассасы, төмөнкү жылуулукта катат, оозго кийме тиштин негизи (базиси) жасалат. АКШда чыгарылат.

РАПИН — рапин. Аллергияга, сезгенүүгө, гальванозго, сенсбилизацияга, шишимектенүүгө каршы колдонулуучу суюк дары. Курамында фтордун иондошкон туздары бар, рН 7,5–8,3кө барабар. Бишкекте чыгарылат.

РАСЭСТИПЕН — расестипен. Металлакрил жана металлкерамика коронкасын жасарда тишти өгөөлөө алдында анын бүйлөсүнүн кырын көтөрүү үчүн колдонулуучу хлордуу алюминий синирилген жип. № 0, № 1, № 2 жоондукта болот. Францияда чыгарылат.

РАСПОРКА — кергич. Тиштер жулунгандан кийин, чектеп турган тиштер жылып кетпесин үчүн атайын кергич протездерди жасашат. Айрыкча сүт тиштерди жулганда туруктуу тиштерге орун сакташ үчүн жасалат.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ КАРИЕСА — кариестин таралуусу. Адамда кариестин (К) болушу, кытталганы (Ж; пломбированные – П) жана жулунганы (Ж; удаленные – У) жөнүндөгү мүнөздөмөнү берет ККЖ (КПУ). Мисалы, 100 кишинин ичинен 97синде кариестүү, кытталган жана жулунган тиштер болсо, анда бул топто кариестин таралуусу 97% болот.

РАУЦЕМ — рауцем. Ооздон алынбоочу жасалма тиштерди бекитүү үчүн колдонулуучу цемент. Алматыда чыгарылат.

РАХИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗУБОВ И ЧЕЛЮСТЕЙ — итийден тиштердин жана жаак сөөгүнүн өзгөрүүлөрү. Алар төмөнкүдөй болот: жаак сөөгүнүн бузулушу, тиштердин тамырынын өсүшүнүн бузулушу, тиштин чыгуу мөөнөтүнүн бузулушу, жогорку жана ылдыйкы жаактардын энсиз болушу ж. б. толгон-токой өзгөрүүлөр.

РАШПИЛЬ — рашпиль. Ири тиштүү, өгөөчү аспап.

РЕАНИМАЦИЯ — тирилтүү. Жандандыруу, жүрөккө массаж жасап, жүрөккө ийне сайып дары куюп, кан куюп, адам чукулунан өлүмгө дуушар болуучу учурда атайын көрсөтүлүүчү жардамдык чаралар.

РЕБАРОН — ребарон. Химиялык жол менен же жарыктын жардамы менен катуучу акрил пластмассасы, мала кызыл түстө болот, кийме тиштин негизин (базисин) оңдоодо, илмектерди, тиштерди жабыштырууда колдонулат. Японияда чыгарылат.

РЕАКТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗДРАЖАЮЩИХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ

ЗУБНЫМИ ПРОТЁЗАМИ — металл тиш протездерин пайдаланууда дүүлүктүрүүчү металлдарды аныктоочу реактивдер. Кээ бир пациенттерге жакпаган металл куймаларындагы металлды аныктоо үчүн алтынга алтын цианидинин 1% дуу, күмүшкө азот кычкыл күмүштүн 5% дуу, кобальтка күкүрт кычкыл кобальттын 2,5% дуу, жезге хлорлуу жездин 1% дуу суудагы эритмеси, никелге вазелиндеги 2,5% дуу күкүрт кычкыл никель, хромго 0,5% дуу кошхром кычкыл калий колдонулат.

РЕГЕНЕРАЦИЯ — калыбына келүү. Клеткалардын өсүшүнүн натыйжасында мурунку кемтиктин ордун толугу, дененин кесилген жериндеги клеткалардын өсүшүнөн улам калыбына келиши.

РЕДОНТ — редонт. Акрил пластмассасы. Редонттун жардамы менен кийме тиштердин сыныгын бириктирүүгө, илмекти жана тиштерди кийме тиштерге жамоого, тиштери жок жаактарга жасалган тиш протезин редонттун жардамы менен төп келтирүүгө (перебазировкалоого) болот, ошондой эле ортодонтиялык жана ортопедиялык аппараттарды жасоого жарайт, жаак сөөктөрү сынганда шакшак катары колдонсо болот. Редонт күкүм жана суюктуктан турат. Күкүмү метилметакрилат жана этилметакрилаттын кошулмасынан, ал эми суюктугу метилметакрилаттан, активдештирүүчү жана басандатуучу заттардан турат.

РЕДУКЦИЯ — кичирейүү, чөгүү. Тиштерди жулгандан кийин (кээде тиштерди жулбаганда деле) жаак сөөгүнүн кыры жоюла баштап, кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин жаак сөөгүнүн кыры жок болуп кетет. Кийме тишти жасагандан кийин жоюлуу, кичирейүү дагы ылдамдашы мүмкүн.

РЕД-ФЕЙЗ Р — ред-фейз Р. Тишке кыпчык (вкладка) жасоодо калып алуу үчүн колдонулуучу поливинилсилоксан массасы. Германияда чыгарылат.

РЕЖУЩЕ-БУГОРКОВЫЙ КОНТАКТ — кесүү-дөмпөк тийишүүсү. Тиштердин катарынын борбордук тийишүүсүндө маңдайкы астыңкы кашка тиштер үстүнкү маңдайкы кашка тиштердин таңдай жактагы дөңчөсү менен тийишип турушу керек, муну кесүү-дөмпөкчө тийишүүсү (контакт) деп

аташат. Кесүү-дөмпөкчө тийишүүсү жаактардын маңдайкы бөлүгүнүн бийиктигин аныктап турат.

РЕЗЕКЦИЯ — **резекция**. Терапиялык жол менен дарылап айыктыра албаган ооруларды операция жол менен алып таштоо. Мисалы: тиштин тамырынын учундагы кистаны операция жолу менен керттип алып таштоо.

РЕЗЕРВНЫЕ СИЛЫ ПАРОДОНТА — **пародонттун сакталган күчү**. Ал керек болгондо гана керектелинет, б. а. жумшак тамак жегенде сарпталбай, катуу тамак (жиштин түйүнүн чечкенде, жангак, өрүктүн данегин чакканда, тарамышты тиштегенде, чайнаганда гана) жегенде сарпталат. Тиштердин катарында кемтик болуп, көпүрө сымал тиш жасаганда таяныч тиштер резервдеги запас күчүн жумшайт.

РЕЗЕЦ БОКОВОЙ — **каптал кашка тиш**. Эки жаакта (үстүнкү жана астынкыда экиден) төртөө болот, бир тамырлуу.

РЕЗЕЦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — **борбордук кашка тиш**. Бир тамырлуу борбордук кашка тиштер үстүнкү жаакта эки, астынкыда эки болот. Борбордук, каптал жана кылкыйма тиштер тамакты тиштеп алууга ыңгайлашкан. Бул тиштердин сырткы көрүнүшү кескичке, күрөккө окшош болот.

РЕЗИДЕНТ — **резидент**. Тиштердин калыбын алуучу силикон массасы. Тиштердин калыбын алгандан кийин бул массанын көлөмү болор-болбос 0,14–0,6% га кичирейет. Германияда чыгарылат.

РЕЗОДЕНТ — **резодент**. Тиштин тамырынын каналын кыттоодо өтүүгө кыйын болгон учурда колдонулуучу паста.

РЕЗОРБИЦИЯ — **синирүү, сорулуу**. Ооруган жерге дары-дармекти шыбаганда анын синүүсү, ооздогу былжыр кабыкча аркылуу ар кандай заттардын сорулуусу. Ошондой эле тишти кармап турган жаак сөөгүнүн кырынын сорулуп жок болуп кетишинин натыйжасында тиштердин бошоп кетиши.

РЕЗОРЦИН — **резорцин**. Тиштин каналын дарылоодо колдонулуучу дары-дармек. Тиштин кариес оорусу татаалдашып, пульпит, периодонтит ооруларына өтүшүп кеткенде, тиштин тамырынын каналы бүтөлүп өтпөй калганда резорцинди синдирип дарылайт.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЁЗА — кийме пластиналуу тишти кошумча ондоо. Кийме тиштердин (пластиналуу, доголуу) илмектерин жылдыруу же жасалма тиштерди кошуу иштерин жүргүзүү.

РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ — реминерализация. Тиштин тканына минералдардын сиңүүсү.

РЕМИССИЯ — басандоо. Оорулуунун ооругандыгы убактынча басылып калган учур. Бул пульпит, периодонтит ооруларына тиешеси бар түшүнүк. Дарылоо натыйжалуу болгондо басандоо оорунун күчөшүнө караганда узара берет.

РЕНТГЕНОВИЗИОГРАФИЯ — рентгеновизиография. Акыркы убакта убакта рентген установкасы менен видеокамераны бириктирген аппараттар чыгууда. Бул аспап менен тартылган объектти экранда көрүүгө болот. Рентгеновизиограф тиштин тканынын сүрөтүн 27 эсе чонойтуп берет. Тасмадан керек жердин сүрөтүн чыгарып алса болот.

РЕНТГЕНОГРАММА — рентгенограмма. Адамдын ар кайсы органдарынын морфологиялык жана функциялык өзгөрүүлөрүн изилдеп, диагноз коюуда рентгенге тартып изилдешет. Стоматологияда 2 түрдүү ыкма менен тартылат: 1-ыкмада ооздун ичине рентген кагазын коюп, 1, 2, 3 тишти тартуу; 2-ыкмада рентген кагазын жаактардын сыртына кармап, бардык тиштерди, жаак сөөктөрдү тартуу.

РЕОГРАФИЯ — реография. Бул ыкманы ишке ашыруу үчүн реограф керек. Реографтын жардамы менен ткандарга кан толуп, кан айланып турган кезде ткандардын электр тогуна каршылык көргөзүп, тамыр согушунун термелүүсүн жазат. Стоматологияда тиштин өзөгүндөгү кан айланууну изилдөө үчүн реодентография, пародонту изилдөө үчүн — реопародонтография, чыккый аймагын изилдеш үчүн — реоартрография ыкмалары колдонулат.

РЕОКАП ТЕМП — реокап темп. Коронкаларды, көпүрөчө тиш протездерин убактылуу бекитүүдө, колдонулуучу, курамында эвгенолу жок цемент. Германияда чыгарылат.

РЕПІН — репин. Катуу калып алуу үчүн масса, цинк-оксидэвгенол пастасы. 2 түрдүү алюминий сыкмасынан турат: ак (негизи) жана сары (тездетүүчү-катализатор) пасталары. Тиштердин бардыгы толук түшкөндө калып алуу үчүн колдонулат.

РЕПЛАНТА́ЦИЯ ЗУ́БА — тишти реплантация жасоо. Хирургиялык ыкма, ооруган тишти жулуп алып, аны дарылап кайра өз ордуна коюп жандандыруу.

РЕПОЗА́ЦИЯ — салуу, түзөтүү. Сынган жаак сөөктөрдүн сыныктарын өз ордуна тууралап, түздөп келтирүү жана чыккый-ылдыйкы жаак мууну ордунан чыгып кеткенде салуу.

РЕТЕНЦИО́ННЫЕ АППАРА́ТЫ — токтотуучу аппараттар. Алынган натыйжаны бекитүү, акыркы абалды калтыруу үчүн колдонулуучу аппараттар.

РЕТЕНЦІ́Я ЗУ́БА — тиш ретенциясы. Кайсы бир тиштердин чыкпай, жаак сөөгүнүн ичинде калып калышы. Көбүнчө кылкыйма, акыл азуу тиштери ретенция болот.

РЕТРА́КЦИЯ ДЕСНЫ́ — бүйлөнүн ретракциясы. Тиштин этинин жыйрылып, тартылып, кичирейиши. Бул учурда тиштин тамыры ачылып калат. Ретракция пародонтит, пародонтоз менен ооруганда пайда болот.

РЕТРУ́ЗИЯ ЗУБО́В — тиштердин ретрузиясы. Үстүңкү жаактын маңдай тиштеринин ооз көңдөйүнө карай кыйшайып калышы.

РЕЦИ́ДИВ — кайталануу. Айыгып калган оорулардын кайра козголуусу же кайсы бир клиникалык белгилеринин билиниши.

РИНОПЛА́СТИКА — мурундун кемтигин оңдоочу пластикалык операция.

РО́ЖА — тилме. Теринин кызарып сезгенүүсү. Ал жаракаттануудан, аллергиядан жана стрептококктордун таасиринен болот. Беттеги кызыл так дененин температурасынын көтөрүлүшү, ден соолуктун кескин төмөндөшү менен коштолот. Кызыл тактар тилде, маңдайда, кабакта, бетте жана кулак калканында пайда болот.

РОЗЕОЛА — кызыл бүдүр. Ооз ичиндеги былжыр кабыкчада, териде чоңдугу чекиттен чоңураак, басып көргөндө тарап кетүүчү кызыл тактар.

РОТАЦИЯ — айландыруу. Тишти жулганда алды менен ордуан айландырып козгоочу, кыймылдатуучу ыкма.

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ — ооз көндөйү. Тамакты сиңирүү ооз көндөйүнөн башталат. Анын чеги: капталынан уурттар (щеки), алдынан эриндер (губы), үстүнөн тандай (твёрдое нёбо), астынан тил (язык) жана ооз түбү (дно полости рта), артынан тандай пардасы (нёбная занавеска) менен чектелген көндөй. Ооз көндөйү былжыр кабыкча менен капталып, шилекей менен сууланып турат.

РУБЕЦ — берч. Денедө жарадар болгондон кийин пайда болгон берч-тырык. Ал күйүктөн, кесилгенден, ириңдеп айыккан жарадан кийин да болот.

С

САЛИВАЦИЯ — шилекей бөлүнүп чыгуу. Ооз көндөйүндө шилекейдин мааниси өтө зор. Тамак чайналганда шилекейдин жардамы менен боткого айланат да, тамакты сиңирүү үчүн шилекей ферменттери биринчилерден болуп таасир этет. Чыккый шилекей беши туура иштеп турган кезде, шилекей суюк болот, кайсы бир ооруга чалдыгып калса, шилекей коюуланып калат. Кээде шилекей күндөгүдөн көп бөлүнүп калат муну гиперсаливация, ал эми аз бөлүнүп калса, гипосаливация деп аталат.

САНАЦИЯ ПОЛОСТИ РТА — ооз ичин дарылоо. Ооз көндөйүндө жайгашкан: былжыр кабыкчанын, тиштердин, пародонттун ооруларынын алдын алуу, эгер оору бар болсо аны айыктыруу иштерин жүргүзүү.

САНБЕРСТ — санберст. Коронка жана көпүрөчө тиш протездерин куюп жасоодо колдонулат. Курамында 60% алтыны бар кошунду, куюу касиети жогору.

САРКОМА — сөөккө чыгуучу коркунучтуу шишик. Пайда болуу мөөнөтү ар кандай, кээде тез арада, кээде айлап

өсүп олтуруп, коркунучтуу шишикке айланат. Ден соолук тез начарлап, температура денеде көтөрүлүп, лимфа бездерине, өпкөгө, боорго бат тарап кетет. Клиникада ар кандай түрлөрү кезигет: фибросаркома, ангиосаркома, остеосаркома, ретикулосаркома ж. б.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ — кант диабетти (кант оорусу).

Бул оорунун өзгөчөлүгү ооз ичиндеги былжырлуу кабыкча менен пародонттун оорусунда. Айтылган оорулардын өтүшү кант диабетинин оордугуна жараша болот. Пародонтоз оорусу жалаң кант оорусунда кездешет.

СВЕДЕНИЕ (КОНТРАКТУРА) ЧЕЛЮСТЕЙ — жаактардын карышуусу. Мындай учурда адамдын оозу такыр ачылбай же жарым-жартылай гана ачылышы. Себептери: чайноо булчундарынын рефлексстик катып калуусу, чыккый-ылдыйкы жаак муунун катып калышы, берч-тырыктын пайда болушу.

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ — жарык шооласы менен дарылоо.

Стоматологиялык ооруларды инфракызыл жана ультракызылт көк шоола чыгара турган электр лампочкалары менен дарылашат. Ушул эле максат менен гелий, неон, лазер нурлары колдонулат. Сымап-кварц лампочкасы жаак сөөгүндө, пародонт, тиштин этинин ооруларында зат алмашуу процессин жогорулатып, жарадагы микроорганизмдерди өлтүрүп, микроэлементтерди, минералдык туздардын сиңишин жакшыртат. Солюкс лампочкасы таасир эткен жеринин кан айлануусун тездетет, кан канчалык бат айланса, ооруган жер, жара ошончулук бат айыгат.

СВИЦ ДЕСНЕВОЙ — тиштин бүйлөсүнүн ириңдеп тешилиши. Тиштин бүйлөсүнүн астын ириң тээп калганда, ал этти тешип чыгат. Ириңдин пайда болуу себептери: тиштердин периодонтит, пародонтит менен оорушу; чыкпай калган тиштердин сезгенүүсү; жаак сөөгүнүн өнөкөт кулгуна менен оорусунан пайда болгон чириген өлүү ткандардын ириңдеп кетиши.

СВИЩ СЛЮННОЙ — шилекей жолунун тешиги. Шилекей бездеринен же анын түтүктөрүнөн, жолдоруна шилекейдин бөлүнүп турушу.

СЕГАКЕСТ — сегакест. Форма берүүчү фосфаттуу масса, металлдын ар түрдүү куймаларын куюуга мүмкүндүк берет. Германияда чыгарылат.

СЕКВЕСТР — сөөктүн чирип, өзүнчө турганы. Кулгуна оорусунун натыйжасында чириген сөөк сорулуп кетпей, өзүнчө бөлүнүп калгандыктан, ал айланасындагы ткандардан байланышын үзгөндүктөн, өзүнчө бөлүнүп калышы. Бул көбүнчө сөөк сынып, инфекция кошулганда кезигет, кан аркылуу (гемотогенный) дагы болот.

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ — сенсбилизация. Ткандардын, клеткалардын алергенге өтө сезгичтиги. Мындай учурда организм сезимталдыгын арттырат, күчөтөт. Бул абал белокторду бир нече жолу ийне саюу менен алгандан кийин болот.

СЕПСИС СТОМАТОГЕННЫЙ — стоматологиялык сепсис. Стоматологиялык ириндүү булактардан инфекциянын бүт денеге тарап жайылып кетиши.

СЕПСИС ХИРУРГИЧЕСКИЙ — хирургиялык сепсис. Иринди пайда кылуучу жана таратуучу микробдордун операциядан кийин канга кошулуп, жайылып тарашы. Буга асептика жана антисептиканын операция мезгилинде сакталбагандыгынан жана организмдин туруштугунун начарлашы өбөлгө болот.

СЕПТИКОПИЕМИЯ — септикопиемия. Сепсистин бир түрү, ууландыруучу мүнөзү жана ар кайсы органдарда, ткандарда абсцесстердин пайда болушу менен айырмаланат.

СЕПТИЦИЯ — септиция. Кан аралаш ириң бүт денеге таралса деле организмде сезгенүү очоктору болбойт.

СЕПТОКОРД — септокорд. Жасалма коронкаларды (металлакрил, металлкерамика) жасарда тишти туура өгөө үчүн тиштин этинин кырын көтөрүүдө колдонулуучу алюминий жана калий сульфаттары сиңирилген жип. Жоондугу № 0, № 1, № 2 болот. Францияда чыгарылат.

СИЛОАДЕНИТ — шилекей безинин сезгенүүсү. Ооздо инфекция көбөйүп, шилекей бөлүнүп чыгуу процессинин бузулушунан пайда болот. Ооруган жер кызарып, шишип, баскан кезде ооруйт, шилекей аз бөлүнүп чыккандыктан, ооз кургап турат.

СИЛОГРАФИЯ — сиалография. Шилекей бездеринин сөлөкөтүн атайын рентгендик изилдөө менен сүрөткө тартуу.

СИЛОДОХИТ ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ — шилекей безинин башкы өткөөлдөрүнүн тез жана өнөкөт сезгенүүсү, көбүнчө чыккый беги менен жаак алдындагы безде болот.

СИЛОЛИТИАЗ — сиалолитиаз. Шилекей бездерине жана анын өткөөлүнө таш пайда болушу менен мүнөздөлгөн оору.

СИКОР — сикор. Жогорку эстетикалуу жасалма коронкаларды жасоо үчүн стоматологиялык ситалл. Вакуумдуу электр мешинде жогорку температурада 3–4 катмар (базис, дентин, эмаль, айнек) болуп жасалат. Стоматологиялык ситалл «Сикордун» курамында 4 түрдүү А, В, С, D күкүмү болот. Алар өзүнчө дагы бөлүнөт. А₁, А₂, А₃, А₄; В₁, В₂, В₃, В₄; С₁, С₂, С₃, С₄; D₁, D₂, D₃, D₄.

СИЛАУР — силаур. Курамы 75% кремнезёмдун майда тартылган унунан жана 25% автоклавирленген гипстен турат. Силаур № 3-б жана Силаур № 9 деген ат менен чыгарылат. Отко чыдамдуу материал болгондуктан жасалма тиш жана протездин каркасын куят.

СИЛИДОНТ — силидонт. Туруктуу кыттоо үчүн колдонулуучу зат. Физикалык жана химиялык касиеттери боюнча фосфат менен силицинге окшош. Күкүмдүн курамы 80% силицин, 20% фосфат-цементтен турат. Тиш тканына зыяны жок жана тиштин бетине жакшы жабышат.

СИЛИКОНОВЫЕ СЛЁПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — калып алуу үчүн силикон материалдары. Бул массалар ийкемдүү топко кирет. Алар: сизласт — 69, 03, 05, 21 (Украина); эксафлекс, стомафлекс, дентафлекс (Чехия); кольтекс-кольтофлекс (Швейцария); кнетон-ситран, цафо-тевезил, дентасил, силасоф (Германия); ЗМ-экспрес, ЗМ-импринт, конденсационный силикон (Канада) ж. б. кирет.

СИЛИЦИН — силицин. Негизинен мандайкы (кашка, кылкыйма, кичи азуу) тиштерди кыттого арналган зат. Өнү, жылтырактыгы тиштин эмалына окшош. Күкүмдүн курамы кремний кычкылы, алюминий, кальций жана фтордон турат. Суюктугунда фосфор кислотасынын эритиндиси бар.

СИМПТОМ — оорунун белгиси. Мисалы: ооздун ичиндеги былжырлуу кабыкчага ар түрдүү морфологиялык элементтер бөртүп чыгат. Ошолордун ичинен ак тактар лейкоплакияга таандык болсо, жалпак кызыл темирөткүнүн негизги белгиси — майда катуу түйүнчөктөрдүн пайда болушу.

СИМПТОМ БАБОЧКИ — көпөлөк белгиси. Мурундун үстүндө жана бетте көпөлөктүн сөлөкөтүн берген бөртүүлөр.

СИМПТОМ БЕРТОНА — Бертон белгиси. Сатурнизм белгиси: коргошун менен ууланганда астыңкы жаактын тиштеринин бүйлөсүнүн кырында боз кыюунун пайда болушу.

СИМПТОМ БЕХТЕРЕВА — Бехтерев белгиси. Мээ кабынын дүүлүгүүсүндө бет сөөктү тыкылдатып уруп көргөндө баш ооруйт жана беттин булчуңдары жыйрылат.

СИМПТОМ БОУГА — Боуг белгиси. Бала 4–7 жашында туруктуу азуулардын аралыгы 28 мм ден ашпаса, ортодонтиялык дарылоону баштоо керек.

СИМПТОМ ВЕНСАНА — Венсан белгиси. астыңкы жаактын нервинин шишинен же сезгенүүсүнөн астыңкы эрин менен ээктин жансыздануусу, сезүүнүн начарлашы.

СИМПТОМ ВЕСКИ — Вески белгиси. Бүйлөнүн тубаса гипертрофиялык сезгенүүсү.

СИМПТОМ ВИКЕМА (УИКХЕМА) — Викем (Уикхем) белгиси. Кызыл жалпак темирөткүнүн белгиси: майда тордолгон же бөртүктөрдүн бетинде сызыктары менен чектелген грануломатоздун пайда болуусу.

СИМПТОМ ВІЛЛИСА — Виллис белгиси. Беттин нервинин жансызданып, иштебей шал болуп калышынан бетти кан басып кызарышы.

СИМПТОМ ВОЛОСА — чачтын белгиси. Тетраэтилкоргошун жана башка уулуу заттар менен ууланганда оозунда башка нерселер (чач, жип) бардай сезилип, тилдин жана эриндин же колдун жардамы менен алардан кутулуу аракетин жасоо.

СИМПТОМ ГАРЕЛЯ — Гарель белгиси. Гайморит болгондо гаймор кобулундагы электр жарыгын пациенттин сезбеши.

СИМПТОМ ГЕРЕНА — Герен белгиси. Үстүңкү жаактын сынгандыгынын белгиси: оозду чоң ачтырып, негизги сөөктүн канат сымал илмегин сөөмөй менен басканда, оорунун сынган жерге таралуусу.

СИМПТОМ ГЕРКЕ — Герке белгиси. Медиастениттин билинүүсү: оорулуунун башын артка чалкалатканда көкүрөгү ооруп кетет, башты көтөргөндө оору басылат.

СИМПТОМ ГЕТЧИНСОНА — Гетчинсон белгиси. Котон жаранын тубаса белгиси: кашка тиштердин формасы тешкичке окшош жана кесүү кырында жарым айдай кемтик болот.

СИМПТОМ ГИДРОВИБРАЦИОННОГО КОЛЕБАНИЯ — гидровибрация термелүүсүнүн белгиси. Жаак сөөгүндө ичи сууга толгон киста пайда болгондо байкалуучу кубулуш. Киста чонойгон сайын жаак сөөгү жукара берет, ушул мезгилде ага перкуссия жасаганда (чертүү) карама-каршы жакка берилген дирилдөө.

СИМПТОМ ГОВЕРСА — Говерс белгиси. Эринди түйүргөндө бет нерви бузулуп иштебей калган жактагы беттин булчуну иштебейт.

СИМПТОМ ДЮПЮИТРЕНА — Дюпюитрен белгиси. Жаак сөөгүнүн ичинде шишик пайда болгондо альвеола чорчогун басканда сөөктүн кычырашы.

СИМПТОМ ЖИЛЬБЕРО-АНО — Жильберо-Ано белгиси. Боордун өнөкөт оорусунда бетте жана денеде жылдызчага окшош кан тактарынын пайда болушу.

СИМПТОМ КАУФМАНА — Кауфман белгиси. Ириндүү гайморит болгондо былжыр кабыкчанын көчүп калуусунун натыйжасында, ал мурундун орто жолунун полипи деген жаңылышуу болушу мүмкүн.

СИМПТОМ КУПЕРМАНА — Куперман белгиси. Вакеза же эритермия ооруларында байкалат. Ал канды иштеп чыгууга катыша турган сөөк кемиктеринин элементтеринин, жалаң кызыл кан денечелеринин, гемоглобиндин жана тромбоциттин санынын көбөйүшү менен мүнөздөлөт.

СИМПТОМ ЛИБЕРМЕЙСТЕРА — Либермейстер белгиси. Аба эмболиясы болгондо, тилдин жансыздануусу жана тилде агарган тактын пайда болуусу.

СИМПТОМ МАЛЬЧА — Мальч белгиси. Тил астындагы нервдин ядролорунун бузулуусунун натыйжасында темгилдүү келтеде тилди алдыга чыгара албагандык.

СИМПТОМ МАРФАНА — Марфан белгиси. Ич келте оорусунда тилдин учунун үч бурчтуктай болуп кызаруусу.

СИМПТОМ «МАСКИ КЛОУНА» — «Маскарапоздун бет кеби» белгиси. Ыйлаганда беттин нервинин шал болгон жагынын кызарбай турушу.

СИМПТОМ МИРШАНА — Миршан белгиси. Эпидемиялык паротит менен ооругандардын тилине сирке (уксус) сүйкөсө, шилекей чыкканда оорутат.

СИМПТОМ НИКОЛЬСКОГО — Никольский белгиси. Ооздогу былжыр кабыкчанын алдына жыйылган экссудаттын керип жиберилишинен эпителий клеткаларынын өз ара байланышынын үзүлүшү, өзгөрүүсү. Клетка аралык байланыштардын бузулуусунан болот. Аныкташ үчүн гистологиялык изилдөө жүргүзүлөт.

СИМПТОМ «ОЧКОВ» — «көз айнек» белгиси. Жогорку жаак сынганда баш сөөктүн түбү кошо сынса, «көз айнек» белгиси пайда болот, мында көздүн айланасы шишип, кан жайылып, карайып кетет.

СИМПТОМ «РАЗБИТОГО ГОРШКА» — «сынган карапа» белгиси. Кайсы бир себептер менен гаймор көңдөйү

жана бет сөөк травмага учураганда, алардын сөөктөрүнүн сынган-сынбагандыгын аныкташ үчүн колдонулуучу ыкма. Алар сынбаган болсо, тиштерди тыкылдатып урганда үнү таза чыгат, ал эми сынып калган болсо сынган, жарылган карапанын добушундай үн чыгат. Минтип изилдөөнүн себеби адамдын бет териси айрылбаган бүтүн бойдон калат.

СИМПТОМ ТРЕЛЯ — Трель белгиси. Кургак учук оорусунда ооздун ичиндеги жаралардын четинде сары тактардын пайда болушу.

СИМПТОМ ФИЛАТОВА — Филатов белгиси. Кызылчанын башталуу стадиясында ооздун былжыр кабыкчасында ак тактардын пайда болушу.

СИМПТОМ ХЕТЧКОКА — Хетчкок белгиси. Астыңкы жаактын бурчунун оорушу эпидемиялык паротиттин белгиси.

СИМПТОМ «ЩЕЛКАЮЩЕГО» СУСТАВА — «кырсылдаган» муун белгиси. Астыңкы жаакты ары-бери кыймылдатканда кырсылдап турса, анда астыңкы жаак-чыккый мууну өнөкөт артроз, артрозоартрит ооруларына чалдыккандыгынын белгиси.

СИМПТОМ ШМРЕКЕРА — Шмрекер белгиси. Тиштин тамырынын учунда гранулема болуп, жаак сөөгү жок болуп калганда, бармакты ошол жерге коюп, тишти акырын ургуласа, солкулдакты сезет.

СИМПТОМ «ЯЗЫКОВ ПЛАМЕНИ» — «оттун жалыны» белгиси. Балдардын тиши өнөкөт периодонтит оорусуна чалдыкканда байкалат. Тиштин тамырынын учу, жаак сөөгү бүтүндөй сезгенүүгө учураганда ошол тишти рентгенге тартканда оттун жалынына окшош сүрөт көрүнөт.

СИНДРОМ — синдром. Бир ооруну мүнөздөөчү көп белгилердин айкалышы болгондо ушул термин айтылат. Мисалы: Стейнтон-Капдепон синдрому, Бехчет синдрому ж. б.

СИНДРОМ АШЕРА — Ашер синдрому. Көздүн үстүңкү кабагынын шишиши кайталанып турат, эрин калыңдайт, эки кабаттанат, богок болот. Стоматологдор кабатталган эринди операция жолу аркылуу оңдойт.

СИНДРОМ АУРИКУЛО-ТЕМПОРАЛЬНЫЙ — кулакчыкый синдрому. Шилекей безинин сезгенүүсү менен мүнөздөлөт. Ооруган жактын бети шишип, тердеп турат, кол тийгизбей ооруйт.

СИНДРОМ БЕХЧЕТА — Бехчет синдрому. Бул оорунун негизинен үч белгиси бар: ооздун ичиндеги жана жыныс органдарындагы былжыр кабыкчасынын бат-бат кайталап, ыйлаакча басып сезгенип оорушу жана көздүн оорушу (ирит, увеит). Бул оорулар биригип кайталанганда адам өтө катуу жабыркайт. Муну 1937-жылы түрк дерматолог врачы Н. Behcet сыпаттап жазган.

СИНДРОМ «ЗУБНАЯ АНГИНА» — «тиштин басма оорусунун» синдрому. Астыңкы жаактагы акыл азуунун кыйынчылык менен чыгуусунда байкалат, мында жуткунчактын айланасында лимфа бездеринин сезгенүү процесси болот, тамакты чайноо, жутуу кыйын болуп калат.

СИНДРОМ КОСТЕНА — Костен синдрому. Чыкый-астыңкы жаак муунунун катышынын өзгөрүүлөрүнөн кийин боло турган оору. Анын белгиси болуп кулактын ичи ооруйт, начар угат, оору кежигеге, ооз ичиндеги былжыр кабыкчага берилет, тил ысып, ооздун ичи кургап, баш ооруйт, айланат. Бул оору көбүнчө тиштери түшүп калгандарда жана тиштери өтө жешилип кеткендерде болот.

СИНДРОМ ЛЕФЕВРА-ПАПИЙОНА — Лефевр-Папийон синдрому. Синдромдун негизги белгилери: пародонт тканындагы сезгенүүнүн күчөшүнөн тиштердин кыймылдап калышы, тиштин этинин чөнтөкчөлөрү сезгенип, тереңдеп, ирн агышы, мурун кыймылдап турган тиштердин түшүп калышы, алакан менен согончоктун чордонушу жана адамдын көп тердеши.

СИНДРОМ ПЕУТЦА-ТУРЕНА-ЕГЕРСА — Пеутц-Турен-Егерс синдрому. Оору эки түрдүүчө башталат: 1) бетте, ооз ичинде, кычыгында ар кандай формадагы тактардын пайда болушу менен; 2) ашказан-ичегилердин былжыр кабыкчасында өсүктөрдүн пайда болушу менен. Оору атадан балага берилет.

СИНДРОМ ПРИОБРЕТЁННОГО ИММУНОГО ДЕФИЦИТА (СПИД) — алынган иммун жетишсиздигинин синдрому. Табияты вирус болгон жугуштуу оору. Ооруну баштоочу вирус HIV. Ал канга кошулганда Т-лимфоциттик системаны бузуп талкалайт, вирустун таасири клеткадагы Т-хелпер менен Т-киллердин касиеттерин өзгөртүп бузат.

СИНДРОМ РЕЙТОРА — Рейтор синдрому. Оору дененин температурасынын тез көтөрүлүшү менен башталат. Ичеги, муундар сезгенет. Ооз ичинде ыйлаакчалар, жаралар пайда болот. Оору бир нече жумага созулуп грипп, ангина, пневмония, жүрөк ооруларына өтүшүп кетет.

СИНДРОМ РОБЕНА — Робен синдрому. Тубаса болуучу оору, астыңкы жаак жетилбей калат (микрөгения), тилдин начар өсүшү, артка тартылышы (глоссоптоз), баланын тумчугуп калуусуна алып келет. Мындай бала көпкө жашай албайт.

СИНДРОМ РОССОЛИМО-МЕЛЬКЕРСОНА-РОЗЕНТАЛЯ — Россолимо-Мелькерсон-Розенталь синдрому. Беттин нервинин шал болушу жана анын ичкериши, эриндин шишиши жана тилдин катмарланышы менен мүнөздөлгөн оору. Катмарлануу ооз ичине жана бетке да тарашы мүмкүн, себеби — тукум куучулук жана жугуштуу — аллергиялык фактор.

СИНДРОМ СТЕЙНТОНО-КАПДЕПОНА — Стейнтон-Капдепон синдрому. Дентин менен эмалдын тубаса өрчүбөй калышы. Биринчи болуп Капдепон изилдеген. Тиштин коронкасынын сырткы катмарынын оорусу. Мында тиштин коронкасынын эмаль, дентин катмарлары эзилди, кыйшык, кыңыр болуп калат. Эмаль катмары жок болгон учурда дентин гана көрүнүп, тиш күрөң түстө болот.

СИНДРОМ СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА — Стивенс-Жонсон синдрому. Оору күтүлбөгөн жерден, курч түрдө дененин ысышы менен башталат. Алды менен көздөр ооруйт, чел кабык баскан сезим пайда болот, териде ар кандай темгилдер, бүртүкчөлөр, ыйлаакчалар пайда болот. Ооз ичиндеги былжыр кабыкчага дагы ар түрдүү бүртүкчөлөр, ыйлаакчалар чыгат да, алар бат эле жарылып, сөл аралаш кан

чыгат, бетинде кабыкча пайда болуп, өтө сасыган жыт чыгат. Ириң чыгуу жыныс органдарында дагы болот.

СИНДРОМ СЛЮДЕРА — Слюдер синдрому. Канат-таңдай нерв түйүнүн оорусу (невралгиясы). Жогорку жаакта, таңдайда, жогорку жаактын тиштеринин эттеринде, гаймор көңдөйүнүн дубалдарында, көздөрдө, кулактарда күйгүзүп тургандай, тарткандай катуу оорунун дайыма болушу. Адам шамалдагандай чүчкүрүп, көзүнөн жаш агып, бети шишигенсип, башы айланып, тумчугат.

СИНДРОМ ТАКАХАРЫ — Такахара синдрому. Каталаза ферментинин тубаса аз болушунан пародонтоздун зыяндуу өрчүп, өтүшүп кетиши, тиштин этинин былжырлуу кабыкча-сынын чирип, тиштердин бошоп, түшүп калышы менен мүнөздөлөт.

СИНДРОМ ФЛОРИКА-ЛОБШТЕЙНА — Флорик-Лобштейн синдрому. Тиштердин көлөмү жана формасы туура, өңү өтө тунук болот. Бир эле кишинин тиштеринин өңү ар кандай болуп, маңдайкы тиштер менен биринчи азуу тиштер башкаларга караганда көбүрөөк жешилет. Дентин катмары начар минералдашат, эмаль менен сапатсыз биригет.

СИНДРОМ ШЕГРЕНА — Шегрен синдрому. Мурундун, тамактын, ооздун, былжыр кабыкчаларынын кургап турушу, шилекей бездеринин чоңоюшу, шилекей, тер, жаштын аз бөлүнүп чыгышы, тиштерде кариестин өтө көп болушу менен мүнөздөлөт. Бул оору менен көбүнчө аялзат ооруйт.

СИНЕРЕЗИС — синерезис. Тиштерден калып алууда колдонулуучу ийкемдүү массалардын ичинен альгинат массасы чоң топту түзөт. Альгинат массасы сууга аралаштырылат, калып алгандан кийин, жуккан шилекейди сууга жууп, бат модель куюу керек. Тез куйбаса сууга аралаштырылган массанын суусу бууланып кетип, масса сыгылып, жыйрылып, кичирейип калат да, андан жасалган жасалма тиш (каптама, кийме протездери) тишке же кийме тиштин ордуна туура келбей калат. Ошондуктан калыпты алгандан кийин дароо куюуга кол тийбесе, 10–15 мүнөткө сууга салып коюу керек.

СИНОВИТ — синовит. Чыкый-ылдыйкы жаак муунун синовиалдык катмарынын сезгенүүсүнөн улам суюктуктун көп бөлүнүп чыгуусу.

СИОЛИТ — сиолит. Алтындын куймасын куюу үчүн форма алуучу материал. Күкүмдөн жана суюктуктан турат. Күкүмү кварц, фосфат жана магнийдин окисинен турат. Суюктугу – силикозоль.

СИСТЕМА ДИГИДЕНТ — Дигидент системасы. Жасалма каптаманы жана көпүрө сымал тиштин каркасын алтындан, титандан, керамикадан жана пластмассадан компьютердин жардамында фрезалоо жана жылмалоо жолу менен жасоо.

СИСТЕМА РУМПЕЛЯ — Румпель системасы. Доголуу тиш протезин жасаганда алды менен таянуучу тиштерге жасалма коронка жасап, алардын ортосуна металлдан тосунду (штанга) ширетип, анын үстүнө доголуу протезди коёт.

СИТАЛЛЫ — ситаллдар. Айнек сымал фазасында тегиз бөлүштүрүлгөн бир же бир нече кристаллдык фазалардан турган айнек кристаллдык материал. Союз учурунда А. А. Седунов (Алматы), В. Ю. Курляндский, В. Н. Копейкиндин (Москва) жетекчилиги астында ортопедиялык стоматологияда колдонуу иштелип чыккан. Муну айнек керамика (стеклокерамика) деп да айтышат.

СИФИЛИС — котон жара. Бул оору болгондо бүтүндөй денени начарлатып оорута турган өнөкөт, жугуштуу жара. Бул оорунун козгогучу — ак трепанема. Котон жаранын, мерездин биринчи белгиси — (стадиясы) эринге нык тыгыз шанкр (ириндүү жара) чыгышы. Ал 6–7 жумадан кийин байкалат. Тыгыз шанкрдын түбү тегерек, бетинде катмары жок, өңү кызыл этке окшош болуп, кармап көргөндө кемирчекке окшоп катуу. Жаранын экинчи белгисинде ооздун ичине бөрткөн темгилдер чыгат, түйүндөр пайда болот. Котон жаранын үчүнчү стадиясында ооз ичинде жана башка органдарда томпойгон катуу дөмпөктөр пайда болот. Үчүнчү белгисине жеткенде бул жара өтө жугуштуу.

СКАЛЕР — скалер. Тиштин этинин үстүндөгү ташын тазалоочу аспап. Анын жумушчу учу курч болот.

СКАРИФИКАЦИОННО-ПЛЁНОЧНЫЙ ТЕСТ — чийме-тасмалуу аныктоо. Билектин терисине ийне менен узундугу 10 см болгондой кылып чийип, туздардын (никель хлориди NiCl_2 , 5% кобальт нитраты $\text{Co}(\text{No}_3)_3$, 0,5% калий хроматы $\text{K}_2\text{Cl}_2\text{O}_7$) спирттеги эритиндисин сызыктардын бетине сүйкөп тасма менен жаап коюу керек. Тасма катары медициналык БФ желими колдонулат. 48 сааттан кийин караганда кызарганы, шишигени бары-жогуна карай маани берилет. Эгерде адамга ушул эритиндилердеги элементтер жакпаса, анда тери кызарат. Кызаруу денгээли төмөнкүдөй белгиленет: (+) — 5 мм ге чейин кызаруу (эритема); (++) — тери шишимек тартып, 5 мм ге чейин кызарат; (+++) — тери көөп, шишип 10 мм ге чейин кызарат; (++++) — тери шишип, 20 мм ге чейин кызарат.

СКАРЛАТИНА — скарлатина. Скарлатина менен көбүнчө балдар ооруйт. Бети, денеси кызарат, оозунун ичи кыпкызыл болуп, шишип, денеси ысыйт. Денесин кызыл бүдүр дөмпөк басат да, 5–6 күндөн кийин жок болуп кетет.

СЛЁПОК (ОТГИСК) — калып. Тиштердин, жаактагы жасалма тиш орношуучу аймактын жана ага жакын жайгашкан жумшак ткандардын тескери көчүрмөсү. Жасалма тиштердин ар кандай конструкцияларын жасаганда алды менен ошол жердин калыбы алынат. Калып негизги же жумушчу жана жардамчы деп аталат. Ошондой эле калып анатомиялык жана функциялык болот. Ортодонтия ишинде көзөмөл калып алынат. Бул ортодонтиялык дарылоого чейин туура эместик кандай эле, дарылоонун жүрүшүндө кандай жана дарылануу бүткөндөн кийин кандай болду деп салыштырып көрүүгө мүмкүндүк берет.

СЛЮНА́ — шилекей. Шилекей үч түрдүү бездерден (чыккый жанынан, тилдин астынан, жаак астынан) чыга турган суюктук. Шилекейдин суутек көрсөткүчү — рН 6,9–7,0 аралыгында, курамында органикалык жана органикалык эмес заттар бар.

СЛЮНОКА́МЕННАЯ БОЛÉЗНЬ — шилекей таш оорусу. Шилекей безинде таштардын пайда болушу.

СМЕННЫЙ ПРИКУС — тиштердин алмашуу прикусу. Бул мезгил баланын 5,5–6 жашынан 13 жашына чейин созулат. Мында сүт тиштер туруктуу тиштер менен алмашып бүтөт.

СМЕСЬ НИКИФОРОВА — Никифоров аралашмасы. Цитологиялык (клеткалык) изилдөөлөрдө, жалаң биопсияга керектелүүчү фарфор идиш-аспаптарды майсыздандыруу үчүн бирдей сандагы спирт менен эфирдин аралашмасынын эритиндиси.

СМЕСЬ ФЕНОЛ-ФОРМАЛИНОВАЯ — фенол-формалин аралашмасы. Тиштер узакка созулган периодонтитти дарылоодо фенол-формалин эритиндиси (40% формалиндин бир тамчысына фенолдун эки тамчысын) колдонулат.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ — бириктирүүчү ткань. Бириктирүүчү ткандын курамына клеткалардын ар кандай түрлөрү (фибробласттар, гистиоциттер ж. б.), клетка аралык заттар (мукополисахариддер, гексозаминдер ж. б.) жана талчалар кирет.

СОЛИТЭР — солитэр. Жарыкта катуучу, фтор бөлүп чыгаруучу кыттоо үчүн материал.

СОСКОБ — кырынды. Кырып алуу ыкмасы стоматологиялык изилдөөлөрдө цитологиялык аныктоо үчүн колдонулат. Кээ бир учурда изилденүү ткань теренинде болсо, андан да кырып алынат.

СОСТОЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЯ — физиологиялык тынчуунун салыштырма абалы. Мында чайноо булчундары минималдык тонушта жана ымдоо булчундары толук бош болот, астыңкы жаак эркин салаңдап турат.

СПЛАВ КОБАЛЬТО-ХРОМОВЫЙ — кобальт-хром куймасы. Бул эритиндиден доголуу жасалма тиш, жасалма каптама, илмектер, фарфор каптамалардын калпакчалары куюлат. Курамына кобальт, хромдон башка молибден, никель кирет, ооз ичиндеги ткандарга зыяны жок.

СПЛАВ ЛЕГКОПЛАВКИЙ — оңой эрий турган куймалар. Курамына коргошун, висмут, калай жана кадмий кирет, эрүү температурасы 90°Снан ашпайт. Жасалма капта-

маларды жана башка жасалма тиштин бөлүктөрүн жасоого жардамдаша турган эритме.

СПЛАВ МЕЛЛОТА — Меллот куймасы. Женил эрүүчү металл куймасы, курамында калай, коргошун, висмут, кадмий бар. Эрүү температурасы 63° – 115° С. Жасалма коронкаларды жасоодо өтө керек кошулма.

СПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ — металлдардын куймалары. Эки же андан көп металлдарды эриткенде жаңы касиеттерге ээ жаңы кошунду пайда болот.

СПЛАВЫ РТУТИ — сымаптын куймалары. Сымаптын башка металлдар менен ар кандай кошундусу тиш кыттоо үчүн амальгаманы түзөт. Сымап натрий, калий, күмүш жана алтын менен оңой кошулат. Стоматологияда тишке кыт коюш үчүн жездин жана күмүштүн кошундулары колдонулат. Сымап өтө уулуу зат, ал жүрөккө, бөйрөккө, ичегилерге катуу таасир этет, ооздун былжыр кабыкчасын сезгентет.

СПЛАВЫ СЕРЕБРЯНО-ПАЛЛАДИЕВЫЕ — күмүш-палладий куймалары. Ал кымбат баалуу эритмеге кирет. Курамы 25% палладийден калганы күмүштөн турат жана дагы башка анча мынча кошулмалары бар. Бул куймалардан жасалма каптама, көпүрө сымал жасалма тиштерди жасоого болот. Эрүү температурасы 1040° С. ПД-250, ПД-190, ПД-140 деген белгилери бар.

СПОНТАННЫЙ — өзүнөн өзү. Сырткы таасирлерден эмес, ички себептердин улам оорунун өзүнөн өзү эле тез пайда болуусу.

СПОРИЦИДИН — споридин. Тиш протездерин жасарда ооздон алынган калыптарды дезинфекциялоочу аэрозоль.

СПРЕДЕР — спредер. Тиштин тамырындагы каптал каналдарды конденсациялоодо колдонулуучу кол менен иштетилүүчү аспап.

ССАДИНА — жоор, сүрүлгөн жер. Кийме тиш протезин жасаганда, алгачкы күндөрү протездин ашыкча кырлары былжыр кабыкчаны оорутат. Протезди алып көргөндө ошол жерлер кызарып, канталап калат.

СТАБИЛИЗАТОРЫ — стабилизаторлор. Полимердин эскирүүсүнө тоскоол болуучу заттар.

СТАБИЛОР — стабилор. Алтын менен палладийдин өтө катуу куймасы, анын СТАБИЛОР G жана СТАБИЛОР GL деген түрлөрү болот. Алардан каптама жана көпүрө сымал жасалма тиш жасалат. АКШда чыгарылат.

СТАДОНТ — стадонт. Тиштер пародонтит, пародонтоз болгон кезде шакшак катары колдонулуучу турган бат ката турган акрил пластмассасы.

СТАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ — чайноонун натыйжалуулугун аныктоонун статикалык ыкмалары. Тиштин чайноо жөндөмдүүлүгүн аныктоо үчүн Дюшанз, Вустров, Мамлок, Пиккереиль, Агапов, Оксман ар бир тишке көлөмүнө жараша бирдик ыйгарган. Алар тиштин абалына маани берген эмес, тиш катуу, жакшы турабы же ал бошоп, кыймылдап, түшкөнү калдыбы, баары бир ошол бирдикке ээ боло берген. Бул туура эмес, жакшы тиш кызматты жакшы аткарат, бошогон тиш кызматын аткара албайт. Ушуга байланыштуу В. Ю. Курляндский статикалык ыкма менен аныктоочу, бирок тиштин жакшы абалын жана биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы начарлаган, бошогон абалын эске алуучу одонтопародонтограмманы сунуш кылган. Бул ыкма клиникага өтө жакын ыкма болуп эсептелет жана динамикалык өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

СТЕЙПУТ — стейпут. Фарфордон, металлкерамикадан жасалма коронкаларды жасоодо тиштин этинин кырын көтөрүү керек. Ошондо тиштин бүйлөсүнүн кырынын астына коюп, аны көтөрүү үчүн колдонулуучу ичине өтө ичке жез зым кошуп өрүлгөн жип.

СТЕР-ВАСК (СТЕП-БЭК) МЕТОДИКА — степ-бэк ыкмасы. Тиштин тар каналын кеңейтүү ыкмасы.

СТЕРИЛИЗАТОРЫ — стерилдегичтер. Медициналык инструменттерди, аспаптарды сууда кайнатып стерилдөө үчүн курал.

СТИРАНИЕ ЗУБОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ — тиштердин физиологиялык жана патологиялык жешилүүсү. Тиштер өмүр бою жешилиши керек. Эгерде жешилүү эмаль катмарынын денгээлинде болсо, аны физиологиялык, ал эми дентин катмарынын денгээлинде болсо, патологиялык жешилүү деп аташат. Патологиялык жешилүүнүн белгиси – тиштердин чайноо бетинде күрөң тактардын, аянтчалардын пайда болушу.

СТИРАЕМОСТЬ ЗУБОВ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ — тиштердин функциялык жешилүүсү. Тиштердин катуу тканыннын табигый жешилүүсү тиштөө, чайноо бетинде жана каптал жагынан болот, ошондо ал жерлердеги тийишүү бетине таандык тегиздик пайда болот. Ушунун натыйжасында орто жашап калган кишилердин тиштеринин катары 1 см ге кыскарат. Кылкыйма, кичи жана чоң азуулардын дөмпөкчөлөрү жешилип, тегизделип калат.

СТОЙКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ — дат басууга туруктуулук. Материалдын дат басууга каршылык көргөзүү жөндөмдүүлүгү.

СТОЛБНЯК — селейме. Тарамыш тартылып зыңкыйып калма оору, жугуштуу, тез өтөт. Оорунун коздургучу селейме таякчасы, ал жанчылган, закымдалган жерге түшүп, ооруну коздурат. Ооруган адам оозун ача албайт чайноо, мимика жасоого катышуучу булчундардын кыймыл-аракети токтоп калат. Кээде адамдын оозун ачууга аракет жасаганда жаак сөөгү, тиштери сынып кетиши мүмкүн.

СТОМАДЕНТ — стомадент. Акыркы убакта чыгарылган химиялык жол менен катуучу, тиштерге кыт коюу үчүн композициялык материал. КОМПОДЕНТ, КОНСАЙЗ, ЭВИ-ЭКРОД ИЗОПАСТ, СИЛАР ж. б. массалардын кызматы да ушундай эле.

СТОМ-АКРИЛ — стом-акрил. Кийме протездерге негиз жасоо үчүн жаңы пластмасса.

СТОМАЛЬГИН — стомальгин. Кийме же туруктуу жасалма тиш протездерин жасаганда алардын калыбын алуу үчүн жумшак ийкемдүү материал.

СТОМАТИТ — оозул. Ооз ичиндеги былжырлуу кабыктын сезгенүүсү. Сезгенүүгө биринчиден жергиликтүү факторлор (начар жасалган тиш протездери, жаман коюлган кыттар ж. б.) таасир этсе, экинчи жагынан ички органдардын оорулары (ашказан, ичеги, боор ж. б.), аллергиялык таасир этүүлөр оозулдун пайда болушуна шарт түзөт.

СТОМАТИТЫ АКРИЛОВЫЕ — акрил оозулу. Акрил пластмассасынан пайда болгон оозул. Кийме тиштин негизинде пластмассанын мономер илчөмдөн көп болсо же ошол тишти кайнатып бышырганда технологиянын бузулушунан мономер толук иштелбесе, былжырлуу кабыкка зыянын тийгизип, ооз көңдөйүнүн оорусуна алып келет.

СТОМАТИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ — аллергиялык оозул. Ар түрдүү аллергендерден (микробдордон, дары-дармектен, тамактан, өсүмдүктөрдөн ж. б.) аз-аздан сезгичтиги көбөйүп (сенсбилизация), дененин сезимталдыгы жогорулап отуруп, оору күчөгөндө, ал ооз ичинде биринчилерден болуп билинет, оозул күчөйт. Сезгенүүнүн ар түрдүү (полиморфизм) белгилери көрүнөт: кызаруу, темгилдер, ыйлаакчалар, жаралар, кан тамыр жарылып, кан уюулар тез-тез пайда болот.

СТОМАТИТ ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ — ыйлаакчалуу оозул. Ооздун тегерегинде, эринде, ооздун ичинде чыбырчыктар пайда болуп, алар жарылып кызарган илдет. Оорунун себепкери вирус болгондуктан, ал жугуштуу.

СТОМАТИТ ГОНОРЕЙНЫЙ — сүзөк оозулу. Адамдын жыныс мүчөсүнүн жолун сезгентүүчү жугуштуу оору — сүзөк. Бул дартка гонококк микробу себепкер болот. Мына ошондо гонококк жумшак таңдайды, тилдин үстүнүн ортосун, тилдин чектөөчүсүн жана төмөнкү эринди сезгендирет, оозул пайда кылат.

СТОМАТИТ ГРИБКОВЫЙ — козу-карын оозулу. Адам ооруганда антибиотикти көп сайгандан, ичкенден ооз көңдөйүндөгү микрофлоранын тең салмактуулугу бузулат, кортикостероиддерди артыкча иштетүү дененин каршылык көрсөтүү күчүн начарлатат, дагы башка себептердин натыйжасында кандидоз оорусу пайда болот. Ооздун былжырлуу

кабыкчасына кан уюйт, эрин, уурт, тилдин бетинде өзгөчө ак тактар пайда болот. Оору күчөгөндө тиштин эти бат-бат канап, жарага айланат.

СТОМАТИТ КУРЬЛЬЩИКОВ — тамеки тарткандардын оозулу. Ооздун былжырлуу кабыкчасынын никотиндин таасиринин натыйжасында сезгенүүсү. Мында эриндин, ууртгун былжыр кабыкчасы кызыл-көк тартып, эпителий катмары бозоңкурап турат.

СТОМАТИТ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ — дары-дармектин оозулу. Кабыл алган дары-дармектин кээ бирөөсүнүн жаппаганынан дененин сезимталдыгы артып, ооз ичиндеги былжырлуу кабыкчада майда-майда бөрткөн дөңчөлөр, ыйлаакчалар, жаралар, ак тактар пайда болот. Бул айрыкча йод, новокаин, сульфаниламид, антибиотиктерди (тетрациклин тобу), кабыл алганда, иштеткенде пайда болот, бирок эмнеден экенин так аныктоо кыйынга турат.

СТОМАТИТ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ — суу чечек оозулу. Вирустун таралышынан болгон өтө жугуштуу дарт. Денеге исиркектер пайда болот, кабырчыктанат. Ооз ичиндеги былжырлуу кабыкчада ыйлаакчалар жарылып, төгөрөктөнүп, канап, оюк жарага айланат.

СТОМАТИТ ПРИ КӨРИ — кызамык оозулу. Кызамык вирусу денеге өткөндөн кийин эле ооз эпителийи бузула баштайт, бала кызамык менен оорудан 1–3 күн мурун ууртунун ичинде көлөмү жарым миллиметрге жеткен тегереги кызыл ак тактар (исиркектер) пайда болот да, былжыр кабыкчанын бети сыйрылып түшөт.

СТОМАТИТ ПРИ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ — лимфолейкоз оозулу. Лимфолейкоздо жаак астындагы, колтуктагы ж. б. без түйүндөрү чоңоюп, тиштин эти, ооз былжыр кабыкчасы сезгенип, анан чирий баштайт. Диагноз кандын жалпы анализи аркылуу аныкталат.

СТОМАТИТ ПРИ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИИ — лейкемия оозулу. Бул мезгилде адам алсызданат, көк боор ооруйт, дене бир аз гана ысыйт, кандын курамы өзгөрүлөт. Ооздун былжырлуу кабыкчасы бозоруп, тиштин эти канап, чирийт (некроз), чирик жаак сөөккө жетет. Денени исиркек басат.

СТОМАТИТ ПРИ ПЕЛЛАГРЕ — пеллагра оозулу. Бул оору денеге РР (никотин кислотасы) витамини жетишпегендиктен пайда болуучу оору. Ооруган мезгилде ууртта, тандайда жана тиштин бүйлөсүндө ыйлаакчалар пайда болот, алар жарылып, ооруткан жара болот, эрин тилинип кургайт, тил шишип, капталдарында тиштердин издери калат.

СТОМАТИТ РТУТНЫЙ — сымап оозулу. Көп убакыт бою сымаптын буусу денеге таасир эткенде пайда болот. Ууланган адамдын башы ооруйт, уйкусу келип, бат чарчайт. Мындай убакытта тиштин эти канап, тил ооруп, шилекей көп бөлүнүп чыгат, ооздун ичинин темир даамданганы кетпейт. Акыл азуунун арткы жагындагы жана маңдайкы тиштердин былжырлуу кабыкчасы бат-бат ооруп турат. Тиштин этинин кыры кара күрөң болуп, ооздон жагымсыз жыт чыгат.

СТОМАТИТ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ — чирик-жара оозулу. Ооз көндөйүндө жана тамактын катмарларында боло турган оору. Урчукка окшош спирохета бактериялары пайда кылат. Ууртта, тиштин бүйлөсүндө, тандайда кездешүүчү дарт. Сары түстөгү тактар пайда болуп, акырындап былжырлуу кабыкчаны чиритип, сөөккө, булчун этке чейин жетет.

СТОМАТОЛОГ — стоматолог. Бул сөз гректин эки сөзүнөн алынган (стома – ооз, логос – окуу, илим). Тиштин, ооз көндөйүнүн жана жаак системасынын органдарынын ооруларынын себептерин билип, аларды дарылап жана ооруну болтурбоо үчүн алдын алуу маселелери боюнча кызмат көрсөтүүчү адис-врач.

СТОМАТОЛОГ, ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЕ СИДЯ — стоматологдун жумушту олтуруп иштөөсү. Жумушту отуруп иштегенде натыйжалуулук артат, албетте, буга көңүш керек. Дайыма олтуруп иштөө терс натыйжага да жеткириши мүмкүн. Жакшысы иш убактысынын 70%ында олтуруп иштеген, ал эми 30%ында туруп иштеген дурус. Дайыма олтуруп иштеген адамда бүкүрлүк (кифоз) пайда болушу мүмкүн.

СТОМАТОЛОГ, ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЕ СТОЯ — стоматологдун жумушту туруп иштөөсү. Иштеп жатканда дайыма туруп турганда буттарга салмак көп түшөт. Көбүнчө бир жакка кыйшайып иштегендиктен, омурткалар кыйшайып (сколиоз) болушу ыктымал, ошондой эле буттагы көк кан тамырларынын оорулары (варикоз, тромбофлебит) да пайда болушу мүмкүн.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕМЕНТЫ — стоматологиялык цементтер. Булар тиштин өзөгүн сактоодо, убактылуу кыттоодо, жасалма тиштерди цементтөөдө колдонулат. Алар эки топко бөлүнөт: минералдуу жана полимерлүү. Минералдууларга цинк-фосфаттуу, силикаттуу, силикофосфаттуу, ал эми полимерлүүгө поликарбонаттуу, айнекиномерлүүлөр кирет. Цементтер көбүнчө күкүмдөн жана суюктуктан турат.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО — стоматологиялык күзгү. Ооз ичин көрүү жана дарылоо ишинде керектелүүчү аспап. Эки бөлүктөн турат: күзгүдөн жана туткасынан.

СТОМАТОСКОП — стоматоскоп. Ооз көңдөйүндөгү былжырлуу кабыкчаны бир нече эсе чоңойтуп көрсөтө турган оптикалык аспап. Бул аспап менен оорунун түрүн изилдеп аныктоого жана дарылоонун натыйжасы канчалык экенин билүүгө болот.

СТРУКТУР — структур. Бат катуучу пластмассанын жаңы түрү, каткандан кийин жакшы жалтырайт, күкүм жана суюктуктан турат. Германияда чыгарылат.

СТРУКТУР-2 — структур-2. Жарык менен катуучу эки пастадан турган пластмасса комплекти. Убактылуу жасалма каптама, көпүрө сымал жасалма тиш жана кыпчык (вкладка) жасоодо колдонулат, шприцте жана картрижде чыгарылат: U — универсалдуу, Y — сары, L — агыш түстө болот. Германияда чыгарылат.

СУПЕРПАЛ — суперпал. Эң биринчи Россияда чыгарылган алтын-палладий эритиндиси, металл-керамикалык тиш протездерин жасаганда калпакча үчүн колдонулат. Ку-

рамында 60% палладий, 10% алтын бар. Россиялык патент менен коргоулуп, эл аралык стандартка жооп берет.

СҮПЕР ТЗ — супер ТЗ (өтө катуу алтын). Эритиндисинде 75% алтыны бар, өтө катуу алтын, сары түстөгү жасалма каптама, көпүрө сымал жасалма тишти жасоого болот, акупунктура ишинде колдонулуучу ийнелерди да жасашат. Бул эритиндиге цинк кошулуп даярдалат. Россияда чыгарылат.

СҮПРА СТОУН — супра стоун. Өтө катуу гипс, катуу мөөнөтү 8–10 мүнөт, катуу мезгилинде кеңейүүсү 0,07–0,09%, бекемдиги каткандан кийин 35–60 н/мм².

СШИВАГЕНТЫ — сшивагенттер. Полимер материалдарынын катуулугун жогорулатуу үчүн макромолекулалардын ортосуна туурасынан байланыш түзөт.

СШИВКА — бириктирүү, кураштыруу. Полимер материалдарын бекемдөө үчүн макромолекулалардын сызык аралык байланышын түзүп, бириктирүү.

СЫПЬ — күдүрөйгөн темгил. Денеге чыккан темгилдер кайсы бир оорунун биринчи белгиси болуп эсептелет.

Т

ТАБ-2000 — таб-2000. Бат катуучу акрил пластмасса-сы, убактылуу каптама, көпүрө сымал жасалма тиш жасодо колдонулат. Үч түстө болот: ак, сары, боз. АКШда чыгарылат.

Т-активин, тимагэн, тималин — Т-активин, тимаген, тималин. Бул дарылар жалпы иммунитетти көтөрүп, ооз ичинде оорулар пайда болгондо, жергиликтүү иммунитетти жогорулатып, айыгууга шарт түзөт.

ТАМПОН — тыгын. Тиш жулунгандан кийин, жарадан аккан канды токтотуу үчүн колдонула турган дакиден же кебезден жасалган тоголок тыгын. Ошондой эле ушундай тампонду тиш дарылаганда, каптаманы цементке койгондо тиштердин катары боюнча коюп, шилекейден арылтат.

ТА́РГИС — таргис. Керомер тобуна кирүүчү, жарык менен катуучу паста сымал материал. 20 түстө. Лихтенштейнде чыгарылат.

ТАУРОДОНТИЯ — тауродонтия. Тиштин өзөгүндөгү одонтобласттардын начар иштешинин натыйжасында пайда болуучу оору. Тиштер бошоп, кыймылдап, каналдары кеңейип, дентин катмарына зыян келтирилет.

ТВЕРДОСПЛА́ВНЫЕ БО́РЫ — катуу кошулмадан жасалган борлор. Дат баспоочу болоттон жасалган каптамаларды (коронкалар), көпүрө сымал жасалма тишти ооздун ичинен кесип алууда керектелүүчү аспап. Аны менен тиштерди, жасалма тишти өгөсө да болот.

ТВЁ́РДОСТЬ — катуулук. Металлга же анын кошундусуна башка катуу металлды киргизгендеги каршылыгы.

ТВЁ́РДЫЕ СЛЕ́ПОЧНЫЕ МАТЕРИА́ЛЫ — калып алуу үчүн катуу материалдар. Бул топ гипс жана цинксидэвгенол массаларын бириктирет. Акыркы топко дентол, дентол-С (Украина), репин (Чехия) ж. б. материалдар кирет.

ТЕКУ́ЧЕСТЬ — агуу. Ар кандай материалдардын агуучулук касиетинин аркасында кандайдыр бир көлөмдү толтуруу.

ТЕЛА́ ИНОРО́ДНЫЕ — бөтөк, жат заттар. Тиштин көндөйүндө, каналында, жаак сөөгүнүн ичинде ар кандай бөтөн нерселердин: ийне, темир, айнек, таш, жыгач ж. б. туруп калышы. Кээде бөтөн заттар кошулма ткань менен биригип калат. Башка учурда алды менен ириң чыгып отуруп, анан бөтөн затты ириң тээп чыгат.

ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРА́ФИЯ — телерентгенография. Аралыктагы рентгенография, ортодонтиядагы изилдөөлөрдө колдонуу ыкмасы. Бет сөөктөрүнүн өсүү өзгөчөлүктөрүн, үстүнкү жана астыңкы жаактардын катышын жана алардын баш сөөгүнүн башка сөөктөрү менен болгон катышын аныктоо үчүн жана ортодонтиялык дарылоонун натыйжалуулугун билүү үчүн колдонулат.

ТЕЛЕСКОПИ́ЧЕСКИЕ КОРО́НКИ — телескоптук коронкалар. Жөнөкөйлөтүп айтканда булар ички жана тышкы деп аталган эки каптамадан турат. Биринчиси таянып тура

турган тишке орнотулат, формасы цилиндрдей болот, экинчиси тиштин анатомиясындай болуп, кийме тишке жабыштырылат.

ТЕЛО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА — көпүрө сымал жасалма тиштин тулкусу. Таянып туруучу жасалма каптамалардын ортосундагы тиш жок жерди толуктап, коронкаларга ширетилип турган бөлүк. Ал аралык бөлүк деп да аталат.

ТЕМДЕНТ — темдент. Убактылуу каптамаларды (коронкаларды) жана көпүрө сымал жасалма тиштерди жасодо колдонулуучу материал. Германияда чыгарылат.

ТЕМП БОНД NE — темп бонд NE. Убактылуу коюлган жасалма каптама жана көпүрө сымал жасалма тишти жабыштыруу үчүн колдонулуучу цемент. Курамында эвгенолу бар. АКШда чыгарылат.

ТЕМПРОН — темпрон. Ооздон убактылуу алынбоочу жасалма тишти жасоо үчүн бат катуучу, күкүм жана суюктуктан турган пластмасса. Японияда чыгарылат.

ТЕНИТ — тенит. Жабышкак мом, тиш протездеринин конструкциясынын ар кандай бөлүктөрүн бириктирүүдө колдонулат. Гипске, металлга, пластмассага жакшы жабышат. Жогорку ысыктыкта күлү жок күйүп кетет. Японияда чыгарылат.

ТЕРАТОМА — түйүн. Туура эмес өсүүдөн келип чыккан шишик. Сыртынан караганда кистага окшошуп кетет.

ТЕРМИНАТОР — терминатор. Стоматологиялык аспаптарды басым менен дезинфекция жасоочу атайын аспап. Швейцарияда чыгарылат.

ТЕРМОДИАГНОСТИКА — термодиагностика. Тиштин өзөгүнүн өлүү же тирүү экенин ысык же муздак сууну тамызып билүү ыкмасы. Өзөгү жок же өлүү болсо ысык-суукка маани бербейт. Соо тиштер +50°C температурадан жогорку ысыкты, 0°C температурадагы суукту сезет.

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — ысытканда жумшаруучу калып алуу үчүн материалдар. Калып алардын алдында мындай массаларды ысык сууга салып жумшартат, ченкепке салып оозго койгондо катат.

Бул топко гуттаперча, стенс-02, акродент-02, стомапласт, ортокор, дентафоль, Вайнштейндин 1, 2, 3, 5 массалары, мом, Гербстин, Кругляковдун массалары (СССР), икзет (АКШ), ксантиген (Германия) ж. б. көп материалдар кирет.

ТЕРМОСКОП — термоскоп. Жогорку ысыктыкка чыдамдуу атайын паста. Доголуу тиштин металл догосу сынып калганда аны ширетсе болот, бирок жакын жайгашкан пластмасса тиш же негиз күйүп кетиши мүмкүн. Эгерде аларды термоскоп менен шыбап, жаап койсо, анда аларга ысык өтпөй, күйбөй калат. Германияда чыгарылат.

ТЕСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ СЛЮНЫ — шилекейдин ферментинин активдүүлүгүн аныктоо. Акрил пластмассасынын уулуулугу биохимиялык анализ аркылуу шилекейдеги ферменттердин активдүүлүгүнүн өзгөрүшүнө карай аныкталат. Жегич фосфатаза, лактатдегидрогеназанын активдүүлүгү 2–4 эсе жогорулайт, ал эми кычкыл фосфатазанын активдүүлүгү төмөндөйт.

ТЕСТ ХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ АКРИЛОВОГО ПРОТЕЗА — химиялык ыкма аркылуу акрил протездин бетин күмүш менен каптоо. Кийме тиштин акрил пластмассасынан жасалган негизиндеги пластмассанын мономерин пациентти кыйнаганда (ачыштырат, күйгүзөт, оорутат, шишитет, даам сезүүнү өзгөртөт ж. б.) кийме тиштин ички бетине күмүш каптайт. Ал үчүн протездин сырткы бетин мом менен жаап, ички бетине күмүш нитратынан (AgNO_3) глюкоза же формальдегиддин жардамы менен гальваникалык жол аркылуу күмүштү жабыштырып каптайт.

ТЕТРАЦИКЛИНОВЫЕ ЗУБЫ — тетрациклин тиштери. Эне баланын тиштеринин тканынын минералдашуу мезгилинде тетрациклин (антибиотик) дарысын ичсе тиштердин өнү бузулат.

ТИГЕЛЬ — тигель. Отко чыдамдуу материалдардан жасалган металл эритүүчү идиш. Стоматологияда көбүнчө алтындын, күмүштүн эритмесин жана платинаны эритишет.

ТИОДЕНТ — тиодент. Тиштерге жасалма каптама, көпүрө сымал жасалма тиш, ортодонтиялык аспаптарды, кийме

тиш протездерин жасаганда тескери көчүрмөсүн алууда керек болуучу материал. Тиодент ак жана кара пастадан турат. Курамында полисульфиддүү каучук, толтургуч жана тездеткич (катализатор) болот.

ТИРОКАЛЬЦИТОНИН — калкан безинин белок-пептиддүү гормону. Негизги кызматы кандагы кальцийдин санын азайтып, кальций фосфат алмашуусунда ДЗ витамини менен кошулуп, сөөктүн батыраак айыгышына өбөлгө болуп, сезгенүүдөн жана шишүүдөн сактайт.

ТИТАН — титан. Химиялык элемент, металл. Дат баспоочу болоттун түзүлүшүн жакшыртат, ага тыгыздык берет, кристалл аралык дат басууну азайтып, морттукту жоготот.

ТОЛСТОМЕР — калыңдыкты ченөөчү курал. Металл-керамикалык жасалма коронка жасаганда кобальт-хром кошундусунан алды менен каркас-калпачок (калпакча) куюшат, ошол каркастын калыңдыгын текшерүүчү аспап. Ошондой эле алтындан каптама жасаганда анын калыңдыгын текшерет.

ТОМОГРАФИЯ — томография. Адамдын ткандарын жана органдарын катмарлап рентген анатомиялык сүрөтүн тартуучу рентгендик ыкма. Муну компьютер менен тартса да болот, бирок магнит ядролуу резонанс жолу менен изилдөө эң жакшы натыйжа берет.

ТОРТОАНОМАЛИЯ — тортоаномалия. Тиштердин өз ордунда, бирок башка жакты карап айланып чыгуусу. Мында тиштин ички бети сыртка, сырткы бети ичке карап калат же болбосо 90 градуска айланып, кыйшык чыгат.

ТРАВЛЕНИЕ — жедирүү, ойдуруу. Стоматологияда химиялык заттарды тиштин кыт коюучу бетине сыйпап жууш керек. Мисалы: эвикрол менен иштегенде ал массанын тишке жакшы жабышуусу үчүн кыт коёрдун алдында тиштин көндөйүн алды менен бир сыйра спирт, андан кийин эвикролдун өзүнүн суюктугу менен аарчып чыгуу зарыл. Ошондо тиштин дентин, эмаль катмары жешилип, жумшак эвикрол менен жакшы биригет. Кыттын сапаты бир канча жакшы болот.

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ — травмалык түйүндөр.

Травмалык түйүндөрдүн эки түрү бар: түз жана чагылдыргыч (отраженный). Түз травмалык түйүндүн себептери: бийик коюлган кыт, кыпчык, жасалма коронка, көпүрөчө тиш протези, туура турбаган тиштер, физиологиялык жешилүүгө учурабаган тиштер, мында же ошол тиштер же карама-каршы турган тиштер бошоп кыймылдап кетет. Чагылдыргыч травмалык түйүндө азуу тиштери жок болгондо маңдайкы тиштер эки эселенген кызмат аткарып жатып, чарчап кыймылдап кетет. Травмалык түйүндөр пайда болгондо тиштер бат эле бошоп, кыймылдап кетпейт. Ал үчүн убакыт керек. В. Ю. Курляндскийдин далилдөөсү боюнча алды менен компенсация стадиясы болот. Мында тиштер түз же чагылдыргыч түйүндөрдө эки эселенген кызмат аткарышса да, бошондойт, оорубайт. Убакыттын өтүшү менен тиштердин эти качып, тамыры ачылып, бошой баштайт. Бул мезгилде тиштер өз кызматтарын зорго аткарып калат. Бул субкомпенсация стадиясы деп аталат. Өтө катуу тамакты чайнай албайт. Ушинтип жүрө берсе, тиштер тамак чайноого мүмкүнчүлүгү болбой бошоп кетет. Муну В. Ю. Курляндский декомпенсация стадиясы деп атаган. Демек, тиштерде түз түйүндү болтурбоо үчүн кыттарды, жасалма тиштердин ар кандай түрлөрүн туура жасоо керек. Ал эми чагылдыргыч түйүн болбосун үчүн тиш жулунгандан кийин тез арада зарыл болгон жасалма тишти салуу керек.

ТРА́КО — трако. Фарфордон жана металл-керамикадан каптама жасоодо тиштин бүйлөсүнүн кырын көтөрүүдө колдонулуучу кебез-кагаз жип. Ал ичке орто жана жоон болот. Германияда чыгарылат.

ТРАНСПЛА́НТАЦИЯ — трансплантация. Дененин же анын бөлүгүн которуп жабыштыруу, жамоо.

ТРАНСПЛА́НТАЦИЯ ЗУ́БА — тишти которуп отургузуу. Жулунган тиштин уясына же сөөктү оюп тишке орун жасап тиштин катарынан кыйшык турган тишти туура-лап, түздөп отургузуу.

ТРАНСПО́ЗИЦИЯ — транспозиция. Тиштердин орун алмашып чыгуусу, кылкыйма тиш менен кичи кескич тиштин орун алмашып калыш менен мүнөздөлгөн аномалия.

ТРАХЕОТОМИЯ — трахеотомия. Операциялык жол менен тамакты кесүү. Кекиртекте тешип дем алуу түтүгүн орнотуу, өпкөгө баруучу аба кекиртектен өтпөй, адам тумчугуп, муунуп баштаганда колдонулуучу ыкма.

ТРЕВОЖНОСТЬ — коркуу, тынсыздануу. Стоматолог врачка барарда пайда болуучу тынчсыздануу сезими.

ТРЕМА — трема. Тиштердин арасындагы ачык аралык, боштук. Кайсы бир тиштер чыкпай калгандыктан же тиштер жулунгандан кийин, убагында жасалма тиштерди салбагандыктан, тиштердин арасы ачылып калат. Ачыктык борбордук кашка тиштердин ортосунда эмес, башка тиштердин ортосунда болсо трема деп, борбордук кашка тиштердин ортосундагы аралык диастема деп аталат.

ТРЕМОР — тремор. Бармактардын, каштын, кабактын, кээде баштын калтырашы.

ТРЕПАНАЦИЯ ЗУБА — тишти көзөө. Бүтүн тиштин нервин алыш үчүн аны бор машина менен көзөйт, тешет.

ТРЕУГОЛЬНИК БОНВИЛЛЯ — Бонвилль үч бурчтугу. Астыңкы жаактын борбордук кескич тиштеринин тийишип турган кыры менен астыңкы жаактын муундарынын баштарынын борборунун аралыгы 10 см ге барабар экенин Бонвилль далилдеп, тең бурчтуу үч бурчтук экенин айткан.

ТРЕЩИНА — жарака. Ткандардын ийкемдүүлүгү начарлаганда, чектен ашык ийип койсо, жарака пайда болот. Жарака териде да, сөөктө да болот.

ТРИЗМ — карышуу. Жаак булчуңдарынын карышып калуусу. Бул оору ботулизм, талма, менингит жана ууланган мезгилде пайда болот.

ТРИМ — трим. Ооздон убактылуу алынбай турган жасалма тиш жасай турган пластмасса. АКШда чыгарылат.

ТРИОКСАЗИН — триоксазин. Хирургиялык стоматологияда операция жасар алдында оорунун коркунучун азайтып, жоготуу үчүн жана оорутпай турган дарылардын жанысыздандыруу касиетин күчөтүү максатында бериле турган дары.

ТРИФУРКАЦИЯ — трифуркация. Үч тамырлуу азуу тиштердин тамырларынын үч ачаланган жери.

ТРОМБ — уюган кан. Адам жараланганда кансыратуудан сактоочу нерсе. Ал эми уюган кан, кан тамырдын ичине туруп калса (инфаркт, инсульт, тромбофлебит ж. б.), ар кандай оор абалга алып келет.

ТРОМБОФЛЕБИТ — **тромбофлебит**. Бет-жаак айланасында кокк инфекциясынын таасиринде (фурункул, абсцесс, флегмона) тамырлардын сезгенип, бүтүп калышы.

ТРОФЕДЕМА — **трофедема**. Көбүнчө бетке чыга турган себеби белгисиз өнөкөт шишик. Беттин ар жери дөмпөйүп шишийт да, жумшак ткань менен кошулуп, катып калат. Кокус ал эринге чыкса эрин чоңоюп пилдин тумшугуна окшоп адамдын келбетин бузат.

ТРУБАЙТ БИОФАРМ JPN — **трубайт биофарм JPN**. Акрил пластмассасынан жасалган жасалма тиштер бат жешилгендиктен, аларды жешилүүгө чыдамдуу кылыш үчүн дагы башка кошулмаларды кошуу менен катуу жасалган жасалма тиштер. АКШда чыгарылат.

ТУБЕРКУЛЁЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА — ооз көндөйүндөгү былжырлуу кабыкчанын кургак учугу. Муну менен адамдын оорушу эки себептен болот: 1) ар кандай жарааттардан кийин кургак учуктун оору козгогучу жуккан болсо, оорунун биринчи белгилери, пайда болгон жерде былжырлуу кабыкча катууланып шишигенсип калат, 8–20 күндөн кийин ал жер жарага айланат. Жара тилде, тиштин бүйлөсүндө, эринде болсо, жаак астындагы лимфа бездери чоңоюп калат. Жаранын чоңоюшу 1–1,5 см ге жетет, кыры жана түбү катууланат, Пирке реакциясы оң чыгат; 2) кургак учук менен жалпы дене ооруса, ал ар кайсы органдарга жана ткандарга ошону менен катар ооз ичине да тарайт.

ТУРНЕРА ЗУБЫ — **Турнер тиши**. Тиштердин эмаль катмарынын бетинде боз тактардын болушу. Тиштер толук чыгып бүткөндөн кийин ал тактар сары күрөң болуп өзгөрүп, жаман көрүнөт.

ТУРУНДА — **турунда (оромо)**. Стоматологияда тиштин тамырынын каналын тазалоо үчүн пайдаланылат. Миллердин ийнесине пахтаны ороп, суутек перекисине же спиртке малып жууйт. Пахтаны зонддун учуна оросо да турунда деп аталат.

У

УГОЛ БОКОВОГО РЕЗЦОВОГО ПУТИ (Готический угол) — кесүүчүнүн каптал жолунун бурчу (Готикалык бурч). Астыңкы жаакты оңго солго кыймылдатканда кесүүчүнүн жасаган бурчу, $110-120^\circ$ ка барабар.

УГОЛ БОКОВОГО СУСТАВНОГО ПУТИ (УГОЛ БЕННЕТА) — муундун каптал жолунун бурчу (Беннет бурчу). Муун жолу менен сагиттал тегиздигинин кесилишиндеги бурч, ал $15-17^\circ$ ка барабар.

УГОЛ ДИВЕРГЕНЦИИ — ажыроо бурчу. Тиштердин катарында кемтик пайда болгондон бир топ убакыт өткөндөн кийин, кемтикти чектеп турган тиштердин кемтиктен ары карай кыйшаюусу.

УГОЛ КОНВЕРГЕНЦИИ — биригүү бурчу. Тиштердин катарында кемтик пайда болгондон бир топ убакыт өткөндөн кийин, кемтикти чектеп турган тиштердин кемтикке карай кыйшаюусу.

УГОЛ САГИТТАЛЬНОГО РЕЗЦОВОГО ПУТИ — кесүүчүнүн сагитталдык жолунун бурчу. Үстүңкү жаактын кесүүчү тишинин алдыга жылуусунда окклюзиялык тегиздикке тийишкенинен түзүлгөн бурч. Гизи боюнча $40-50^\circ$ ка барабар.

УГОЛ САГИТТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО ПУТИ — муундун сагитталдык жолунун бурчу. Муундун сагитталдык жолунун окклюзиялык тегиздикке кесилишинде түзүлгөн бурч, ал 20дан 40° ка чейин болушу мүмкүн, орто эсеп менен 33° ка барабар.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ — тиштерди жулуу. Тиштерди же тиштердин тамырын канчалык дарылап аракет кылса да айыкпай турган болсо, аны жулууга туура келет. Ал үчүн оорутпай турган дарыны ийне менен саюу керек жана атайын аспаптар колдонулат. Тиштерди жулуу — бул хирургиялык операция.

УДЛИНЕНИЕ ЗУБО-АЛЬВЕОЛЯРНОЕ — тиш-альвеола узаруусу. Карама-каршысындагы тиштер жулунгандан кийин убагында жасалма тиш протездери салынбаса, тиштер жаак сөөгүнүн кыры менен кошо узарып кетет.

УЗДЕЧКА ГУБЫ КОРОТКАЯ — эриндин кыска чектөөчүсү. Ооздун кире беришинде жогорку эринди дал ортосунан бөлүп, эрин менен тиштин былжырлуу кабыкчасын кошуп турган анатомиялык түзүлүш. Чектөөчү кыска болсо кашка тиштердин ортосунда аралык (диастема) пайда болуп калат.

УЗДЕЧКА ЯЗЫКА — тилдин чектөөчүсү. Тилди ооздун түбү менен кошуп турат.

УЗЕЛКИ БОНА — Бон түйүнчөктөрү. Наристе балдардын тандайында кездешет. Ал кээде жарага айланышы мүмкүн, көбүнчө өзүнө өзү жок болуп кетет.

УИЛСОНА КРИВЫЕ — Уилсон ийриси. Оң жана сол жактагы кичи жана чоң азуу тиштердин чайноо беттери боюнча жүргүзүлгөн ийри сызык. Чайноо тиштеринин беттеринин ушундайча жайланышы тамакты майдалоого, чайноого жакшы өбөлгө түзөт, тиштердин тийишүү беттери солго-оңго жылганда узакка беттешип тийишет.

УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ (УВЧ) — ультра жогорку жыштыктагы ток менен дарылоо. Сезгенүүнү токтотуу, кан тамырларды кеңейтүү жана бактерияларды жоготууда жакшы натыйжа берет.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ — ультраүн менен дарылоо. Дарылаганда механикалык, температуралык, физика-химиялык таасир берет. Мунун натыйжасында зат алмашуу процесстери жакшырып, иммундук абал жогорулап, таштарды тиштерден алуу жеңилдейт. Ультраүн үчилтик нервдин невралгиясын, чыккый-астыңкы жаак муунунун сезгенүүсүн, пародонтоз (канжел), пародонтит ооруларын дарылаганда жакшы натыйжа берет.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ — ультра кызгылт-көк нурлар. Күндүн нурлары жана жасалма нурлар оорунун алдын алуу жана ооруну дарылоо үчүн колдонулат. Нурлар организмге таасир этиши боюнча үчкө бөлүнүшөт: узун толкундуу 400–320 нм, орто толкундуу 320–280 нм, кыска токундуу 280–220 нм. Нурлар менен дарылоо зат алмашуу процессин жогорулатат, фосфор-кальций алмашуусун калыбына келтирет, Д витамини жана биологиялык активдүү заттар (гистамин, серотонин ж. б.) түзүлөт. Ультра кызгылт-көк нурларды стоматологияда колдонуу жакшы натыйжа берүүдө.

УНИКС — уникс. Тишке коюлган кыттарды жарык менен полимерлештирүүдө колдонулуучу универсалдуу аспап. Германияда чыгарылат.

УНИФАС — унифас. Стоматологиялык цемент, ооздон алынбоочу жасалма тиштерди табигый тиштерге бекитет. Россияда чыгарылат.

УНИЦЕМ — уницем. Ооздон алынбоочу жасалма тиштерди бекитүүчү стоматологиялык цемент, эки компонентүү, үч өндүү. Россияда чыгарылат.

УОЛДВЕСТ — уолдвест. Форма жасалуучу көмүртексиз майда дандуу фосфаттуу масса. Жасалма тиштерди металлдын кошундусунан куюуда колдонулат. 60 г жана 100 г өлчөмдөгү атайын суюктугу менен чыгарылат. АКШда чыгарылат.

УПРУГОСТЬ — серпилгичтик. Тышкы күчтүн таасиринде формасын өзгөртүп, бирок тышкы таасир алынганда мурунку калыбына келип калуу.

УРОДЛИВЫЕ ЗУБЫ — көрксүз, кебетеси бузук тиштер. Мындай тиштер көбүнчө жогорку жаактын тиштеринде таңдайдын жана эриндин жырыгында кезигишет. Көрксүз (туура эмес) тиштер көбүнчө кашка тиштерде болот, алардын кесүү кырында жарым айдай кетик, урчук, дөндөр болот.

УСАДКА — чогуу, кичирейүү. Жасалма тиштерди жасарда алды менен тескери көчүрмөсү алынат. Ошондо күкүм менен сууну аралаштырып, ботко даярдап, өзүнүн ылайыкталган кашыгына салып, тиш жасоочу жердин калыбын алат. Калып алынгандан кийин тез — 10–15 мүнөттө ага гипстин боткосун куюп, үлгү (модель) алынат. Эгерде алынган калыпты 1–2 саатка үлгү куйбай коюп койсо, кийин ошол үлгүдөн жасалган жасалма тиш туура келбей калат. Себеби суусу бууланып кетип, көлөмү кичирейип кетет.

УХОД ЗА ПРОТЕЗАМИ — протездерди күтүү. Алынбай турган протездерди өз тиштердей эле жууп чайкап жүрсө болот, ал эми кийме протездерди ар бир тамак ичкенден кийин чечип, жууп туруу керек. Азыр протезди таза күтүү үчүн Корега таблеткасы бар. Ал щётка жетпеген жерлерди тазалап жууп коёт.

УШИ́БЫ ЗУ́БА — тишти кокустатуу. Травма болгон тиштин өзүнө тийсе, же бут менен тээп, же кол менен урганда тишке кошо тийип кетсе, тиш зыянга учурайт, ооруп калган тишти табуу үчүн, тиштерди күзгүнүн же зонддун арты менен тыкылдатып уруп көрүү керек. Оорулуу тиш тез ооруп кетет. Эгерде тиштин өңү өзгөрүп, күнүрт болуп калса, демек ал тиштин өзөгү жансызданып калган.

Ф

ФАГОДИНАМОМЕТРИЯ — фагодинамометрия. Ар кандай тамак-ашты чайнап майдалоодо канча күч сарп кылына турганын ченөө ыкмасы. Күчтү ченей турган аспап фагодинамометр деп аталган. Мисалы; кайнап бышкан этти майдалоо үчүн 12–14 кг, куурулган этке 13–16 кг, капуста салатына 10–12 кг, жумшак нанга 12–13 кг, нандын кырына 100,6 кг, ышталган катуу колбасага 80,6 кг күч керек.

ФА́ЗЕ-ПЛЮС — фазе-плюс. Альгинат тобуна кирген, ооздон алынбоочу жана алынуучу кийме жасалма тишти жасоодо калып алуу үчүн материал. Италияда чыгарылат.

ФА́ЗЫ ЖЕВА́НИЯ — чайноо фазалары, б. а. мастикациограмма. Мында тамакты чайноонун бир цикл мөөнөтүн эске алышкан, ал 5 фазадан турат: 1) ылдыйкы жаактын кыймылсыздыгы; 2) оозду ачуу, тамакты оозго салып, тиштеп алуу; 3 — тамакты азуу тиштерге жылдыруу; 4) тамакты толук чайноо; 5) тамакты тоголок формага келтирип, жутуу. Бул учурда тиштердин бардыгы бири-бири менен тийишип калышат.

ФА́КТОРЫ РИ́СКА СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВА́НИЙ — стоматологиялык оорулардын пайда болуу коркунучу. Келип чыгышына тукум куучулук, жашоо шарты, тамактануусу, тиштин түзүлүшү, айлана-чөйрөнүн таасир этиши ж. б. себепкер болот.

ФА́НТО́М — фантом. Адамда тиштердин ар кандай ооруларын дарылоодо алды менен студенттерди гипстен, пластмассадан жасалган тиштерди бор машина менен өгөтүп,

кытатып, калыбын алдырып, үйрөнүү үчүн курал. Жасалма коронка жасап, аны да фантомго коюп үйрөтөт.

ФАРФОРОВАЯ МАССА — фарфор массасы. Жасалма каптамаларды жасаш үчүн колдонулуучу фарфор масса. Ал курамында талаа шпаты 60–75%, каолин 3–10%, кварц 15–35% жана боёктору бар күкүм. Боёк марганец, хром, кобальт, цинк ж.б. металлдардын кычкылдары кирет. Талаа шпаты – фарфор массасынын негизги компоненти. Ал жаратылышта калий шпаты (ортоклаз), натрий шпаты (альбит), кальций шпаты (анорит) түрүндө таралган. Талаа шпаты илээшкектикти арттырат жана туруктуу форма берүүгө жардам берет. Кварц катуулукту жана химиялык инерттүүлүктү камсыз кылат. Каолин массаны күнүрт кылып, илээшкектикти жогорулатат. Боёктор болсо күкүмгө ар кандай түс жасоого мүмкүнчүлүк берет. Күкүм тазаланган (дистирленген) сууга аралаштырылып, коронканын формасын калыптандырып, вакуумдуу электр мешинде 1100–1300°C ысыкта бышырылат.

ФАСЕТКА — фасетка. Өңү табигый тиштерге окшош жасалма тиш. Тандай же тил жагындагы бети жана чайноо бети металлдан, сырткы көрүнүп турган бети пластмассадан же фарфордон болот.

ФЕНОМЕН ПОПОВА-ГОДОНА (ВТОРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ) — Попов-Годон феномени (Тиш-жаак тизиминин (системасынын) экинчилик бузулушу). Тиштер жулунуп, тиштердин катарында кемтик пайда болгондо, өз убактысында жасалма тиш салынбаса, кемтиктин ичин карай карама-каршы турган тиштер өсүп кетет. Ылдый жакта тиштер жок болсо, үстүнкү тиштер ылдый карай, жогорку жакта тиштер жок болсо, ылдыйкы тиштер жогору карай жылып, өсөт. Кемтикти чектеп турган тиштер же кемтикке карай же кемтиктен тескери карай кыйшайып кетет. Ошондуктан мындай горизонталдык жана вертикалдык өзгөрүүлөр феномен деп аталат.

ФЕНОМЕН ХРИСТЕНСЕНА — Христенсен феномени. Астыңкы жаакты алдыга жылдырып, маңдайкы кескич тиштерди тийиштиргенде, тиш катарынын арт жагында азуу

тиштердин арасында үч бурчтуу аралыктын пайда болушу, үч бурчтуктун чокусу алдыга карайт.

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ — ферменттик дары-дармектер. Организмдеги бардык химиялык процесстерди тездетип, жарадагы өлүү, чирик ткандарды кетирип, бетин тазалап, карттандырып, айыгууга көмөк бере турган заттар. Аларга трипсин, химопсин, лидаза, ронидаза ж. б. кирет.

ФИБЕР-БОНД, ФИБЕР-СИЛИТ, ФИБЕР-СИМЕНТ МЛ — фибер-бонд, фибер-силит, фибер-симент мл. Өтө ичке айнек буласынан туруп, бошогон тиштерге шакшак коюу үчүн колдонулат. Эгерде тиштер кыйшайып кетсе, аны оңдоп, түздөп Фибер-Бондду айланасына төгүп, куюп койсо, массанын катуусу менен тиштин бошогону токтойт. АКШда чыгарылат.

ФИБРОМАТОЗ ДЭСЕН — тиштин бүйлөсүнүн фиброматозу. Бириктирүүчү ткандагы талчалардын көбөйүп өсүп, тиштерди толук жаап калышы. Сөөк жешилип, тиштин бошошуна алып келет.

ФИБРОСАРКОМА — фибросаркома. Бет-жаак системасындагы бириктирүүчү талча ткандардан башталган зыяндуу шишик. Ал бат эле жаак сөөгүнө өтүп кетет. Көбүнчө жаштарда кездешет.

ФиБС — **фиБС**. Академик В. П. Филатов сунуш кылган препарат. Организмдеги зат алмашуу процессин иреттеп, каршылык көрсөтүү күчтөрүн жогорулатып, кубат бере турган зат. Аны колдонгондо жаранын бети карттанып, айыгуусу тездейт. Пародонтту жана башка стоматологиялык ооруларды айыктыруу үчүн колдонсо болот.

ФИКСАКРИЛ — фиксакрил. Альгинаттуу, гидроколлоиддуу жана силикондуу калып алуучу массалар менен калып алганда алардын бети тегиз, жакшы чыгыш үчүн фиксакрилди сыйпоо керек.

ФИКСАТОРЫ — бекитүүчүлөр. Доголуу жасалма тиштерди ордуна кыймылдатпай турган таяныч, таянып-кармап туруучу илмектердин тобу.

ФИС-8 — **фис-8**. Натрий альгинатынын коллоиддик эритиндиси, гипс, пластмассага жабышпасын үчүн суюктукту

гипстин бетине сыйпаганда 0,01 мм калыңдыктагы катмар пайда болот, жасалма тиштердин сапатына тоскоол болбойт. Черногорияда чыгарылат.

ФИССУРЫ — чункурчалар. Кичи жана чоң азуу тиштердин чайноо бетиндеги дөмпөкчөлөрдүн ортосундагы чункурчалар.

ФИТОТЕРАПИЯ — дары чөптөр менен дарылоо. Ооз ичиндеги ар түрдүү ооруларды, сезгенүүлөрдү дары өсүмдүктөр менен дарылоо жакшы натыйжа берет. Аларга ачуу жалбыз (мята перечная), түймедак (ромашка), уулуу саргалдак (чистотел большой), көк шимүүр (шалфей лекарственный) ж. б. кирет.

ФЛЕГМО́НА — флегмона. Тери астындагы майдын ириңдеши. Пайда болгон жерине жараша ал көз, чыккый, жуткунчактын айланасында ж. б. болуп бөлүнөт.

ФЛЕГМО́НА ВИСО́ЧНОЙ О́БЛАСТИ — чыккый тушундагы ириңдүү шишик. Чыккый, көз, баш, бет сөөктөрү шишип, адамдын бети бузулат. Чыккый тушунун териси шишип чоюлат. Чыккый булчуң этинин тартылуусунан ооздун ачылып жабылуусу кыйындайт.

ФЛЕГМО́НА ГЛАЗНИ́ЦЫ — көздүн чарасындагы ириңдүү шишик. Көз торунун курч сезгенүүсүнүн себептери: астыңкы кабактын сезгенүүсү, шишиши жана көздүн айланасына чыккан исиркектер.

ФЛЕГМО́НА ДНА ПО́ЛОСТИ РТА — ооздун түбүндөгү ириңдүү шишик. Ал шишиктин себептери: астыңкы жаак тиштери периодонтит, ириңдүү киста болгондо инфекциянын алардан таралышы. Адамдын бет түзүлүшү бузулуп, ээк жана жаактын астындагы ткандар ириңдеп шишийт. Дененин температурасы 40°Сна жетет, ахвалы кескин түрдө начарлап кетет, тили шишип оозуна батпай, сүйлөшү кыйындап, жута албай калат, бул клиникалык көрүнүш оорудууну ого бетер коркутат.

ФЛЕГМО́НА ОКОЛОГЛО́ТЧНОГО ПРОСТРА́НСТВА — тамактын айланасындагы ириңдүү шишик. Анын себептери: тамактын тушуна ок тийгенде, башка бир заттардан

жараланганда же басма (ангина) болгондо ооз ичине ириндин чогула башташы. Оору басма сыяктуу башталат: жууу, дем алуу кыйындап, лимфа бездери чочуп, чоноёт.

ФЛЕГМОНА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ — көздүн астындагы ириндүү шишик. Үстүнкү кылкыйма, кичи азуу тиштеринен инфекциянын таралышынан пайда болот. Ошондо үстүнкү эрин, беттин шишинен адамдын өңү бузулат, төмөнкү кабактын шишигинен көз жабылып, мурундун формасы өзгөрүлөт.

ФЛЕГМОНА ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ — жаак астындагы ириндүү шишик. Акыл азуу чыгарда былжыр кабыкча жанчылып, эилип сезгенүүнүн таралышынан, астыңкы жаактын сөөгүнүн остеомиелитинен, жаак астындагы шилекей безинин сезгенишинен пайда болот. Шишиген жерди кармаганда ал катуу инфильтратка айланганы байкалат. Оозду ачканда ооруйт. Кабылдап кеткенде медиастинит оорусуна өтүп кетиши мүмкүн.

ФЛЕГМОНА ПОДЪЯЗЫЧНОЙ ОБЛАСТИ — тилдин астындагы ириндүү шишик. Астыңкы жаактын тиштеринин периодонтитке, ириндүү пародонтитке, кулгунага кабылганда пайда болуучу патологиялык процесс. Оору күчөп кеткенде тил оозго батпай, адамдын оозу ачылып калат, тилдин асты көөп (инфильтрация) кетет.

ФЛЭКСИ-ВОСТ — флекси-вост. Жука, ийкемдүү, колдун жылуулугунда жумшарган мом, өзүнүн жабышкак жана созулчаактыгынан үлгүгө (моделге) жакшы жабышат. Узундугу 150 мм, эни 75 мм, калыңдыгы 0,3–0,6 мм болот. Германияда чыгарылат.

ФЛЮКСА — флюкса. Калып алуучу темир кашыктарды жана стоматологиялык аспаптарды көлөмү 3,2 л идиште ультра үн менен жууп тазалоочу аспап. Ошондой эле стерилдүүлүгү көп убакытка сакталсын үчүн жуулган аспаптарды кагазга ороп коюучу «АКСИОМА» деген машина бар. Италияда чыгарылат.

ФЛЮКТУАЦИЯ — былкылдоо. Сөөктүн термелишинен дубалы жумшак ийилчек болгон көндөйдөгү болуучу суюктуктун козголушу, термелиши.

ФЛЮКТУОРИЗАЦИЯ — флюктуоризация. Синусоидалуу өзгөрүлмө электр тогун дарылык максат үчүн колдонуу. Жарааттын айыгышын, кан жана лимфа айлануусун тездетет, оорутпайт, ферменттердин кызматын күчөтөт.

ФЛЮОРОЗ — флюороз. Сууда фтордун көп болуусунан (1 л сууда 2 мг дан көп) организмде фтор жана анын кошулмаларынын чектен артык көп болуп (нормада 0,7–1,3 мг/л), өнөкөт ооруга алып келет. Мунун негизги белгилери болуп остеоосклероз жана тиш эмалынын жетилбестиги. Айрыкча тиш ткандары түзүлөр кезде фтордун таасиринен тиштин бети ар түрдүү өзгөрүүлөргө учурайт.

ФОРМОДЕНТ ЛИТЬЕВОЙ, ФОРМОДЕНТ ТВЕРДЫЙ — куюлуучу формодент, катуу формодент. Доголуу тиш протезин жасоо үчүн алды менен момдон конструкциясын жасайт, ошол максат үчүн колдонулуучу жашыл мом.

ФОРМАСИЛ — формасил. Тиштердин калыбын алуу үчүн силикон массасы. Германияда чыгарылат.

ФОРМОВКА — формага келтирүү. Металлды эритип куюш үчүн жасалган атайын калып, форма. Момдон жасалган тиштердин, каптамалардын, доголуу жасалма тиштердин каркасын ж. б. сыртынан отко чыдамдуу масса менен ороп форма жасалат.

ФОРМОДЕНТ — формодент. Ийкемдүү пластмассадан жасалган ар түрдүү чункурлары бар форма. Ал чункурларга момду эритип куюп, доголуу жасалма тиштин конструкциясынын каркасын курууга болот. Андан кийин момдон жасалган каркас конструкцияны металлга алмаштырат. Аны кээде МАТРИЦА деп аташат жана жазышат.

ФОРМОЛИТ — формолит. Дат баспоочу болоттон тиштерди куюу үчүн калып алууда момдон жасалган тиштердин сыртынан каптоого, керектелүүчү кварцтын чанынан, этилсиликаттан, бор кислотасынан жана кумдан турган отко чыдамдуу аралашма.

ФОРМУЛА ЗУБОВ — тиштердин формуласы. Туруктуу тиштердин формуласы араб сандары менен белгиленет:

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Сүт тиштердин формуласы рим сандары менен белгиленет:

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

Туруктуу тиштердин формуласы:

Азыркы убакта 1971-ж. стоматологдордун эл аралык федерациясы (FDI) сунуштаган формула колдонулат. Бул формула боюнча ар бир тишти көрсөтсө болот, оң жактагы жогорку алтынчы тиш 1.6 деп. Ал эми астыңкы сол жактагы жетинчи тиш 3.7 деп көрсөтүлөт. Анын негизги түшүнүгү боюнча ар бир тиш эки сан менен айтылат: биринчиси чарчы жак, экинчиси ошол жердеги тиш. Жаактын чарчысын туруктуу тиштер үчүн 1ден 4кө чейин, сүт тиштер 5тен 8ге чейин белгиленет. Мисалы, сол жактагы жогорку туруктуу жетинчи тишти 2.7, ал эми оң жактагы ылдыйкы туруктуу бешинчи тишти 4.5 (эки-жети жана төрт-беш деп окулат).

Сүт тиштердин формуласы:

5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5
8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5

Ал эми сүт тиштердин үстүңкү жаактын сол жагындагы бешинчиси 6.5, ал эми астыңкы жаактын оң жагындагы

бешинчи сүт тиш 8.5 болот (окуганда алты-беш жана сегиз-беш).

Ал эми 1975-жылы кабыл алынган номенклатура боюнча тиштердин катары төмөнкүчө жазылат:

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	
32	31	30	29	28	27	26	25			24	23	22	21	20	19	18	17

Бул белгилөө боюнча тиштин номери жогорку оң жактагы сегизинчи тиштен башталып, сааттын жебесинин жүрүшү боюнча уланат. Мисалы, үстүңкү оң жактагы алтынчы тиш 3 болсо, астыңкы оң жактагы алтынчы тиш 30 болот.

ФОСФАТ ЦЕМЕНТ — фосфат цемент. Стоматологияда кенири колдонулуучу материал. Күкүмдүн курамы 80–83% цинк оксидинен, 6–10% магний оксидинен, кварц жана башка кошулмалардан, суюктугу 38–44% ортофосфор кислотасынын суудагы эритмесинен жана цинк, алюминий, магний фосфатынан турат. Фосфат-цемент туруктуу кыттарды өзөктөн бөлүп, чектеп турат, тиштердин тамырындагы каналдарды толтуруу үчүн, жасалма каптамаларды тишке бекитүү (карматуу) үчүн керектелинет.

ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИЯ — фотоплетизмография. Тиштин өзөгүнүн, этинин, Филатов бутакчасынын (пластикалык операция болгондо) функциялык кызматын текшерүүгө мүмкүндүк берүүчү ыкма. Ткандарда кандын айланышынын өзгөрүүсүнө, оптикалык жарык өткөрүшүнө, ошондой эле жарык чыгаруунун өзгөрүшүнө карай белгилүү корутундуга келүүгө мүмкүнчүлүк берет.

ФРЕЙЗ — фрейз. Тиштердин калыбын алуу үчүн колдонулуучу масса, альгинат тобуна кирет, күкүмү кызгылт көк түстө, сууга аралаштырганда мала кызыл түскө өтөт, агара баштаганда оозго салып, тиштерге коюу керек, жылуулук 23° С болгондо 2,5 мүнөттө катат. Польшада чыгарылат.

ФРЕНУЛОТОМИЯ — френулотомия. Чектөөчүнү тилип коюу.

ФРЕНУЛОЭКТОМИЯ — френулоэктомия. Чектөөчүнү кесип алып таштоо.

ФТОР — фтор. Химиялык элемент. Фтордун жетишпегендиги же ашыкчалыгы ар кандай тиш ооруларынын пайда болушуна себеп болот. Кариес оорусунун алдын алуу чараларынын ичинде өзгөчө орунду ээлейт. Биз ичкен суунун курамында фтор орто эсеп менен 1 мг/л болууга тийиш. Фтор мындан аз болсо, кариес, гипоплазия оорусу көбөйүп, ал эми көп болсо флюороз оорусу пайда болот.

ФТОРАКС — фторакс. Акрил пластмассасына кирет. Мындан кийме тиштердин негизин жана тиши жок кишилерге жасалма тиш жасаганда жеке ченкеп жасоого болот. Курамында акрил пластмассасынан бөлөк фтор жана башка заттар бар.

ФТОРОТАН — фторотан. Стоматологиялык тажрыйбада женил операцияларды жасоодо колдонулуучу, наркоз катары керектелүүчү дары.

ФУДЖИ-1 — фуджи-1. Фтор бөлүп чыгаруучу айнекиономерлүү цемент, күкүм жана суюктуктан турат. Японияда чыгарылат.

ФУДЖИ ПЛЮС — фуджи плюс. Керамика жана металл-керамика тиштерди жакшы бекитүүдө керектелүүчү, полимери бар айнекиономерлүү цемент. Японияда чыгарылат.

ФУДЖИВЕСТ И ФУДЖИВЕСТ СУПЕР — фудживест жана фудживест супер. Кемүртеги жок металлдын ар кандай кошундуларын куйганга форма алуу үчүн фосфаттуу масса. Металлды куюуда отко чыдамдуу башка массаны аздан ысытат, ал эми бул массаларды кызып турган мешке салса деле эч нерсе болбойт, жарылбайт, жумуш убактысы 2 саатка үнөмдөлөт. Японияда чыгарылат.

ФУДЖИРОК-ЕР — фуджирок-ер. Ажыратылма үлгүлөрдү куюуда керектелүүчү өтө катуу гипс. Японияда чыгарылат.

ФУНКЦИИ ПАРОДОНТА — пародонттун кызматтары. Пародонттун аткарган кызматы: тишти кармап-таянып туруучу (опроно-удерживающая), коргоочу (защитная), нерв-

рефлекстик (нервно-рефлекторная), иммундук-биологиялык (иммуно-биологическая), азыктандыруучу (трофическая), айыктыруучу (пластическая), амортизациялоо ж. б.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЫ — чайноонун функциялык сыноосу. Тиштер соо, толук болгондо же тиштер начар, саны боюнча аз болгондо бир эле өлчөмдөгү же көлөмдөгү тамакты сапаттуу майдалап чайноо убактысы ар кандай болот. Биринчи болуп Христиансен 5 г бадамды 50 жолу чайноону сунуштаган. С. Е. Гельман 5 г бадамды 50 сек чайнаткан, И. С. Рубинов 0,8 г токой жаңгагын жутуу рефлeksi пайда болгончо чайнаткан. Жутуу рефлeksi 14 секундда пайда болот экен. Анан оозундагы бадамды, жангакты идишке түкүртүп, оозун чайка тып идишке түкүртүп, дезинфекция жасаш үчүн 5% сулеманын эритиндисинен 5-10 тамчы тамчылатып, шилекейден арылтып жууп, кургатып, көзөнөгүнүн диатери 2,4 мм болгон электен элеп, электе калганын таразага тартат. Чайноонун эффективдүүлүгү 2 г эленсе 40%, 3 г эленсе 60% болот.

ФУРАЦИЛИН — фурацилин. Ооз көндөйүндөгү ар кандай ооруларды: жара менен күйүктү, оозул менен пародонтитти, өнөкөт кулгунаны ж. б. ооруларды дарылоодо антисептик катары колдонуучу зат.

ФУРУНКУЛ — чыйкан, сыздоок. Тери-май безинин тез ириндеп сезгенүүсү. Ошондой эле чачтын түпкү тамырынын (фолликула) сезгениши. Ал көбүнчө мандайда, мурунда, жогорку эринде, ээкте болот.

ФУТУРА-ЗУЛЬФ — футура-сульф. Өзү катуучу акрил пластмассасы. ФУТУРАМАТ аппаратында басым астында 45–90°C температурада полимерленет. Германияда чыгарылат.

Х

ХААС-ЛАЗЕР 44Р — хаас-лазер 44Р. Көмүртеги аз кобальт, хром, молибден куймасын 2 мм терендикке чейин ширетүү үчүн аспап. Германияда чыгарылат.

ХАБИТУС — дидаар (бет, жүз, ирен, ырай). Адамдын өнүнүн, түзүлүшүнүн сырткы көрүнүшү, адам оорубу же сообу, өлүүбү же тирүүбү анын хабитусунан билүүгө болот.

ХАЙ-КЕРАМ — хай-керам. Жалаң керамикадан жасалма тиш жасоо үчүн чыгарылган масса, негизин алюминийдин кычкылы түзөт. Германияда чыгарылат.

ХАЙ-ЛАЙТ — хай-лайт. Фарфордон жасалган жасалма тишти ооздун ичинде жалтыратуу үчүн колдонулуучу масса. Германияда чыгарылат.

ХАУЭСА МЕТОД — Хауэс ыкмасы. Жаак сөөгүнүн негизин же башкача айтканда тиштердин тамырынын учунун денгээлиндеги жаактын негизин ченөөдө колдонулуучу ыкма. Ортодонтиялык дарылоодо бул ыкма боюнча жаак сөөгүн кенейтүү же кайсы бир тиштерди жулуу керекпи деген маселе чечилет. Нормада 12 тиштин тамырынын учунун негизинин узундугу 44% ды түзүү керек. Эгерде ал узундук 37% болсо, анда кайсы бир тишти жулууга туура келет.

ХЕЙЛИТ — хейлит. Кызыл эриндин былжырлуу кабыкчасы менен терисинин сезгенүүсү. Сезгенүүнүн себептери: тышкы дүүлүктүргүч (травма, ысык, суук аба-метереология, химия), инфекция, аллергия. Жайгашуусу боюнча эриндин жогорку катмарында жана терисинде болот. Хейлиттин түрлөрү өтө көп.

ХЕРАМАТ-Ц — херамат-ц. Фарфордон жасалган тиштерди күйдүрүү үчүн кичи габариттүү меш, көлөмү 30 • 33 • 58 см, 100 программасы бар. Германияда чыгарылат.

ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛЮНЫ — шилекейди химиялык-спектрдик анализдөө. Ал үчүн эртең менен тамактана электе 4–8 см³ шилекейди алып, лабораторияга жеткирет. Темирдин, жездин, марганецтин, күмүштүн, алтындын, никелдин санынын көбөйүшү электр-химиялык процесстин бар экенин далилдейт.

ХИМОПСИН — химопсин. Биологиялык касиети боюнча химотрипсин жана трипсинге жакын, бирок жалаң эле жергиликтүү оорулуу жерлерди дарылоого колдонулуучу фермент. Ирндүү жараларды, күйүк, пародонтит, ооз ичиндеги былжырлуу кабыкчанын ар кандай сезгенүүлөрүн бастырма (апликация) ыгы менен дарылайт.

ХЛОРАМИН — хлорамин. Антисептикалык каражат, жыт жоготкуч касиеттери жакшы, ткандарга зыяндуу таасирин тийгизбей, микробдорду жок кылат. Кариес кабылдап, пульпит, периодонтит болгондо, тиштин тамырынын каналын жууп тазалаганда, ооз ичиндеги былжырлуу кабыкчанын ар кандай ооруларын дарылоодо, пародонтитте, тиштин этинин чөнтөкчөлөрүн дарылап жоюуда колдонулат.

ХЛОРОЗ ПОЗДНИЙ — кечиккен хлороз. Кандын курамында темирдин аздыгынан боло турган аз кандуулук. Тиштин эмалынын жалтырактыгынын жоголушу, тиштин тез жоюлуп кетиши, тиштин кариесинин көбөйүшү, тилдин күйгөндөй оорушу, ооздун ичинин кургашы, даам сезүүнүн өзгөрүүсү — ушундай оорулар кечиккен хлороздун белгиси болуп эсептелет.

ХОНДРОСАРКОМА — хондросаркома. Бул дарт жашы улгайган адамдарда жогорку жана ылдыйкы жаак сөөктөрдө болот, өрчүшү акырындык менен бөлөк органдарга тарайт. Клиникада сөөктүн кыйшайып калышынан билинет. Хондросаркома борбордук жана четки болуп бөлүнөт. Четкиси бет сөөктөрдө кездешет да беттин сөөгүн кыйшайтып, бара-бара сөөктүн чирешине алып келет. Оору рак оорусунун катарында.

ХОНСУРИД — хонсурид. Биологиялык активдүү зат. Бириктирүүчү ткандарды куларда негизги роль ойнойт. Жаранын бетинин айыгышын тездетип, ткандын жоюлган жерин калыбына келтире ала турган касиетке ээ препарат. Ооз ичи, эрин кызарганда, тилингенде, ооздун ичи оюлган, кызыл жалпак темирөткү, лейкоплакия ооруларын дарылоодо колдонулат.

ХОРОШИЛКИНОЙ-ТОКОРЕВИЧА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ — Хорошилкина-Токоревич куралы. Мандайкы тиштер өтө алдыга чыгып, өсүп калганда колдонулуучу курал. Курал эриндин, тилдин жана уурттун тишти басуусун чектейт.

ХРОМ — хром. Химиялык элемент. Дат баспоочу болоттун кычкылдануу (окистенүү) жана дат бастырбоо касиетин күчөтүү үчүн хромду кошушат, ал сырткы тыгыз кабыгынын жардамы менен тышкы таасирди куймага өткөрбөйт, көмүртек менен хром кошулуп, хром карбидин түзүп, дат баспоочу болоттун катуулугун, айрылууга болгон каршылыгын күчөтөт.

ХРОНИОСЕПСИС — өнөкөт сепсис. Организмдеги өнөкөт инфекция очокторунун, айрыкча оорунун, күчөп турушу. Ар кандай сезгенүү процессинин бирде басандап, бирде күчөп, бирде созулуусу.

ХРОНИЧЕСКИЙ — созулмалуу, өнөкөт. Көпкө созулуп, айыкпай жүргөн оору, дарылаганда онолуп калгансып, кайра эле баштала берүүчү кесел.

ХРУ́ПКОСТЬ — морттук. Картайган адамдардын жаак сөөктөрү менен абайлап иштөө керек: тишин жулганда, калыбын алганда сөөк морт болгондугунан, сынып кетиши мүмкүн. Ошондой эле убакыттын өтүшү менен кыттоочу заттардын физикалык-химиялык касиеттери төмөндөгөндүктөн, катуу тиштегенде кыттын кырынын сынып кетиши да морттук болот.

Ц

ЦЕГА́ЛЛ — цегалл. Ооздон алынбоочу жасалма тишти өз тиштерге жабыштырып беките турган, бат катуучу цинк-фосфаттуу цемент.

ЦЕЛЛУЛО́ИД — целлулоид. Целюллоза нитратынын негизинде жасалган, өңү тунук, суу өткөзбөөчү пластмасса. Тиштеги кариес көндөйүн кыттоодо керектелүүчү жука кабык.

ЦЕМЕНТ КОРНЯ ЗУБА — тиштин тамырынын цементи. Тиштин тамырынын сыртынан жаап, каптап турган жука кабык. Анын курамында 68% органикалык эмес, 32% органикалык заттар бар. Химиялык курамы жана түзүлүшү боюнча сөөккө окшош, айырмасы – сөөктө кан тамырлар бар, цементте болбойт. Цементтин негизги заты – кальций туздары. Коллаген талчалары (байламталар) бир башы менен цементке жабышса экинчи башы менен жаак сөөктүн кырына жабышып, тишти уясында кармап турат.

ЦЕМЕНТ ИОНОМЕРНЫЙ — иономерлүү цемент. Бул өтө жабышкак, дүүлүктүрбөөчү зат, тиштин көндөйүн кыттоого керектелинет. Күкүмүнүн курамында кремний менен алюминий жана фтор менен алюминий болот, суюктугу 50% дуу полиакрил кислотасынын суудагы эритиндиси.

ЦЕМЕНТ ЦИНКПОЛИАКРИЛАТНЫЙ — цинкполиакрилаттуу цемент. Мындай цемент менен тиштин көндөйүн толтуруп, туруктуу кыт койсо болот. Күкүмү магний кычкылы кошулган цинк кычкылынан, суюктугу полиакрил кислотасынан турат.

ЦЕМЕНТОМА — цементома. Зыянсыз шишиктердин тобу, негизинен цементке окшош ткандардан турат.

ЦЕМИОН-Ф — цемион-ф. Коронкаларды, кыпчыктарды, шиштүү тиштерди, көпүрөчө протездерди тишке бекитүү (цементтөө) үчүн колдонулуучу рентген контрасттуу, эки компоненттүү (күкүм, суюктук) айнек иономерлүү стоматологиялык цемент. Россияда чыгарылат.

ЦЕНТРЫ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ — чайноо борборлору. Мында сол жана оң жактагы азуу тиштер эсептелет, чайнаганда бир же эки жак тең иштеши мүмкүн.

ЦЕРИИ — церин. Кыпчык (вкладка) жасоодо колдонулуучу синтетикалык мом. Чехияда чыгарылат.

ЦЕФАЛОМЕТРИЯ — цефалометрия. Антропометриянын бир бөлүгү, стоматологияда адамдын башын ар түрдүүчө ченөөдө колдонулат.

ЦИАНОЗ — цианоз. Канда кычкылтектин аз болгондугунан эриндин, ооздун былжырлуу кабыкчасынын көгөрүүсү, кандын коюуланышы. Жүрөк, күрөө тамыр начар иштегенде, көгөрүү күчөп кетет.

ЦИНГА — **цинга**. Организмде С витамини жетпегендиктен, тиштин бүйлөсү көөп, тиштердин түшүүсү менен мүнөздөлгөн оору. С витамини күнүмдүк тамакта аз болсо же ал денеге синбей калса, адам тез чарчайт, шалдырайт. Тиштер бошоп, кыймылдап түшө башташат. Тиштин эти шишип, ириндеп, чөнтөкчөлөр пайда болуп, ооздон сасык жыт чыгат, гингивит, оозул болот. Убактысында дарылабаса, бул оору бүт денеге тарайт, булчуң эттер, муундар жабыркайт.

ЦИНКА ОКИСЬ — **цинк кычкылы**. Сезгенүүнү азайтып жараларды кургатуучу касиетке ээ. Тиштин тамырын дарылоодо колдонулат.

ЦИСТОТОМИЯ — **цистотомия**. Кистанын көңдөйүнүн оозун ачып, ооз көңдөйү менен катышуу жасоо.

ЦИСТОЭКТОМИЯ — **цистоэктомия**. Кистанын ички катмарын сыйрып салып, кайра туюк тигип коюу.

Ч

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ — **айлануу ылдамдыгы**. Бор машиналардын айлануу жыштыгы, ылдамдыгы ар түрдүү болот. Мисалы, электр бор машинанын айлануу ылдамдыгы мүнөтүнө 10000–30000, турбиналуу бор машинаныкы 100000–300000 болот.

ЧЕЛЮСТИ БЕЗЗУБЫЕ — **тишсиз жаактар**. Тишсиз калуунун себептери, кариес, пародонттун ар кандай оорулары, травма, кант оорусу, боор, ашказан, ичеги оорулары, кулгуна, зыяндуу жана зыянсыз шишиктерге байланыштуу операция жасоо ж. б. болот.

ЧЕЛЮСТЬ ВЕРХНЯЯ — **үстүңкү жаак**. Беттин ортосун ээлеп турган жуп сөөк. Үстүңкү жаактын денеси жана төрт өсүгү бар: маңдай, бет, тандай жана альвеолалык. Төрт тегиздиги бар: алды жактан, көз жактан, чыккый астындагы арт жактан жана мурундун ичинен. Үстүңкү жаактын ар бир жагында сегизден тиш уясы болот, ошондой эле эки жагында – денеде гаймор көңдөйү бар.

ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ — **астыңкы жаак**. Баш сөөктүн чыккый сөөгү аркылуу астыңкы жаак кошулуп адамдын бе-

тин түзөт. Формасы такага окшош болот. Астыңкы жаакта 16 тиш уясы бар.

ЧЕШУЙКА — кабырчык. Теринин бүдүрүндөгү (сыпь) экинчи морфологиялык элемент. Пара- же гиперкератоздо териде пайда болуучу кабырчыктар.

ЧИСТКА ЗУБОВ — тиштерди тазалоо. Тиштер узакка кызмат кылуусу үчүн аларды кечинде жана эртең менен тамактан кийин щётка жана паста менен жууп туруу керек. Тиштерди төмөнкүчө жууш керек: алды менен колду жууп, анан оозду чайкап, тиш щёткасын жакшылап жууп, щёткага пастаны сыгып, тиштерди жууп баштайт. Щётканы бир эле багытта сүрбөстөн, ар түрдүү (жогорудан ылдый карай, ылдыйдан жогору карай, айландырып) кыймыл менен жуу керек. Күнүгө жууп, врачка жылына эки жолу көрүнүп, тиштерине көңүл бөлүп жүргөн кишилер тиштерин 45–50 секунд жууса жетишет. Тишти 2,5–3,5 мүнөт түз (горизонтал) багытта сүрүп, жууй берсе, тиштин моюнчасынын аймагындагы эмалдын жешилүүсүнө алып келет. Тишти жууп болгондон кийин сөөмөйлөр менен тиштин этин массадаган жакшы, аны үчүн самындап же жөн эле суулап тиштердин катары боюнча сүрүү, тиштин бүйлөсүн укалоо керек.

Ш

ШЕЙКА ЗУБА — тиштин моюнчасы. Тиштин коронка бөлүгүнүн тамырга өтүүчү анатомиялык түзүлүшү, ал эмалдын цементке өтүүчү деңгээли.

ШИНА БОКСЁРСКАЯ — мушкер шакшагы. Спорттук машыгууларда, мелдештерде эрин эзилбесин, тиштери, жаак сөөгү сынбасын үчүн жумшак пластмассадан (Эластопласт, АКР-9, Боксил, ЭГмасс-12, Эладент, АКР 9, ПМ-01, Поливик ж. б.) тиштердин катарын, таңдайды, тиштин бүйлөсүн жаап туруучу шакшак даярдалат. Тиштердин катышы ортогнатиялык болсо, үстүңкү жаакка, ал эми прогениялык болсо астыңкы жаакка жасалат. Бул пластмассалар күкүмдөн жана суюктуктан турат, бир гана Поливик заводдон такта түрүндө даяр

келет, аны ысык сууга салып, жумшартып моделге орноштуруп, ашыкчасын кайчы менен кесип салат.

ШИНА ВАЙСЕНФЛЮ — Вайсенфлю шакшагы. Маңдай тиштер менен кичи азууларга коюлуучу кийме шакшак. Тандайга кабатталган шиштери жасалма коронкага ширетилген гильзага кирип турат.

ШИНА ВАНКЕВИЧА — Ванкевич шакшагы. Тиштери жок астыңкы жаактын сыныгында колдонулуучу шакшак. Анын таянуучу бөлүгү үстүнкү жаакта болуп, андан ылдый карай эки өсүктү астыңкы жаактын тил жагындагы бетине такап, жаак сөөктү туура абалда кармап турууга мүмкүнчүлүк берет.

ШИНА ВАСИЛЬЕВА — Васильев шакшагы. Жоондугу 0,25–0,28 мм болгон дат баспоочу болоттон жасалган илмеги бар тасма. Бул тасма шакшак стандарттуу жасалат. Жаак сөөктөрү сынганда аларды бири-бирине тартып, сөөктүн сынган бөлүктөрүн бекем карматып коюу үчүн колдонулат.

ШИНА ВЕБЕРА — Вебер шакшагы. Жаак сөөгүнүн сыныгында колдонулуучу пластмассадан жасалган тишке жана тиштин бүйлөсүнө таянып туруучу шакшак.

ШИНА ГУНИНГА-ПОРТА — Гунинг-Порт шакшагы. Тиштери жок үстүнкү жана астыңкы жаактар сынганда колдонулуучу бир блок менен жасалган шакшак. Бул шакшактын маңдай бөлүгүндө тамак берүү үчүн тешиги болот. Тешик аркылуу түтүк өткөрүп, пациентке тамак берет.

ШИНА КОЛПАЧКОВАЯ — калпакча шакшак. Маңдайкы тиштерге арналган, штамптоо жолу менен жасалган, бири-бири менен ширетилген, тиштердин коронка бөлүгүнүн жарымына чейин жапкан, ооздон алынбоочу шакшак. Ал тиштер бошоп, кыймылдап баштаганда колдонулат.

ШИНА ЛИМБЕРГА — Лимберг шакшагы. Тиштери жок жаактар сынганда колдонулуучу шакшак. Үстүнкү жаакка өзүнчө, астыңкы жаакка өзүнчө жасалат. Жаактарга орнотулганда оюкча жана устунча менен биригет.

ШИНА ЛОЖКА — ченкеп шакшак. Стоматологиялык аспап, жогорку жаак сынганда убактылуу колдонулат. Түзүлүшү дагарадай чункур болуп, тандайга туура келет.

ШИ́НА МАМЛЮ́КА — Мамлок шакшагы. Маңдайкы тиштер бошоп, кыймылдаганда колдонулуучу шакшак. Эстетикалык жактан жакшы. Себеби, шакшак таңдай же тил жакта жайланышып, алды жактан металл көрүнбөйт, болгондо тиштин өзөгүн алып, каналды кыттоого туура келет. Өзөк жайланышкан каналга шиш кирет, да бошошкон тишти кармап турат.

ШИ́НА НЕСЪЁМНАЯ ИЗ КОРО́НОК — коронкадан жасалган алынбоочу шакшак. Алынбай турган жасалма каптамадан жасалган шакшак. Бошоп, кыймылдап кеткен тиштерди ортопедиялык жол менен дарылаганда жасалма каптамалардан бирин-бири менен ширетип шакшак жасап, цементке коюп коёт. Мындай шакшакты маңдайкы тиштерге жана сол жак, оң жак капталга коёт.

ШИ́НА ПРОТЭ́З — шакшак протез. Тиштердин катарынын кемтигин толуктай турган жана бошогон тиштерди бекемдей турган жасалма тиш. Алар көбүнчө таянып-кармай турган илмектери бар доголуу жасалма тиш болуп эсептелет.

ШИ́НА СТЕПА́НОВА — Степанов шакшагы. Шакшак Ванкевич шакшагына окшош, болгондо пластинка таңдайдын ордуна металлдан дого жасалат.

ШИ́НА ТИГЕРШТЕ́ДТА — Тигерштедт шакшагы. Сөөк сыныктарын кыймылдатпай кармап туруучу шакшак. Аны алюминий зымынан ийип, ар бир пациентке өзүнчө жасашат, бириники бирине туура келбейт. Эки жаакка тең коюу үчүн аны илмектери менен жасап, резинка шакектер менен бириктирет.

ШИ́НА ЭЛЬБРЕ́ХТА — Эльбрехт шакшагы. Тиштерди вестибулярдык жана оралдык жактан кармап туруучу, илмектердин үзгүлтүксүз жабык системасынан турган кийме шакшак. Шакшак тиштердин пародонту ооруганда колдонулат.

ШИ́НИРОВА́НИЕ — шакшактоо. Бир нече же бардык тиштерди, жаак сөөгүнүн сыныктарын шакшактап, кыймылдатпай бириктирип коюу.

ШИНЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ — жаак сөөктөрү үчүн пластмассадан жасалган шакшактар. Жаак сөөгү сынганда, сөөктүн сыныктарын ордуна тууралап коюп, пластмасса шакшакты сынык айыкканча тиштерге орнотуп, бириктирет. Аны бат катуучу акрил пластмассалар «Акрилоксид», «Карбопласт», «Карбодент» менен жасоого болот. Синма тобундагы пластмассадан өз тиштеринин өңүндөй кылып сууга кайнатып жасайт. Ал үчүн калып алып, модель куюп, моделде шакшакты момдон калыптандырып, кюветага гипстеп, момду пластмассага алмаштырат.

ШИПОВИДНЫЕ ЗУБЫ — формасы өзгөрүлгөн тиштер. Сырткы көрүнүшү конуска окшош тиштер.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ МОТОР — жылмалагыч мотор. Ортопедиялык стоматологияда кеңири колдонулат. Мотордун эки жагында эки учтук бар, аларга бекитилген ар кандай аспаптар менен жасалма тиштерди өгөп, тегиздеп, жылмакайлап, жалтыратат.

ШОК — сокку. Организмге өтө чоң күчтүү дүүлүктүргүчтүн таасиринен борбордук нерв системасынын, кан айлануусунун, дем алуунун, зат алмашуунун бузулушуна алып келүүчү, өмүргө коркунуч туудурган, курч башталган патологиялык процесс.

ШОК ТРАВМАТИЧЕСКИЙ — травмалык сокку. Травма алгандан кийин адамдын өңү өзгөрүлүп, бозоруп, муздак тер чыгып, дененин температурасы көтөрүлүшү менен кан басымы төмөндөйт, адамдын алы кетип шалдырап, эсин жоготор абалы.

ШПАТ ПОЛЕВОЙ — талаа шпаты. Калий, натрий, кальцийдин алюмокремний туздарынын өтө көп таралган аралашмасы, стоматологиялык фарфордун негизин түзөт.

ШПАТЕЛЬ — калакча. Бул аспап үчкө бөлүнөт: 1) тиш техникалык, момду отко ысытып кескенге, эриткенге керектелет, металлдан жасалат, жыгач же пластмасса менен сапталат; 2) тиш-врачтык, металлдан же пластмассадан жасалат; цементти, пластмассаны аралаштыруу үчүн колдонулуучу аспап; 3) гипс боткосун аралаштырууга арналган, металлдан жасалат.

ШТАМП — **штамп.** Тиштин тез эригич металлдан жасалган модели. Жасалма каптама жасоо үчүн дат баспоочу металлдан жасалган гильзага киргизип, гильзаны штамптаганда гильза каптамага айланат. Кийме тиштин негизин штамптоодо да колдонулат.

ШТАМПОВКА — **штамптоо.** Металлдын куймасынан жасалма коронкаларды жасоодо колдонулуучу ыкма. Бир нече түрү бар: 1) ички Шарп ыкмасы; 2) сырткы Паркер ыкмасы; 3) аралаш ММСИ ыкмасы. Шарп ыкмасы боюнча жасалма коронканын формасын оной эрий турган металлдан жасап, ошол формага отко күйдүрүлгөн гильзаны салып, анын ичине майда бытыраны салып, соккулоо керек. Ошондо басым гильзанын ичинен таасир кылып, керектүү формага келет. Паркердин ыкмасы боюнча жасалма коронкага басым күчү сыртынан таасир этилет. Ал үчүн тиштин формасы келтирилген гильзаны металл устунчага кийгизип, мольдинге (глицеринге аралаштырылган ак топурак) коюп, басым жасаганда коронка металл устунчанын сыртына жабышып штампталат. ММСИ ыкмасы боюнча ички жана сырткы ыкмалар колдонулуп, жасалма коронка бромштром жана пестик аспабы менен штампталат.

ШТЕРН-КВИК — **штерн-квик.** Стерилдүү аспаптарды ороп коюуга арналган, бир жак бети полиэтиленден жасалган стерилдүү кагаз салфеткалары. Өлчөмү 350•500 мм, 500•700 мм жана 700•1000 мм болот. Германияда чыгарылат.

ШТИФТ — **шиш.** Тиштердин тамырынын каналын дарылаганда аны сапаттуу толтуруу үчүн, кыттоо процессин жеңилдетүү жана тездетүү үчүн күмүш шиш колдонулат. Ошондой эле коронкасы жок, бирок тамырдын каналы толук, жакшы дарыланган болсо, тамырдын айланасында эч кандай патологиялык бузулуулар, өзгөрүүлөр болбосо жана тамырдын узундугу жеткиликтүү болсо ар кандай конструкциядагы шиштүү тиштерди жасоого болот. Мындай шиш дат баспоочу болоттон жана 750 белгидеги алтындан жасалат.

ШТИФТОВЫЙ ЗУБ АМИРАЕВА — Амираевдин шиш тиши. Бир шиши бар башка бардык шиш тиштерден айырмаланган өзгөчөлүгү – Амираевдин шиш тишинин шиши экөө экендиги. Шиш тиштин коронка бөлүгү шакектей жасалып, пластмассаны жакшы кармайт.

ШТИФТОВЫЙ ЗУБ АХМЕДОВА — Ахмедовдун шиш тиши. Белкиндин кураштырылган коронкасына Ахмедов шишти ширетип, шиш тишти пайда кылган.

ШТИФТОВЫЙ ЗУБ ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН — Ильина-Маркосяндын шиш тиши. Башка шиш тиштерден өзгөчөлүгү, тамырдын каналынын айланасына төрт бурчтуу чуңкурча жасаган. Чуңкурча шиш тиштин айланып кетүүсүнө тоскоол болот жана цементтен бошоп кетишине каршылык көргөзөт.

ШТИФТОВЫЙ ЗУБ РИЧМОНДА — Ричмонддун шиш тиши. Бул тиштин өзгөчөлүгү – алды жактан көрүнүп турган металлдан жасалган шакеги. Ричмонд бул тишти бүтүн бойдон алтындан жасаган.

ШТИФТОВЫЙ ЗУБ РИЧМОНДА В МОДИФИКАЦИИ ММСИ — ММСИ өзгөртүүсү менен жасалган Ричмонддун шиш тиши. Өзгөртүүдө жагымсыз болгон шакекти көргөзбөй, табигый тишке окшотуп жасалгандыгында. Ричмонддун тишин асыл металлдан жасайт, тиштин бүйлөсүнөн асыл металлдын кыры көрүнүп турат жана аткаруу жумушу өтө татаал. ММСИ боюнча өзгөрүлгөн шиш тишти дат баспаган болоттон жасайт, металл көрүнбөйт жана аткаруу жумушу жеңил.

Щ

ЩВЯН — **ЩВЯН**. Бул аббревиатураны Clyde H Schuler киргизген, анын орусчасы «щечные верхних», «язычные нижних» (бугорки боковых зубов). Демек, каптал тиштердин уурт жактагы жогорку жана төмөн жактагы тил дөмпөкчөлөрү жөнүндө кеп болуп жатат, дөмпөкчөлөрдү физиологиялык жешилүүгө учурабаган бор машина менен өгөөдө айтылат.

ЩЕКА — уурт. Сырт жагы тери, ички бети былжырдуу кабыкчанын кыры болуп, ооз көндөйүнүн эки капталын түзүп турат. Ушул эки кабаттын ортосунда май бездери жайгашкан (Фардайс бездери), алар чогуу жайланышкандыктан, өңү сары болуп көрүнөт. Бул бездер бала жаңы төрөлгөндө толук (арымдуу) болот.

ЩЕЛЬ РОТОВАЯ — ооз жылчыгы. Жогорку жана төмөнкү эриндин тийишүү сызыгы.

ЩЁТКА ЗУБНАЯ — тиш щёткасы. Тиштерди жакшы сакташ үчүн күнүнө бир же эки жолу жууп туруу керек. Ал үчүн жаш балдарга өзүнчө (эни 7–9 мм, узундугу 18–25 мм), улгайгандар үчүн (эни 7,5–11 мм, узундугу 23–30 мм) өзүнчө чыгарылат. Мурда нукура кылдан жасалчу, азыр көбүнчө жасалма кыл (нейлон, перлон ж. б.) колдонулат. Щётканы жылына 4–6 жолу алмаштырып туруу керек. Күнгө жууган кишиге 45–50 секунд жетет, көп сүрө берсе тиштин эмалы сүрүлүп кетет. Жууганда көбүнчө жогорудан ылдый, ылдыйдан жогору кыймыл жүргүзүү керек. Ошондо тиштер жакшы тазаланат жана тиштин моюнчасында «шынаа» сыяктуу жешилүү болбойт. Щётканы сактаганда суусун силкип, стаканга башын жогору каратып салып коюу керек.

ЩЁЧНЫЙ — уурт жак. Азуу тиштин, жасалма тиштин уурт, каптал жакка караган бети.

ЩИПЦЫ ДЛЯ ПРОКАЛЫВАНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК — металл коронканын вестибуляр бетин тешүү үчүн кыпчуур. Белкиндиң кураштырылган жасалма коронкасын жасаганда вестибуляр бетин тешүү үчүн У. А. Амираев сунуш кылган кыпчуур. Буга чейин металл коронканын вестибуляр бетин бор менен тешкен, ага 68–75 секунд убакыт кеткен. Мында коронка ысып, кол күйүп, кол менен кармоо кыйын, бор металлдан тайып кетип, бармактар жарадар болгон. Сунушталган кыпчуур менен металл коронканы 1–2 секундда тешип койсо болот.

ЩИПЦЫ КРАМПИОННЫЕ — крампондук кыпчуур. Илмектерди бүгүүгө, зымдарды кесүүгө, каптамалардын кы-

рын бүгүүгө, диск кармагычты карматууга ж. б. көп майда жумуштарды аткарууга керектелүүчү аспап.

ЩИПЦЫ КЛЮВОВИДНЫЕ — куш тумшук кыпчуур. Жасалма коронкалар кененирээк болуп калса, алардын кырын бүгүү үчүн колдонулуучу, формасы куштун тумшугундай аспап.

ЩИПЦЫ ЭКСТРАКЦИОННЫЕ — тиштерди жулуу, сууруу кычкачы. Тиштерди жулуу операциясына арналган атайын аспап. Кычкачтын аткара турган жумушуна карай бир нече түрлөрү бар: маңдайкы үстүнкү жана астынкы тиштер үчүн, жогорку жана ылдыйкы азуу тиштер үчүн, акыл азуулар үчүн дагы бир башка. Кычкачтын жардамы менен адамды көп кыйнабай тиштерди оной гана жулуп алса болот. Көлөмү боюнча алар жаш балдарга өзүнчө, чоң адамдарга өзүнчө чыгарылат.

Э

ЭВАКУАЦИЯ — чыгаруу, сордуруу. Денеде пайда болгон суюктукту сордуруу, көндөйдөн чириктерди чыгаруу. Пародонтоз болгондо тиштин бүйлөсүндө пайда болгон ириңдерди чыгарып тазалоо.

ЭВИКРОЛ — эвикрол. Тиштердеги кариестин натыйжасында пайда болгон көндөйлөрдү кыттоо үчүн керектелүүчү күкүм жана суюктуктан турган композиттик материал. Чехияда чыгарылат.

ЭГМАСС-12 — эгмасс-12. Жумшак пластмасса. Мушкерлердин тиштерин, жаак сөөгүн сындырбоо үчүн шакшак жасалат, кийме протез жасалганда былжыр кабыкча жука болгондуктан, протезди кийгенде ооруса, протезге төшөнчү катары экинчи кабат кылып коюлат.

ЭЗОФАГОТОМИЯ — кызыл өңгөчтү кесип коюу. Карындын булчунунун кыймылдоосун, секрециясын ж. б. ишин изилдөөдө колдонулуучу ыкма. Жуткан тамак карынга жетпей кызыл өңгөчтөн түшүп калат. Мындай эксперимент

физиологияда академик И. П. Павлов, стоматологияда профессор И. С. Рубинов тарабынан жүргүзүлгөн.

ЭКВАТОР ЗУБА — **тиштин экватору**. Тиштин коронка бөлүгүнүн эн эле чыгып турган дөнүрөөк жери. Тишке каптама жасаганда экватор жасалбаса, тамакты тиштегенде ал тиштин бүйлөсүн сүрүп, жырып гингивит оорусуна алып келет.

ЭКЗАБАЙТ — **эксабайт**. Асыл металлдардын куймасын даярдоого арналган масса. 15 мүнөттө катат, 1 сааттан кийин ысытып баштаса болот. Куюлган нерсе бардык жагынан жогорку тактыкта чыгат.

ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ — **экзартикуляция**. Муунду ажыратуу.

ЭКЗОПРОТÉЗЫ, ЭКТОПРОТÉЗЫ — **Экзопротездер, эктопротездер**. Беттин жасалма бөлүктөрү – мурун, кулактын калканы, уурт, ээкти жумшак жана катуу пластмассадан калыптандыруучу протездер. Экзопротездер адамдын сырткы көрүнүшүн оңдойт, сүйлөгөнү оңолот, алар психологиялык-эмоциялык эффектке ээ.

ЭКЗОСТОЗ — **экзостоз**. Астыңкы жаактын кичи азуусунун тил жагында сөөктөн дөмпөйүп, кээде шиштей болуп чыгып турган сөөк. Оозго кийме тиш протезин жасаганда экзостозду протез менен басып оорутпоо үчүн протезде экзостоздун көлөмүндөй чункур жасоо керек. Ошондо сөөктүн ушундай дөңчөсүндө былжыр кабыкчанын астындагы катмары жок болгондугуна байланыштуу тамак жегенде протез дөмпөкчөгө такалбайт, оорутпайт. Антпесе протезди кийгенде ошол жерлерге протездин негизи такалып оорутат, жоорутат.

ЭКСКАВАТОР — **экскаватор**. Терапиялык стоматологияда тиштин көңдөйүндөгү чирик ткандарды жана тиштин ташын алуу үчүн аспап.

ЭКСКАВАЦИЯ — **экскавация**. Дененин бир жерине же бөлүгүнө чункур жасоо. Тиш экскаватору менен тиштин көңдөйүндөгү чирик ткандарды, тамактын калдыктарын тазалоо. Кыт же башка бир дарыны коюш үчүн ылайыктуу чункур жасоо.

ЭККОРИАЦИЯ — **эксориация**. Тырмангандан кийин териде калган так; ооз көндөйүнүн былжыр кабыкчасынын бетинде калган сүрүлүүнүн тагы.

ЭКСПЛОЛЕРЫ ИЛИ ЗОНДЫ — **эксплолерлер же зондор**. Тиштин бетиндеги таштарды, тиштин жана кыттын кемтиктерин изилдегенде колдонулуучу учталган учу бир аз бүгүлгөн аспап.

ЭКСПУЛЬСИЯ — **экспульсия**. Имплататты түртүп чыгаруу.

ЭКССУДАТ — **экссудат**. Кан жана лимфа тамырларынын капталы сезгенген, жанчылган убакта сызылып чыккан суюктук. Экссудаттар кандуу (геморрагический), ириндүү (гнойный), фибриндүү (фибринозный), сары суулуу (серозный) болуп бөлүнөт.

ЭКСТИРПАЦИЯ — **экстирпация**. Органды бүтүн бойдон хирургиялык жол менен кесип алып таштоо. Мисалы, тиштин коронкасындагы жана тамырындагы өзөктү аспап менен толук алып таштоо же тишти толук жулуп салуу.

ЭКСТРАКЦИЯ ЗУБА — **тишти жулуу**. Тиштер жарабай калганда, жансыздандыруучу дарыларды сайып, тишти же тиштин тамырын хирургиялык жол менен жулуп салуу. Бул үчүн атайын ыкталган кычкачтар колдонулат.

ЭКФОЛИАТИВНЫЙ ХЕЙЛИТ — **эксфолиативдүү хейлит**. Кызыл эриндин ооруп, түлөшү менен мүнөздөлөт. Себеби нерв системасынын кызматынын бузулушунда. Хейлиттин эки түрү бар: кургак жана суулуу. Бул оору менен көбүнчө аялдар 20 жаштан кийин ооруйт.

ЭКХИМОЗ — **экхимоз**. Кан тамырлардын ооруга чалдыгышына байланыштуу териде жана былжырлуу кабыкчада канталаган жерлердин пайда болушу. Экхимоздун үстүнөн басканда кандуу так кетпейт. Канталоонун убактысына жараша өңү алды менен кызыл анан кызыл-көк, жашыл-сары түскө өтөт.

ЭЛАДЕНТ-100 — **эладент-100**. Күкүмдөн жана суюктуктан турган өтө ийкемдүү, шилекейге туруктуу, базистин пластмассасына жабышкактыгы жакшы пластмасса. Күкүмү винилхлорид менен бутилакрилаттын аралашмасы, ылайлоочу титандын кош кычкылынан туруп, пигмент менен бөлгөн. Суюктугу — диоктифтолат.

ЭЛАСТИК — эластик. Альгинат тобуна кирген калып алуу үчүн чыгарылган ийкемдүү масса. Күкүмдү сууга аралаштырып, ботко кылып, ченкепке салып, оозго коюп, масса каткандан кийин алып, гипстин боткосун калыпка куюп, модель алынат. Ушул сыяктуу массалар азыр өтө көп. Чехияда чыгарылат.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ — серпилмелүүлүк, ийкемдүүлүк. Тышкы күчтүн таасиринде формасын өзгөртүп, тышкы таасир алынгандан кийин мурунку формасына кайра келүүчүлүк.

ЭЛАСТИЧНЫЕ СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — калып алынуучу ийкемдүү материалдар. Бул чоң топко альгинаттуу, силикондуу жана тиоколдуу материалдар кирет. Бул калып алынуучу материалдар «синтетикалык эластомерлер» деп аталат.

ЭЛАСТОПЛАСТ — эластопласт. Хлорвинилсополимердин негизинде бутилакрил кошуп алынган ийкемдүү, жумшак пластмасса. Мушкерлердин тиштерин, жаак сөөгүн сакташ үчүн каптама (каппа) жасашат. Күкүмдөн жана суюктуктан турат.

ЭЛЕВАТОР — элеватор. Тиштерди же анын тамырын чукуп, козголтуп, көтөрүп жулууга арналган хирургиялык аспап. Колдонуусуна жараша тик, бурчтуу жана найза сыяктуу (Леклюз элеватору) болуп бөлүнөт.

ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТЬ ПУЛЬПЫ ЗУБА — тиштин өзөгүнүн электр сезгичтиги. Тиштин нерви бар же жок экендигин билүү үчүн электр тогун колдонушат. Мында микроамперметрдин жардамы менен тиштин нервинин электр тогуна болгон сезимталдыгын аныктоого болот. Өзөктүн сезгичтиги пародонтоз менен ооруганда жогору болсо, кариес менен ооруганда төмөндөй баштап, өзөк чирип кеткенде электр тогуна сезгичтиги таптаза жок болуп калат. Соо тиштин электр тогуна сезгичтиги 3–6 мкА ге барабар болот.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ — электромиография. Булчун эттердин электрофизиологиялык термелүүсүн аныктоо мак-

сатында биопотенциалын жазуу. Булчуң эттин соо же оорукчал абалын жана ортодонтияда кайсы булчуң кандай электрофизиологиялык активдүүлүк менен иштеп жатканын билүү үчүн колдонулуучу ыкма.

ЭЛЕКТРООБЕЗБОЛИВАНИЕ — электр аркылуу оорутпоо. Тиштин каптамаларын жасоо үчүн, кыттоо мезгилинде тиштерди өгөгөндө, тиш пульпит менен ооруганда анын көңдөйүн ачууда колдонулат. Мында токту дене аркылуу ЭЛОЗ-1 аппаратынын жардамы менен өткөрөт.

ЭЛЕКТРОСОН — электр менен уктатуу. Борбордук нерв системасына туруктуу электр тогунун төмөнкү жыштыктагы кубатсыз күчү менен таасир берип уктатып дарылоо ыкмасы. Невроз, кан басымынын өзгөрүп турушун калыптандыруу үчүн, ошондой эле стомалгия, глоссалгия ооруларынын дарылоодо белгилүү натыйжа берет.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ — электрофорез. Гальваникалык ток күчү менен иондолгон дарыны дарылоочу жерге жеткирүү. Тиш жана тиштин этине электрофорез жасоо – физиотерапиялык ыкмалардын ичинен жакшы натыйжа берүүчү ыкма.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА — ооз ичиндеги электр-химиялык бузулуулар. Ооз ичинде ар кандай металлдардын кошулмасы болсо (алтын, дат баспоочу болот, амальгама, күмүш ширетмеси, күмүшпалладий куймасы, платина, нитрид-титан каптамасы ж. б.), ооздун былжыр кабыкчасында ысуу, кызуу, чымчуу, даам сезүүнүн өзгөрүлүшү, электр тогу жүрүп кеткендей сезим пайда болуу, алюминий кашык менен тамак ичкенде көздөн от чагылып кетүү болот. Ашказаны, ичегилери, боору оорукчал адамдарга тез билинет.

ЭЛЬБРЕХТА КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ ГРЭБНЕЙ ПРИ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНОГО РЯДА — тиштердин катарында чектелбеген кемтик болгондо альвеолалык өсүктүн кырынын Эльбрехт классификациясы. Автор альвелоанын кырын төрт түргө бөлгөн: биринчисинде кыр бир аз гана жоюлуп, бети тегиз болот, экинчисинде жоюлуу ары жагында (дис-

тально) көп болот, үчүнчүсүндө жоюлуу бери жагында (медиадно) көп болот, төртүнчүсүндө альвелалык өсүк көп жоюлуп, борбору чуңкур болот.

ЭЛЬЦЕБОНД ССV — эльцебонд ССV. Алынбоочу протездерди каптоо үчүн композициялык материал. Нур энергиясы менен полимерленет. Германиянын «Шульц-Дентал» фирмасы чыгарат.

ЭМАЛЬ — эмаль. Организмдеги эң катуу сөөк болуп эсептелет. Катуулугу жагынан кварц менен апатиттин аралыгында, дат баспоочу болоттон катуу. Тиштин коронкасын сыртынан каптап, тышкы дүүлүктүргүчтөрдөн сактайт. Курамы 4% органикалык заттардан, 94% органикалык эмес заттардан жана 2% башка туздардан турат.

ЭМБОЛИЯ ВОЗДУШНАЯ — аба эмболиясы. Көк тамыр жарааттанганда, аба кан тамырдын жолун тосуп калып кан жүрбөй калат. Бул адамга кан же башка дарыны шприц же система аркылуу куйганда же тишти жулуу үчүн лидокаин же башка анестетик менен жансыздандырганда аба тамырга кирип кетүүсүнөн болот.

ЭМФИЗЕМА ЛИЦА И ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА — ооздун жана беттин шишиши. Бет жана ооз көндөйүнө абанын кирип кетиши шприц аркылуу болот. Кээ бир убакта жулунган тиштин ордуна жана гаймор көндөйүнүн жарааттануусунда аба кирип, оору күчөп кетет.

ЭНДОДЕНТ — эндодент. Тиштин тамырынын каналдарын толтуруп, кыттоочу материал. Курамында эпоксид чайыры жана суу жуктурбай турган касиетке ээ катыргычтар жана толтургучтар (рентген сүрөтүндө көрүнүүчү барий сульфаты) болот.

ЭНДОДОНТИЯ — эндодонтия. Тиштин өзөгү менен периодонттун ооруларын дарылоо жолу. Тиштин тамырынын каналын сапаттуу жана зыянсыз дарылоо материалдарын изилдөө, каналды тазалай турган жана кыттай турган аспаптарды ойлоп табуу, күндөлүк иштелип келе жаткан ыкмаларды жакшыртуу боюнча изилдөө жүргүзүүчү стоматологиянын бөлүмү.

ЭНДОПРОТЕ́ЗЫ — эндопротездер. Беттин келбетин ондоо үчүн булчундун, теринин астына коюлуучу жумшак пластмассадан же башка материалдан жасалуучу протездер. Эндопротез түшүнүгүнө жасалма көз да кирет.

ЭОДЭ́НТ — эодэнт. Тиштин тамырындагы каналды кыттоо үчүн колдонулуучу паста.

ЭПИДЕРМО́ИД ВРОЖДЁ́ННЫЙ (ПУЗЫРЧА́ТКА ВРОЖДЁ́ННАЯ) — тубаса эпидермоид (тубаса ыйлаакча). Зат алмашуу жана тамак синирүү процесстеринин бузулушунун натыйжасында пайда боло турган териде жана былжырлуу кабыкчада болуучу оору. Бөртүк жарылгандан кийин орду таксыз айыгат, ал эми колдун тырмагы күңүрт тартып калат. Оору баланын жыныс мүчөсү жетиле баштаганда кайтат.

ЭПИКРИ́З — туюндурма. Оорунун себеби, түрү, дарылоо ыгы жана эмне менен аяктагандыгы тууралуу оорунун тарыхына жазыла турган дарыгердин акыркы ой-пикири.

ЭПИТЕЛИА́ЛЬНЫЙ СЛО́Й — эпителий кабаты. Терини, безди жана ооз ичиндеги былжырлуу кабыкчаны каптап турган катмар. Эпителий клеткалары түлөп түшүп тургандыктан, дайыма жанырып турат. Айрыкча мындай көрүнүштөр тандай, тил, тиштин этинде анык билинип турат.

ЭПИТЕЛИ́ЗАЦИЯ — эпителийлешүү. Ооз ичиндеги былжырлуу кабыкчанын же теринин жарааттанган бетинде эпителий кабаты пайда болуп, айыга башташы.

ЭПОКСИ́ДНЫЕ ПЛОМБИ́РОВО́ЧНЫЕ СОСТА́ВЫ — эпоксиддүү кыттоочу кошундулар. Алар чайырлардан, катыруучу суюктуктан жана толуктоочулардан (фарфор уну, силикатцементтин күкүмү) турат. Бул кошундулар жакшы кыт болот жана коронка, көпүрөчө протездерди бекитүүгө болот.

ЭПУЛИ́С — эпүлис. Бүйлөнүн шишик оорусу. Табияты боюнча ар түрдүү процесстерден туат. Мисалы, фибромага же бириктирүүчү ткандардын сезгенүүсүнөн пайда болгон шишикке окшош.

ЭРГОНО́МИКА В СТОМАТОЛО́ГИИ — стоматологиядагы эргономика. Анын мааниси зор. Адистин эмгек абалын

жакшыртуу максатында адамдын функциялык мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөчү илим. Эмгек өндүрүмдүүлүн арттырып, дарыгердын жумушка деген аракетин жогорулатуу, ден соолугун сактоо – ушул илимдин бирден-бир милдети.

ЭРИТЕМА — кызаруу. Териде жана былжырлуу кабыкчада байкалуучу бир жердин кан тамырлары жарылгандан келип чыккан кызарыңкы тарткан жер. Көлөмү 1,5 см ден чоң болсо эритема, ал эми кичине болсо Розеола деп атайт. Эритемага күйүк, кызамык, скарлатина жана башка оорулардагы ооз көңдөйүндө кездешүүчү кызыл тактар кирет.

ЭРИТЕМА МНОГОФОРМНАЯ ЭКССУДАТИВНАЯ — көп түрдүү суулуу кызаруу. Бул негизинен инфекциялык аллергиялык ооруга кирет. Кээ бир кишилерде жаз, күз мезгилинде кайталанып турат, ооз көңдөйүнүн 65% жарааттанып кетет. Оору күчөгөндө териде жана ооз ичинде ар түрдүү элементтер – тактар, кызаруулар, ыйлаакчалар, жаралар, кабырчыктап түлөөлөр, ууртта бат-бат канаган жаралар пайда болот, алардын сырткы бети кызыл-күрөң болуп картанып кабырчыктанат.

ЭРОЗИЯ ЭМАЛИ — эмалдын эрозиясы. Тиштин эмаль катмарынын механикалык сүрүлүүнүн натыйжасында тышкы дүүлүктүргүчтөргө болгон сезгичтиги. Көбүнчө тиштердин көбү түшүп калганда жасалган кийме тиш протезиндеги зым илмек эмалдын бетине келсе бир топ убакыт өткөндөн кийин эмалдын сезгичтиги пайда болот. Ошондуктан жаштарга кийме тиш протездерин жасаганда илмек койгон тиштерге алды менен жасалма коронка коюп анан протездин илмеги коюлат. Эмалдын эрозиясы тиштердин патологиялык жешилүүсүндө да болот. Эрозия илмектен болгондо ал тиштин капталында жайланышат, ал эми патологиялык жоюлууда тиштердин кесүү, чайноо бетинде болот.

ЭСТЕДЕНТ — эстедент. Харьковдогу медициналык полимерлер жана стоматологиялык материалдар заводунан чыгуучу сүрүлүүгө бек пластмасса. Ушул пластмассадан кийме тиш протездерине жасалма тиш жасашат. Ал сүрүлүүгө чыдамдуу болушу менен бирге өз тиштерге окшоп жаркыл-

дап турат. Себеби анын химиялык негизин фторлуу сополимер менен полиметилметакрилаттын жалгашылган аралашмасы түзөт. Эстедент-02 улгайгандар үчүн жана Эстедент-Д балдар үчүн чыгарылат.

ЭТАКРИЛ — **этакрил**. Тиштердин бардыгы же көбүрөгү түшкөндө кийме тиштин негизин этакрил пластмассасынан жасайт. Ошондой эле ортодонтиялык жана бет-жаак аппараттарын жасаганда керектелинет. Курамы күкүм жана суюктуктан турат. Күкүмдүн курамында полиметилметакрилат, суюктугунда акрил мономер бар.

ЭТЕСТ — **этест**. Аспаптарды стерилдөөдө автоклавка коюп стерилдөө цикли туура экендигин текшерүүчү аспап. АКШда чыгарылат.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖЕВАНИЯ — **чайноонун натыйжалуулугу**. Чайноо аппаратынын иштөөсүнүн баалуулугунун көрсөткүчү. Чайноонун натыйжалуулугун белгилүү убакта канча тамак чайнала тургандыгына карата билсе болот. Аны статикалык жана функциялык жол менен аныктайт. Статикалыкты Габер, Агапов, Оксман, Курляндский, Вустров, Мамлок, Дюшанз, Пиккерейль ал эми, функциялыкты Христенсен, Гельман, Рубинов сунуш кылышкан

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ — **тиш салуунун эффективдүүлүгү**. Эффективдүүлүк пациенттин сөзүнөн билинет, жасалма тиштин жарашыгы, жаакта жакшы кармалып, тамакты чайнашы жана тилдин, жаак булчундарынын чарчабай иштеши менен аныкталат.

ЭЧИНГ-ПЕЛЛЕТС — **эчинг-пеллетс**. Кебезден тоголоктолуп, цилиндр өңдүү жасалган, стерилденген оромолор. Алар кичине, орто жана чоң болот. Германияда чыгарылат.

ЭХООСТЕОМЕТРИЯ — **эхоостеометрия**. Астыңкы жаактын сөөгүнүн тыгыздыгын аныктоочу ыкма. Стоматологияда ЭОМ-ОЦ эхоостеометри колдонулат. Ыкма жаак сөөгү сынганда, пародонтитте, кулгуна оорусунда жаак сөөгүнүн абалын билүүгө жана дарылоо мезгилинде сөөктүн айыгуу процессинин кандай өтүп жатканын көзөмөлдөп турууга мүмкүндүк берет.

Ю

ЮИНГА САРКОМА — Юинг саркомасы. Көбүнчө жаш балдарда жана өспүрүмдөрдө кезигүүчү, бириктирүүчү ткандардан өсүп чыккан өтө коркунучтуу шишик. Көрүнгөн сырткы шишиктен, сөөктүн жооноюшунан бөлөк, шишик ооздун ичине өтүп, тиштерди бошотуп, кыймылдатып, ооздун ичине жаралар чыгат. Кээде шишик тиштин себебинен болгон кулгунанын белгиси болот.

ЮПИТЦА ЦИРКУЛЬ — Юпитц циркулу. Беттеги белгилүү бир аралыкты чоң жана кичине бөлүктөргө бөлүү үчүн Юпитц сунуш кылган үч буттуу циркуль. Тиштери жок адамдарга кийме тиш протезин жасаганда беттин ылдыйкы бөлүгүн туура табуу үчүн колдонулат. Ал үчүн адам оозун чоң ачат, циркулдун бир бутун ээкке коёт, экинчи четки бутун мурундун учуна коёт, ошондо ортонку буту жогорку эринге тийип калат. Анан оозду жаптырып, ортонку бутун мурундун учуна келтиргенде, беттин ылдыйкы бийиктиги аныкталат. Акыркы бийиктик прикус бийиктиги деп аталат. Бул ыкма антропометриялык деп аталат, мында каталыктар көп кездешет.

Я

ЯЗВА — күлапса. Ооз көндөйүндөгү былжырлуу кабыкчанын эпителий (эң жогорку) катмарынан башталып, тереңдеп, булчуң эттерге чейин жете турган патологиялык процесс. Жара экинчи морфологиялык процесс, анын түбү, капталы, кыры болот.

ЯЗВА ДЕКУБИТАЛЬНАЯ — декубиталдык жара. Туура эмес жасалган тиш протезинин кырларынын сүрүүсүнөн, кыпчуусунан, курч кырдуу тиштерден, кыттардан пайда болгон оюк жара.

ЯЗВА ТРОФИЧЕСКАЯ — азыктануунун начарлануусунан боло турган жара. Көбүнчө жүрөк, кан тамыр оорулары

менен коштолот. Жаранын кыры тегиз болбойт, түбүн аксур келген чириги бар тактар басат. Жара ооз көндөйүнүн бардык жерине жайылуусу мүмкүн.

ЯЗВА ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ — кургак учук жарасы. Ооз көндөйүнүн, мурундун, көтөн чучуктун, сырткы жыныс органдарынын былжырлуу кабыкчаларында жана аларга жакын жайланышкан териде кызыл түстөгү, көп майда түйүндөр пайда болот. Ошол түйүндөрдүн жарылып биригип, канап турган жарага өтүшү жаранын кырында Трел чекиттеринин пайда болушу менен мүнөздөлөт.

ЯЗЫК — тил. Даам билүүчү орган, чайноо жана сүйлөө кызматына да катышат. Чайнаганда тамакты оң жакка жана сол жакка аралаштырып турат.

ЯЗЫК ДЕСКВАМАТИВНЫЙ — түлөгөн тил. Тилдин сырткы кабатынын жипке окшоп күбүлүп түшүшү. Тилдин ооруган жери кызарып, ар кандай тактардын болушу менен соо жеринен айырмаланып турат. Ошондуктан мындай тилди «географиялык» деп айтышат.

ЯЗЫК ПЕНИЦИЛЛИНОВЫЙ — пенициллиндин таасиринен болгон тил оорусу. Бул оору пенициллинди көп кабылдагандан болот. Канталап кызарган тилдин бети жалтырак келет. Тил дайыма ысып, кызып туруусу менен өзгөчөлөнөт.

ЯЗЫК ПРИ УРЕМИИ — уремиядагы тил. Ооз, тил кургайт, тилдин бети кызарып тактар пайда болот, тилдин капталы шишийт. Оору күчөгөндө жаралар пайда болот.

ЯЗЫК СКЛАДЧАТЫЙ — катмарлуу тил. Тилди караганда терең катмарлар көрүнөт, ал адамдын тынчын албагандыктан, ага көп көңүл бурушпайт.

ЯЗЫК ЧЁРНЫЙ — кара тил. Ушул убакытка чейин себеби белгисиз, өтө сейрек кездешүүчү оору. Тилдин үстүндө жипке окшош кара түктөр пайда болот, ал узарып, жооноёт. Өңү кара-күрөң болуп сыртынан караганда «чачка» окшоп кетет.

ЯЗЫКОЗАЩИТНИК — тилди коргогуч. Астынкы жаактын чоң жана кичи азууларын жасалма коронка салуу үчүн

өгөгөндө тилди коргоп, кесип кетүүдөн сактап туруучу күрөккө окшош аспап.

ЯНСОНА БИОНАТОР — Янсондун бионатору. Бул ортодонтиялык аппарат астыңкы жаактын артта калуусунда (дистальный прикус) жана жаактын мандайкы тиштеринин алдыга карап (протрузия) калуусунда колдонулат. Аппараттын максаты – эрин менен уурттун, тиштердин ортосунда туруп калбасы жана эриндердин кымтылып турушу үчүн астыңкы жаактын өсүшүн өрчүтүү, үстүңкү жаактын өсүшүн токтотуу.

ЯТРОГЕНИЯ — ятрогения. Врачтын туура эмес мамилесинен, сөзүнөн пациенттин көп ойлонуп, психикасынын өзгөрүлүп, кайгы тартуусу.

ЯЧЕЙКА ЗУ́БА — тиштин уясы. Жаактын кырындагы тиштердин орду. Тиштин тамыры менен жаак сөөгүн бириктирүүчү ткандан турган байламталар бириктирип турат жана тишке түшкөн басымдын күчүн азайтат.

ЯЦУ́Р — шарп. Эпидемиялык оозул. Ооруган малдын (ири мүйүздүү мал, төө, чочко) сүтүндөгү, шилекейиндеги вирус адамга жугуп, оорунун башталышына себеп болот. Ооруганда башы ооруп дене ысыйт. Ооз көңдөйүндө алды менен тактар пайда болот, анан алардын ордуна ыйлаакчалар чыгат, ыйлаакчалар жарылып, жарага айланат.

МАЗМУНУ

А

Абдукция	4
Абразивные инструменты	4
Абразивные материалы	4
Абразивный хейлит Манганотти	4
Абразия	4
Абсолютная сила жевательных мышц	4
Абсорбция	5
Абсцесс	5
Авитаминоз	5
Авиценна	5
Автоклав	6
Аггравация	6
Агевзия	6
Аглоссия	6
Агнатия	6
Агранулоцитоз	6
Адамантинома	6
Адамантома	6
Адаптация	6
Адаптация к съемному пластиночному протезу	6
Адгезия	6
Адгезионный мостовидный протез	7
Адгезор	7
Адгезор карбофине	7
Аддукция	8
Аденоиды	8
Аденокарцинома	8
Аденома	8
Аденофлегмона	8
Адентия	8
Адреналин	8
Аквамерон	8
Аква-сем	8
Аккумикс и аккуфлекс	9
Аккумуляция	9

Акрел	9
Акрилаты	9
Акриловые стоматиты	9
Акрилоксид	9
Акродент	10
Акродент-2	10
Акромегалия	10
Акронил	10
Акрон М Си	10
Акро-сеп	10
Акр П	11
Активатор Вундерера	11
Активатор Хофмана	11
Активаторы Андресена-Гойпля	11
Актиномикоз	11
Аллергический стоматит	11
Аллергия	11
Алокс	12
Алоэ	12
Алустрал	12
Альвеола зуба	12
Альвеолит	12
Альвеолотомия	12
Альвеолэктомия	12
Альвеолярная дуга	12
Альвеолярная пиоррея	13
Альвеолярный отросток челюстей	13
Альгидур	13
Альгинатные слепочные материалы	13
Альтерация	14
Альфакост 2	14
Амальгама	14
Амальгама медная	14
Амальгама серебряная	14
Амортизаторы	14
Амоцид	14
Ампутация верхушки корня зуба	14
Ампутация пульпы	14
Анальгин	14

Анамнез	15
Анастомоз	15
Анатомические образования нижней трети лица	15
Анатомический метод определения высоты прикуса беззубых челюстей в положении центральной окклюзии	15
Анатомо-физиологический метод определения высоты прикуса беззубых челюстей в положении центральной окклюзии	15
Анатомо-функциональный метод определения высоты прикуса беззубых челюстей в положении центральной окклюзии	16
Анафилаксия	16
Анафилактический шок	16
Ангина	16
Анестезин	16
Анестезия	17
Анкилоз	17
Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава	17
Аномалия	17
Аномалия прикуса	17
Антиверсия	17
Антидот	18
Антимикробные агенты	18
Антисептики	18
Антиоксиданты	18
Антропометрические ориентиры	18
Антропометрический метод определение высоты прикуса беззубых челюстей в положении центральной окклюзии	19
Апекс	19
Аплазия	19
Аппарат ГР-2 (Гальванизатор ротовой)	19
Аппарат д'Арсиссака	19
Аппарат Бойслера и Шредера	19
Аппарат Джонсона	20
Аппарат ДКС-2М (Диатермокоагулятор стоматологический)	20
Аппарат Ларина	20

Аппарат литейный	20
Аппарат Луч-2	20
Аппарат Лури	20
Аппарат Мершона	20
Аппарат наркозный	20
Аппарат Оксмана	21
Аппарат Петросова	21
Аппарат рентгеновский	21
Аппарат рентгеновский дентальный	21
Аппарат рентгеновский дентальный панорамный	21
Аппарат репонирующий А. Я. Катца	21
Аппарат репонирующий В. Ю. Курляндского	21
Аппарат ретенционный	21
Аппарат В. В. Рудько	21
Аппарат Самсона	21
Аппарат «Ультразвук»	22
Аппарат функциональный Буни	22
Аппарат Ходорович-Бургонской	22
Аппарат Хорошилкиной	22
Аппарат Хургиной	22
Аппарат Эйнсворта	22
Аппарат ЭЛОЗ-1	22
Аппарат Энгля	22
Аппараты замещающие	23
Аппараты исправляющие	23
Аппараты комбинированные	23
Аппараты механического принципа действия	23
Аппараты направляющие	23
Аппараты ортодонтические	23
Аппараты ортодонтические пластиночные съёмные	23
Аппараты разобщающие	24
Аппараты фиксирующие	24
Аппараты формирующие	24
Аппараты функционального принципа действия	24
Аппараты ЭОМ-3 (электрооднотометр), ЭОД (электроодонто-диагностика)	24
Апликация	24
Аргил	24

Арома файн	24
Артикулятор	24
Артикуляционная бумага	25
Артикуляционная пятерка Ганау	25
Артикуляция зубов	25
Артикуляция челюсти	26
Артралгия	26
Артрит височно-челюстного сустава	26
Артроз височно-челюстного сустава	26
Артропатия	26
Асептика	26
Ассиметрия лица	26
Асфиксия	27
Аттачмен	27
Аттачмен Рооха	27
Атерома	27
Атропин	27
Атрофия	27
Аурит	27
Аутогемотерапия	27
Афония	28
Афта	28
Аффинаж	28
АХД 2000 — специаль и лизанин	28
АЦ-1 лак разделительный	28

Б

Баббиты	28
Базальная дуга	28
Базальная мембрана	28
Базис протеза	29
Базисы с прикусными валиками	29
Бакрил	29
Баллонизирующая дегенерация	29
Балочное крепление протеза	29
Барлова болезнь	29
Бегодур	30
Бегостал	30

Беднара афты	30
Бейсик	30
Беллагель О	30
Беладонт	30
Бернара токи (диадинатерапия)	30
Би краун моляр кит	30
Биокрон, биоплюс	31
Биопсия	31
Биостабил, Артиплюс	31
Биостимуляторы	31
Бипрогнатия	31
Бисико	31
Бифуркация	31
Боксил экстра	32
Болезнь	32
Болезнь Вакеза	32
Болезнь Верльгофа	32
Болезнь Боуэна	32
Болезнь Лайелла	32
Болезнь Леттера-Зиве	32
Болезнь Микулича	33
Болезнь Педжета	33
Болезнь слюннокаменная	33
Болезнь Танисона	33
Болезнь Таратынова	33
Болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена	33
Боли гетеротопические	33
Болтающийся гребень	33
Боль	34
Бормашина	34
Бородавчатый предрак красной каймы губ	34
Борозда десневая	34
Брекет система	34
Бромштром и пестик	34
Бруксизм	34
Бруцеллёз	35
Бугорок	35
Бугорок альвеолярный	35
Бугорок суставной	35

Бура	35
Бутадион	35
Буферные зоны	35
Бюгель	36
Бюгельный протез	36
Бюгодент	36

В

Валюкс плюс	36
Ван стэп	36
Вариант	36
Васкулит геморрагический	37
Везикулярный стоматит	37
Вектрис	37
Венечный отросток	37
Вест джи	37
Вибробери	37
Вивоперл-пе	37
Вигален-30	38
Викарная функция	38
Викасол	38
Викопрес	38
Виниры	38
Виноксол	38
Винты ортодонтические	38
Вировест	38
Вирон 88	39
Височно-нижнечелюстной сустав	39
Висфат цемент	39
Вита акцент	39
Вита вакумат	39
Вита люмин вакуум	39
Витальная ампутация пульпы (пульпотомия)	40
Витальная экстирпация	40
Вита омега 900	40
Витадур	40
Витакрил	40
Витафтор	40

Витребонд	40
Вкладки	40
Вкус	41
Влияние разнородных сплавов металлов на слизистую оболочку полости рта	41
Водяной рак (нома)	41
Воколоид	41
Вокосепт	41
Вокотемп	42
Волдырь	42
Воск	42
Воспаление	42
Время затвердевания	42
Всасывание	42
Вторичная (привычная) центральная окклюзия	42
ВТ-100	43
Вывих височно-нижнечелюстного сустава	43
Вывих зуба	43
Выравнивающий протез	
Высота относительного физиологического покоя	43
Высота прикуса	43
Вязкость	43
Вялое жевание	43

Г

Гайморит одонтогенный	44
Галлодент-М	44
Гальванизация	44
Гальванопластика	44
Гальваностегия	44
Гамма	44
Гангрена	44
Гастрит	44
Гексорал, элюдрил	44
Гелин	45
Гемангиома	45
Гематома	45
Гемигипертрофия	45

Гемисекция	45
Гемофилия	45
Гениопластика	45
Гепарин	45
Гербста метод	46
Геркулайт	46
Герметики	46
Герпес	46
Гигиена полости рта	46
Гидротерапия	46
Гильзы	46
Гингива ликвид	47
Гингивит	47
Гингивит гипертрофический	47
Гингивит катаральный	47
Гингивит язвенный	47
Гингивопластика	47
Гингивотомия	48
Гингивоэктомия	48
Гиперальгезия	48
Гипердонтия	48
Гиперэстезия твердых тканей зуба	48
Гиперкератоз красной каймы губ ограниченный предраковый	48
Гиперкинез	48
Гиперостоз височно-нижнечелюстного сустава	49
Гиперплазия	49
Гиперсаливация	49
Гиперцементоз	49
Гипоксия	49
Гипоплазия эмали	49
Гипосаливация	49
Гипс медицинский	50
Гипсовочная комната	50
Гипсогал	50
Гипсол	50
Глабелла	50
Глазурь	50
Глас спан	50

Глейз	50
Глория специал	51
Глоссальгия или глоссодиния (стомалгия)	51
Глоссит	51
Глоссоптоз	51
Глотка	51
Глубокий прикус	51
Гнатодинамометр	51
Гнатостат	52
Гнатосхизис	52
Гнусавость	52
Гонококковый стоматит	52
Госсил, Силэп	52
Гранулема на верхушке корня	52
Грат	52
Гребень альвеолярный	52
Гребень альвеолярный болтающиеся	52
Грязелечение	53
Губа	53
Губа двойная	53
Губа заячья	53
Гуттаконденсор	53
Гуттаперчевые штифты	53

Д

Давление жевательное	53
Дайркет сем	53
Дарсонвализация	53
Девит-арс	54
Девитализация	54
Дегенерация	54
Дегувест софт, Дегувест Н10	54
Дегуфлекс	54
Дезинфекция	54
Дезодорация	54
Дезокклюзия	54
Декальцификация	54
Декомпенсация	54

Декубитальная язва	55
Демаркация	55
Деминерализация	55
Денс нобилис	55
Дента	55
Дентакол	55
Денталон плюс	55
Дентафикс	55
Дентафоль	56
Дентикль	56
Дентиметр, биндрат	56
Дентин	56
Дентин для повязок	56
Дентин паста	56
Дентипласт	56
Деонтология	57
Депурал	57
Дерипласт	57
Дерматоз	57
Десенсибилизация	57
Десквамация	57
Десна	57
Десна прикрепленная	57
Десна свободная	57
Дёсовая жидкость	58
Деструктивный процесс	58
Детазил	58
Детатрин	58
Дефекты зубных рядов	58
Дефекты коронок зубов	58
Дефекты нёба	58
Деформация	59
Джелтрейт, Джелтрейт плюс	59
Джексона кламмер	59
Диагноз	59
Диагностические модели	59
Диаграмма Хаулея-Гербста	59
Диалог	59
Диастема	59

Диатез геморрагический	59
Диатермия	59
Дивергенция	59
Диеты профилактические в стоматологии	60
Дизартрия	60
Дикаин	60
Диоксивисфат	60
Дисбактериозы	60
Дисбиоз, биоценоз, микробиоценоз	60
Диспансеризация	60
Дисплазия Капдепона	61
Дистопия	61
Дистрофия	61
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава	61
Дондерса пространство	61
Дрильборы	61
Дробители нагрузок	61
Дуга альвеолярная	61
Дуга базальная	61
Дуга зубная	62
Дупло	62
Дурогал	62

Ж

Жаберные дуги	62
Жаропонижающие средства	62
Жевание	62
Жевательное давление	62
Железы	63
Желобок десневой	63
Желудок	63

З

Заболеваемость	63
Заболевания нервов челюстно-лицевой области	63
Заболевания пародонта	63
Завеса резиновая	63

Загипсовка моделей в кювету	63
Заеда	65
Закалка	65
Законы Бонвиля	65
Законы (пятерка) Ганау	66
Защита препарированных зубов	66
Зерна Треля	66
Зетаплюс	66
Змент	66
Золото	66
Зонд	67
Зондирование	67
Зоны безопасности зубов	68
Зубная бляшка	68
Зубная имплантация	68
Зубная киста	68
Зубной камень	68
Зубной эликсир	68
Зубные капли	68
Зубные нити (флоссы)	68
Зубные протезы	69
Зубодесневой карман	69
Зубочистки	69
Зубы	69
Зубы боковые	69
Зубы Гетчинсона	69
Зубы диаторические	69
Зубы импактные	70
Зубы искусственные	70
Зубы комбинированные	70
Зубы мудрости	70
Зубы передние	70
Зубы пластмассовые	70
Зубы ретинированные	70
Зубы фарфоровые	70
Зубы штифтовые	71

И

Иваклар	71
Ивакрил	71
Иглотерапия	71
Идиопатический	71
Идиосинкразия	72
Измерение электрических потенциалов (или микротоков) в полости рта между металлами, металлами и другими участками тела	72
Изоидент	72
Изолирующие материалы	72
Иммедиат протез	72
Иммобилизация	72
Иммунитет	73
Импетиго	73
Имплантат	73
Имплантация в ортопедической стоматологии	73
Импрегнация	73
Ингибитор	73
Индекс восстановленности коронки зуба (ИВКЗ)	73
Индекс гигиены Федорова и Володкиной	74
Индекс диастолический (ДС)	74
Индекс дикротический (ДИ)	75
Индекс папиллярно-маргинально- альвеолярный (РМА)	75
Индекс пародонтальный (РИ)	75
Индекс периферического сопротивления (ИПС)	76
Индекс Пона	76
Индекс разрушенности окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ)	77
Индекс реографический (РИ)	77
Индекс состояния растяжимости сосудистой стенки в единицу времени (ИРЕС)	77
Индекс эластичности (ИЭ)	77
Индивидуальная ложка по Боянову	77
Инициаторы	77
Инклюзия зуба	77
Инородные тела	78
Инструменты для прохождения корневого канала	78

Инструменты для расширения корневого канала	78
Инструменты для расширения устья корневого канала	78
Интактный	78
Интеграция костная	78
Интеграция фиброзная (фиброинтеграция)	78
Интоксикация одонтогенная	79
Интрадентально	79
Инцизион	79
Инfiltrат	79
Инfiltrация	79
Инфрадентале	79
Инфраокклюзия	79
Инъекция	79
Ионосцел	79
Иррадиация	79
Ирригация	80
Искусственные зубы	80
Исследования инструментальные и лабораторные	80
История болезни	80

К

Кайма красная	81
Калвелиса пластинка	81
Калсинол	81
Кальмецин	81
Кальцин-паста	81
Камень зубной	81
Камперовская плоскость, линия	81
Канал корня зуба	82
Кандидоз	82
Каналонаполнитель Lentulo	82
Кандидомикоз	82
Канинон	82
Канцерогенные вещества	82
Каолин	82
Каппы лечебные	82
Карат	82

Карбоко	83
Карбопласт, карбопласт-М	83
Карбункул лица	83
Кариес зуба	83
Кариес ретроградный	83
Кариес фиссурный	83
Кариес циркулярный	83
Кариесрезистентность	83
Кариосан	83
Каркас бюгельного протеза	83
Каркас мостовидного протеза	84
Карман пародонтальный	84
Катаральное воспаление	84
Кварц	84
Квинке отёк	84
Келлоид	84
Керамика	84
Керамика гидроксиапатитная	84
Керамикор	85
Керамиксепаратор	85
Кератозы	85
Керомеры	85
Кетак-сем	85
Киста	85
Кистогранулёма	85
Кламмер	85
Кламмер Адамса	85
Кламмер Аккера	86
Кламмер Аккер-Роуча	86
Кламмер Бонвилля	86
Кламмер Джексона	86
Кламмер Кемени	86
Кламмер непрерывный	86
Кламмер Рейхельмана	86
Кламмер Роуча	86
Кламмеры опирающие	86
Кламмеры системы Ней	87
Клапан замыкающий	87
Классификация беззубой верхней челюсти А.И.Дойников	87

Классификация беззубой нижней челюсти Келлера	87
Классификация беззубых челюстей В. Ю. Курляндского	87
Классификация беззубых челюстей И. М. Оксмана	88
Классификация беззубой верхней челюсти Шрёдера	88
Классификация дефектов зубного ряда У. А. Амираева	89
Классификация дефектов зубного ряда А. И. Бетельмана	89
Классификация дефектов зубного ряда Е. И. Гаврилова	90
Классификация дефектов зубного ряда А. Л. Грозовского	90
Классификация дефектов зубного ряда Кеннеди	91
Классификация дефектов зубного ряда Л. М. Перзашкевича	91
Классификация дефектов зубного ряда В. А. Пономаревой	91
Классификация кариозных полостей зубов по Блеку	91
Классификация переломов верхней челюсти по Ле Фору	92
Классификация переломов верхней челюсти по В. Ю. Курляндскому	92
Классификация переломов нижней челюсти по В. Ю. Курляндскому	92
Классификация переломов верхней челюсти по И. Г. Лукомскому	92
Классификация переломов нижней челюсти по Д. А. Энтину	93
Клиническая шейка	93
Клинический анализ крови	93
Клиновидный дефект	93
Клыки	93
Кобальтохромовые сплавы	93
Когезия	94
Кожный рог	94
Колпачки защитные	94
Коллапс	94

Кома	94
Комок пищевой	94
Компактоостеотомия	94
Компенсация	94
Композитные пломбировочные материалы	95
Компомеры	95
Компосайт	95
Коналор	95
Конвергенция	95
Конденсор	95
Кондилион	95
Конкремент	95
Консистенция	95
Консольный протез	95
Контакт межзубной	96
Контакт окклюзионный	96
Контакт окклюзионный преждевременный	96
Контаминация	96
Контрактура челюстей	96
Коплика-Филатова пятна	96
Корень зуба	96
Корка	96
Корневые штифты	96
Коронка зуба	96
Коронка искусственная	97
Коронкосниматель	97
Коронки телескопические	97
Коррекция окклюзии	97
Коррекция протеза	97
Коррентил	98
Коррозия	98
Крампон	98
Красная волчанка	98
Красный плоский лишай	98
Краудинг	98
Кремний	98
Крепитация	99
Крепление замковые	99
Кривые окклюзионные компенсационные	
Шпея, Уилсона	99

Криотерапия	99
Кровотечение из лунки	99
Ксеростомия	99
Культа	99
Культа искусственная	99
КУ-ПЛЦ	100
Купровент	100
Кутикула	100
Кювета	100
Кюрета	100
Кюретаж	100

Л

Лаборатория зуботехническая	100
Лазер	101
Лайф	101
Лак стоматологический покрывной	101
Лактодонт	101
Легирование	101
Легкоплавкие сплавы	101
Лейкоз	101
Лейкоплакия	102
Лечебная эффективность	102
Лечебные средства в ортопедической стоматологии	102
Лигатура	102
Лидаза	103
Лизис	103
Лизоцим	103
Ликвация	103
Лимфаденит	103
Лимфангоит	103
Линия «А»	103
Линия резцовая	103
Линия челюстно-подъязычная	104
Липома	104
Литейная комната	104
Литейный аппарат	104
Литьё	104

Лицо	104
Ложе имплантационное	104
Ложки слепочные (оттискные)	105
Лучевая болезнь	105
Люголя раствор	105
Люминесэнс	105
Люминофоры	106
Лябион	106

М

Мазок	106
Макрогlossия	106
Макродентия	106
Мамелон	106
Мандибулярный	106
Марганец	106
Маска лица	106
Массаж	107
Мастикациография	107
Материаловедение	107
Материаловедение стоматологическое	107
Материалы для дублирования гипсовых моделей челюстей	107
Материалы моделировочные	107
Материалы слепочные (оттискные)	108
Материалы стоматологические	108
Материалы формовочные	108
Мацерация	109
Медиальный	109
Межзубной	109
Меланома	109
Ментон	109
Метод Гербста	109
Метод Макари	109
Методика Хорошилкиной-Малыгина	109
Методы штамповки металлических искусственных коронок	110
Миалгия	110

Миастения	110
Микозы	110
Микрогения	110
Микроглоссия	110
Микрогнатия	110
Микродентия	110
Микрометр	110
Микростомия	110
Миксома челюсти	111
Миозит	111
Миорелаксация	111
Миотерапия	111
Модели вспомогательные	111
Модели диагностические	111
Модели контрольные	111
Модели огнеупорные	111
Модели рабочие или основные	112
Модельсепаратор	112
Модиолус	112
Молочница	112
Молочные зубы	112
Молочный прикус	112
Монсона кривая	112
Мольдин	112
Моляры	112
Мостовидный протез	113
Мотивация к профилактике	113
Мумификация	113
Мышление клиническое	113
Мышцы жевательные	113
Мышцы мимические	113
Мышьяковистая паста	113
Мыщелковый отросток	114

Н

Наддесневик (эпулис)	114
Надкостница	114
Наждачная бумага	114
Назальный	114

Назион	114
Наклёп	114
Наковальня зуботехническая	114
Наконечник	114
Наклонная плоскость	115
Налёт зубной	115
Наполнители композитных материалов	115
Напыление	115
Наркозный аппарат	115
Нёбные слепые ямки	115
Невралгия	116
Неврит	116
Нейропатия тройничного нерва одонтогенная	116
Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена)	116
Некроз	116
Непереносимость к пластмассовым протезам	117
Неправильное глотание	117
Нержавеющая сталь	117
Нестираемость твердых тканей зубов	118
Несъёмный протез	118
Нёбо	118
Никель	118
Нобус ТМ	118
Нозологические единицы или формы	118
Нома	118
Норакрил-100	118

О

Обезболивание	119
Обжиг	119
Облитерация	119
Облой	119
Обморок	119
Оболочка слизистая твердого неба	120
Обследование зубов	120
Обтураторы	120
Одонтобласт	121
Одонтома	121
Одонтопародонтограмма	121

Ожоги	122
Озокеритолечение	122
Окалина	122
Окись цинка	122
Окклюдаторы	122
Окклюзиограмма	122
Окклюзионная высота нижней трети лица	123
Окклюзия	123
Оконтовка	123
Омнифлекс	123
Опалесценция	123
Оперативная обработка кариозной полости	123
Операция Цешинского-Видмана-Неймана	124
Определение высоты прикуса в положении центрального соотношения челюстей	124
Определение рН слюны	124
Опорные части мостовидного протеза	124
Опрос	124
Опухоль	124
Оральный	125
Орбитальная плоскость	125
Ормокеры	125
Ороговение	125
Ортогнатия	125
Ортодонтия	125
Ортодонтические аппараты	125
Ортокор	126
Ортопедия	126
Ортопедия челюстно-лицевая	126
Ортосил-М	126
Осмотр слизистой оболочки полости рта	127
Оссификация	127
Остеоартрит	127
Остеоартроз	127
Остеобласты	127
Остеодисплазия	127
Остеодистрофия	128
Остеокласт	128
Остеомиелит	128

Остеомиелит челюстей	128
Остеопороз	128
Остеосклероз	128
Остеотомия	128
Остеоэктомия	128
Остит	128
Острон	128
Ость подбородочная	128
Отбел	128
Отбеливание	129
Отёк	129
Отёк Квинке	129
Отжиг	129
Отморожение лица	129
Отгиск	129
Оценка качества и правильности конструкций зубных протезов	129
Очаги инфекционные стоматогенные	130

II

Паковка	130
Паладон-65, Паладур, Палапрес	130
Паладур	130
Паллиативный	130
Пальпация	130
Папиллит	131
Папиллома	131
Папилломатоз	131
Папула	131
Параимпланит	131
Паракератоз	131
Паралич	131
Параллелометр	131
Парафункция жевательных мышц	131
Парез	132
Парестезия	132
Парниковый эффект	132
Пародонт	132

Пародонтит	132
Пародонтоз	132
Пародонтолиз	132
Парорексия	133
Паротит	133
Пассивация	133
Паста	133
Пациент	133
Паяние	133
Пелликула зубов	133
Пемфигус	133
Перебазировка протеза	133
Передняя окклюзия (сагиттальное движение нижней челюсти)	134
Перелом	134
Переломы зубов	134
Периапикальный	134
Периимпланит	135
Перикоронит	135
Периодонт	135
Периодонтит	135
Периостит	135
Перкуссия	136
Перорально	136
Перфорация	136
Петехии	136
Петрификация	136
Пигментация	136
Пинцет	136
Плаггер	136
Пластика уздечки языка	136
Пластинка накусочная	137
Пластинка с вестибулярной дугой	137
Пластинки нёбные литые	137
Пластиночные аппараты съёмные	137
Пластиночный съёмный протез	137
Пластическая операция	137
Пластичность	137

Пластификаторы	137
Пластмассовые зубы	137
Пластмассы стоматологические	138
Пластмассы термопластические	138
Пластмассы термореактивные	138
Платонова жидкость обезболивания	138
Пломба	138
Плоскости наклонные	138
Плоскость окклюзионная	139
Плоскость орбитальная	139
Плоскоклеточный рак	139
ПМ-01	139
Побочное действие протеза	139
Повреждение	139
Повторное протезирование	140
Повышенная стираемость зубов	140
Повязка	140
Погонион	140
Податливость слизистой оболочки протезного ложа	140
Податливость слизистой оболочки протезного ложа по Люнду	140
Податливость слизистой оболочки протезного ложа по Суппле	141
Подвижность зубов патологическая	141
Подвижность зубов физиологическая	141
Подвижность слизистой оболочки	141
Подвывих	142
Поднутрение	142
Подъязычное пространство	142
Позиционер	142
Показатель интенсивности поражения	142
Показатель тонуса сосудов — ПТС	142
Покой функциональный жевательных мышц	142
Поле окклюзионное	143
Поле протезное	143
Поливик	143
Поликонденсация	143
Полимеризация	143

Полимеризация пластмассы	143
Полимеризационная комната	144
Полимерные пломбирочные материалы некомпозитные	144
Полимеры	144
Полиморфизм	144
Полип	144
Полипласт	144
Полиприсоединение	144
Полисульфидные слепочные массы	144
Полиэфирные слепочные массы	145
Полировочная комната	145
Полоскание растворами фторидов	145
Полукоронка	145
Пониженная стираемость молочных зубов	145
Порошки зубные	145
Порошок для полировки протезов	146
Поскал	146
Постоянные зубы	146
Починка съёмного пластиночного протеза	146
Праща подбородочная	146
Предварительное лечение больного перед протезированием	146
Предрак красной губы, бородавчатый	147
Премедикация	147
Премоляры	147
Препарирование зубов	147
Претыл	147
Привыкание к протезам	147
Привычки детские вредные	148
Признак кривизны коронки	148
Признак кривизны корня	148
Признак положения корня	148
Признак угла коронки	148
Признаки центральной окклюзии	149
Прикус	149
Прикус глубокий	150
Прикус молочный	150
Прикус открытый	150

Прикус перекрёстный	150
Прикус постоянный	150
Прима	151
Припой для стали нержавеющей	151
Пришлифовывание зубов избирательное	151
Проба волдырная	151
Проба гистаминная	151
Проба Кавецкого	151
Проба лейкопеническая	151
Проба провокационная	151
Проба разговорная	152
Проба с экспозицией	152
Проба Шиллера-Писарева	152
Проба Ясиновского	152
Прогения	153
Прогнатия	153
Пролежень	153
Пролиферация	153
Промывное пространство	153
Проназале	153
Пропедевтика	153
Протакрил-М	153
Протез	154
Протез консольный	154
Протез мостовидный	154
Протезное ложе	154
Протезы для детей	154
Протоплен-М	154
Протрузия зубов	154
Профессиональное поражение слизистой оболочки полости рта	155
Профилактические стоматологические средства	155
Прочность	155
Птоз	155
Пузырчатка	155
Пульпа зуба	155
Пульпаэкстрактор	156
Пульпит острый диффузный	156
Пульпит острый гнойный	156

Пульпит острый частичный	156
Пульпит ретроградный	156
Пульпит хронический гангренозный	157
Пульпит хронический гипертрофический	157
Пульпит хронический обострившийся	157
Пульпит хронический фиброзный	157
Пульпотомия	157
Пульпаэктомия	157
Пунктат	157
Пункты межзубные контактные	157
Пункция	158
Пурпура	158
Пустула	158
Пути передачи жевательного давления	158
Путь введения протеза	158
Путь выведения протеза	158
Пятерка Ганау	159
Пятно	159
Пятна Коплика-Филатова	159

Р

Рабдомиома	159
Радиовизиография	159
Радиосиалография	159
Рак слизистой оболочки полости рта и челюстей	160
Рана	160
Рандольф	160
Ранула или киста подъязычная ретенционная	160
Рапид репайр	160
Рапин	160
Расестипен	161
Распорка	161
Распространённость кариеса	161
Рауцем	161
Рахитические изменения зубов и челюстей	161

Рашпиль	161
Реанимация	161
Ребарон	161
Реактивы для определения раздражающих металлов при пользовании металлическим зубными протезами	162
Регенерация	162
Редонт	162
Редукция	162
Ред-фейз Р	162
Режущо-бугорковый контакт	162
Резекция	163
Резервные силы пародонта	163
Резец боковой	163
Резец центральный	163
Резидент	163
Резодент	163
Резорбция	163
Резорцин	163
Реконструкция съёмного пластиночного протеза	164
Реминерализация	164
Ремиссия	164
Рентгеновизиография	164
Рентгенограмма	164
Реография	164
Реокап темп	164
Репин	165
Реплантиция зуба	165
Репозиция	165
Ретенционные аппараты	165
Ретенция зуба	165
Ретракция десны	165
Ретрузия зубов	165
Рецидив	165
Ринопластика	165
Рожа	165
Розеола	166

Ротация	166
Ротовая ролость	166
Рубец	166

С

Саливация	166
Санация полости рта	166
Санберст	166
Саркома	166
Сахарный диабет	167
Сведение (контрактура) челюстей	167
Светолечение	167
Свищ десневой	167
Свищ слюнной	168
Сегакест	168
Секвестр	168
Сенсибилизация	168
Сепсис стоматогенный	168
Сепсис хирургический	168
Септикопиемия	168
Септиция	168
Септокорд	168
Сиалодентит	169
Сиалография	169
Сиалодохит острый и хронический	169
Сиалолитиаз	169
Сикор	169
Силаур	169
Силидонт	169
Силиконовые слепочные материалы	169
Силицин	170
Симптом	170
Симптом бабочки	170
Симптом Бертона	170
Симптом Бехтерева	170
Симптом Боуга	170

Симптом Венсана	170
Симптом Вески	170
Симптом Викема (Уикхема)	170
Симптом Виллиса	170
Симптом волоса	171
Симптом Гареля	171
Симптом Герена	171
Симптом Герке	171
Симптом Гетчинсона	171
Симптом гидровибрационного колебания	171
Симптом Говерса	171
Симптом Дюпюитрена	171
Симптом Жильбера-Ано	171
Симптом Кауфмана	172
Симптом Купермана	172
Симптом Либермейстера	172
Симптом Мальча	172
Симптом Марфана	172
Симптом «маски клоуна»	172
Симптом Миршана	172
Симптом Никольского	172
Симптом «очков»	172
Симптом «разбитого горшка»	172
Симптом Треля	173
Симптом Филатова	173
Симптом Хетчкока	173
Симптом «щелкающего» сустава	173
Симптом Шмрекера	173
Симптом «языков пламени»	173
Синдром	173
Синдром Ашера	173
Синдром аурикуло-темпоральный	174
Синдром Бехчета	174
Синдром «зубная ангина»	174
Синдром Костена	174
Синдром Лефевра-Папийона	174
Синдром Пеутса-Турена-Егерса	174

Синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ)	175
Синдром Рейтора	175
Синдром Робена	175
Синдром Россолимо-Мелькерсона-Розенталя	175
Синдром Стейнтоно-Капдепона	175
Синдром Стивенса-Джонсона	175
Синдром Слюдера	176
Синдром Такахары	176
Синдром Флорика-Лобштейна	176
Синдром Шегрена	176
Синерезис	176
Синовит	177
Сиолит	177
Система Дигидент	177
Система Румпеля	177
Ситаллы	177
Сифилис	177
Скалер	177
Скарификационно-пленочный тест	178
Скарлатина	178
Слепок (оттиск)	178
Слюна	178
Слюннокаменная болезнь	178
Сменный прикус	179
Смесь Никифорова	179
Смесь фенол-формалиновая	179
Соединительная ткань	179
Солитэр	179
Соскоб	179
Состояние относительного физиологического покоя	179
Сплав кобальто-хромовый	179
Сплав легкоплавкий	179
Сплав Меллота	180
Сплавы металлов	180
Сплавы ртути	180

Сплавы серебряно-палладиевые	180
Спонтанный	180
Спорицидин	180
Спредер	180
Садина	180
Стабилизаторы	181
Стабилор	181
Стадонт	181
Статические методы определения жевательной эффективности	181
Стейпут	181
Step-back (степ-бэк) методика	181
Стерилизаторы	181
Стирание зубов физиологическое, патологическое	182
Стираемость зубов функциональная	182
Стойкость коррозионная	182
Столбняк	182
Стомадент	182
Стом-акрил	182
Стомальгин	182
Стоматит	183
Стоматиты акриловые	183
Стоматит аллергический	183
Стоматит везикулярный	183
Стоматит гонорейный	183
Стоматит грибковый	183
Стоматит курильщиков	184
Стоматит медикаментозный	184
Стоматит при ветряной оспе	184
Стоматит при кори	184
Стоматит при лимфолейкозе	184
Стоматит при миелоидной лейкемии	184
Стоматит при пеллагре	185
Стоматит ртутный	185
Стоматит язвенно-некротический	185
Стоматолог	185

Стоматолог, положение рабочее сидя	185
Стоматолог, положение рабочее стоя	186
Стоматологические цементы	186
Стоматологическое зеркало	186
Стоматоскоп	186
Структур	186
Структур-2	186
Суперпал	186
Супер ТЗ	187
Супра стоун	187
Сшивагенты	187
Сшивка	187
Сыпь	187

Т

Таб-2000	187
Т-активин, тимаген, тималин	187
Тампон	187
Таргис	188
Тауродонтия	188
Твердосплавные боры	188
Твердость	188
Твердые слепочные материалы	188
Текучесть	188
Тела инородные	188
Телерентгенография	188
Телескопические коронки	188
Тело мостовидного протеза	189
Темдент	189
Темп бонд NE	189
Темпрон	189
Тенит	189
Тератома	189
Терминатор	189
Термодиагностика	189
Термопластические слепочные материалы	189

Термоскоп	190
Тест определения активности ферментов слюны	190
Тест химического серебрения поверхности акрилового протеза	190
Тетрациклиновые зубы	190
Тигель	190
Тиодент	190
Тирокальцитонин	191
Титан	191
Толстомер	191
Томография	191
Тортоаномалия	191
Травление	191
Травматические узлы	192
Трако	192
Трансплантация	192
Трансплантация зуба	192
Транспозиция	192
Трахеотомия	193
Тревожность	193
Трема	193
Тремор	193
Трепанация зуба	193
Треугольник Бонвилля	193
Трещина	193
Тризм	193
Трим	193
Триоксазин	193
Трифуркация	193
Тромб	194
Тромбофлебит	194
Трофедема	194
Трубайт биофарм JPN	194
Туберкулез слизистой оболочки полости рта	194
Турнера зубы	194
Турунда	194

У

Угол бокового резцового пути	195
Угол бокового суставного пути (угол Беннета)	195
Угол дивергенции	195
Угол конвергенции	195
Угол сагитального резцового пути	195
Угол сагитального суставного пути	195
Удаление зубов	195
Удлинение зубо-альвеолярное	195
Уздечка губы короткая	196
Уздечка языка	196
Узелки Бона	196
Уилсона кривые	196
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ)	196
Ультразвуковая терапия	196
Ультрафиолетовые лучи	196
Уникс	197
Унифас	197
Уницем	197
Уолдвест	197
Упругость	197
Уродливые зубы	197
Усадка	197
Уход за протезами	197
Ушибы зуба	198

Ф

Фагодинамометрия	198
Фазе-плюс	198
Фазы жевания	198
Факторы риска стоматологических заболеваний	198
Фантом	198
Фарфоровая масса	199
Фасетка	199

Феномен Попова-Годона (Вторичная деформация зубо-челюстной системы)	199
Феномен Христенсена	199
Ферментные препараты	200
Фибер-бонд, Фибер-силит, Фибер-симент МЛ	200
Фиброматоз десен	200
Фибросаркома	200
ФиБС	200
Фиксакрил	200
Фиксаторы	200
Фис-8	200
Фиссуры	201
Фитотерапия	201
Флегмона	201
Флегмона височной области	201
Флегмона глазницы	201
Флегмона дна полости рта	201
Флегмона окологлоточного пространства	201
Флегмона подглазничной области	202
Флегмона подчелюстной области	202
Флегмона подъязычной области	202
Флекси-вост	202
Флюкса	202
Флюктуация	202
Флюктуоризация	203
Флюороз	203
Формадент литевой, формадент твердый	203
Формасил	203
Формовка	203
Формодент	203
Формолит	203
Формула зубов	205
Фосфат цемент	205
Фотоплетизмография	205
Фрейз	205
Френулотомия	205

Френулоэктомия	206
Фтор	206
Фторакс	206
Фторотан	206
Фуджи-1	206
Фуджи плюс	206
Фудживест и фудживест супер	206
Фуджирок-ер	206
Функции пародонта	206
Функциональные жевательные пробы	207
Фурацилин	207
Фурункул	207
Футура-зульф	207

X

Хаас-лазер 44Р	208
Хабитус	208
Хай-керам	208
Хай-лайт	208
Хауэса метод	208
Хейлит	208
Херамат-ц	208
Химико-спектральный анализ слюны	208
Химопсин	209
Хлорамин	209
Хлороз поздний	209
Хондросаркома	209
Хонсурид	209
Хорошилкиной-Токоревица приспособление	210
Хром	210
Хрониосепсис	210
Хронический	210
Хрупкость	210

Ц

Цегалл	210
Целлулоид	210
Цемент корня зуба	211
Цемент иономерный	211
Цемент цинкполиакрилатный	211
Цементома	211
Цемион Ф	211
Центры жевательные	211
Церин	211
Цефалометрия	211
Цианоз	211
Цинга	212
Цинк окиси	212
Цистомия	212
Цистоэктомия	212

Ч

Частота вращения	212
Челюсти беззубые	212
Челюсть верхняя	212
Челюсть нижняя	212
Чешуйка	213
Чистка зубов	213

Ш

Шейка зуба	213
Шина боксёрская	213
Шина Вайсенфлю	214
Шина Ванкевича	214
Шина Васильева	214
Шина Вебера	214
Шина Гунинга-Порта	214
Шина колпачковая	214

Шина Лимберга	214
Шина ложка	214
Шина Мамлока	215
Шина несъемная из коронок	215
Шина протез	215
Шина Степанова	215
Шина Тигерштедта	215
Шина Эльбрехта	215
Шинирование	215
Шины пластассовые для челюстей	216
Шиповидные зубы	216
Шлифовальный мотор	216
Шок	216
Шок травматический	216
Шпат полевой	216
Шпатель	216
Штамп	217
Штамповка	217
Штерн-квик	217
Штифт	217
Штифтовый зуб Амираева	217
Штифтовый зуб Ахмедова	218
Штифтовый зуб Ильиной-Маркосян	218
Штифтовый зуб Ричмонда	218
Штифтовый зуб Ричмонда в модификации ММСИ	218

Щ

Щвян	218
Щека	218
Щель ротовая	218
Щётка зубная	218
Щёчный	218
Щипцы для прокалывания вестибулярной поверхности металлических коронок	219
Щипцы крапонтные	219

Щипцы клювовидные	220
Щипцы экстракционные	220

Э

Эвакуация	220
Эвикрол	220
ЭГМАСС-12	220
Эзофаготомия	220
Экватор зуба	221
Экзабайт	221
Экзартикуляция	221
Экзопротезы, эктопротезы	221
Экзостоз	221
Экскаватор	221
Экскавация	221
Эксориация	222
Эксплолеры или зонды	222
Экспульсия	222
Экссудат	222
Экстирпация	222
Экстракция зуба	222
Эксфолиативный хейлит	222
Экхимоз	222
Эладент-100	222
Эластик	223
Эластичность	223
Эластичные слепочные материалы	223
Эластопласт	223
Элеватор	223
Электровозбудимость пульпы зуба	223
Электромиография	223
Электрообезболивание	224
Электросон	224
Электрофорез	224
Электрохимические нарушения в полости рта	224

Эльбрехта классификация альвеолярных гребней при неограниченных дефектах зубного ряда	224
Эльцебонд ССV	225
Эмаль	225
Эмболия воздушная	225
Эмфизема лица и органов полости рта	225
Эндодент	225
Эндодонтия	225
Эндопротезы	226
Эодент	226
Эпидермоид врожденный (пузырчатка врождённая)	226
Эпикриз	226
Эпителиальный слой	226
Эпителизация	226
Эпоксидные пломбировочные составы	226
Эпулис	226
Эргономика в стоматологии	226
Эритема	227
Эритема многоформная экссудативная	227
Эрозия эмали	227
Эстедент	227
Этакрил	228
Этест	228
Эффективность жевания	228
Эффективность протезирования	228
Эчинг-пеллетс	228
Эхоостеометрия	228

Ю

Юинга саркома	229
Юпитца циркуль	229

Я

Язва	229
Язва декубитальная	229
Язва трофическая	229
Язва туберкулёзная	230
Язык	230
Язык десквамативный	230
Язык пенициллиновый	230
Язык складчатый	230
Язык при уремии	230
Язык черный	230
Языкозащитник	230
Янсон бионатор	231
Ятрогения	231
Ячейка зуба	231
Ящур	231

АМИРАЕВ УБАЙДИЛЛА
СТОМАТОЛОГИЯЛЫК ТЕРМИНДЕРДИН
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА ТҮШҮНДҮРМӨ СӨЗДҮГҮ

Окуу куралы

(Русско-кыргызский словарь)

Редактору *Төлөгенова С.Ш.*

Корректору *Сакелова Р.*

Компьютерде калыпка салган *Терибаева Р.*

Басууга 10.10.2009. кол коюлду.
Форматы 60x84¹/₁₆. Көлөмү 17,25 б.т. Нускасы 100,

720000, Бишкек ш.,